


فهرست

۷	آنالیز ترکیبی
۹	گراف
۱۳	نظریه اعداد (بخش ۱)
۱۷	نیمه ای اول کتاب گستته
۱۹	نظریه اعداد (بخش ۲)
۲۱	استدلال ریاضی
۲۴	مجموعه - ضرب دکارتی و رابطه
۲۷	مباحثی دیگر از ترکیبات
۳۱	احتمال
۳۹	آزمون های جامع
۵۰	پاسخ نامه ای تشریحی
۱۰۹	پاسخ نامه ای تشریحی آزمون های جامع
۱۲۷	پاسخ نامه ای کلیدی
۱۲۸	پاسخ نامه ای کلیدی آزمون های جامع



آزمون ۳

۲۱- در گرافی که ۱۶ رأس دارد، تعداد رأس‌های زوج عددی و تعداد رأس‌های فرد، عددی است. (سراسری ریاضی - ۱۸)

۴) زوج - زوج

۳) زوج - فرد

۲) فرد - زوج

۱) فرد - فرد

۲۲- در کدام یک از گراف‌های ساده‌ی زیر فقط درجهٔ ۲ تا از رأس‌ها ۵ است؟

۲) گرافی از مرتبهٔ ۷ و اندازهٔ ۲۰

۲۱) گرافی از مرتبهٔ ۷ و اندازهٔ ۲۱

۴) گرافی از مرتبهٔ ۶ و اندازهٔ ۱۴

۱۵) گرافی از مرتبهٔ ۶ و اندازهٔ ۱۵

۲۳- با حذف کدام یک از یال‌های زیر، گراف زیر تبدیل به یک گراف بازه‌ها می‌شود؟


cd (۳)

bc (۲)

ab (۱)

de (۴)

۲۴- سه نفر به اسمی A_1 , B_1 و B_2 متقاضی دو شغل A_1 و B_2 هستند، که گراف زیر توانایی آن‌ها را در انجام کارشان نشان می‌دهد. استخدام به چند روش ممکن است؟



۵ (۴)

۴ (۳)

۳ (۲)

۶ (۱)

۲۵- برای تبدیل یک گراف کامل و ۲۱-منتظم از مرتبهٔ p به گراف Γ -منتظم از مرتبهٔ p باید ۳۹ یال را حذف کنیم. Γ کدام است؟

۹ (۴)

۸ (۳)

۷ (۲)

۶ (۱)

۲۶- به ازای چند مقدار متمایز برای $a+b+c$, گرافی با درجهٔ رأس‌های $a, b, c, 6, 5, 4, 1$ وجود دارد؟

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

(سراسری ریاضی - ۱۸)

۲۷- در گراف ساده از مرتبهٔ ۶، دنباله‌ی درجهٔ رأس‌های آن، به کدام صورت می‌تواند باشد؟

۵, ۴, ۳, ۲, ۲, ۱ (۲)

۵, ۴, ۳, ۲, ۲, ۰ (۱)

۵, ۴, ۳, ۳, ۲, ۱ (۴)

۵, ۴, ۳, ۲, ۱, ۱ (۳)



- ۲۸- در گرافی با اندازه‌ی 11 ، بیشترین درجه‌ی رئوس برابر 4 است. اگر این گراف، یک رأس از درجه‌ی 4 و دو رأس از درجه‌ی 2 داشته باشد، حداقل چند رأس از درجه‌ی 3 دارد؟

۶ (۴) ۵ (۳) ۴ (۲) ۳ (۱)

۲۹- در گرافی از مرتبه‌ی 10 و اندازه‌ی 40 ، برای 8 چند مقدار متمایز می‌تواند وجود داشته باشد؟


۲ (۴) ۳ (۳) ۴ (۲) ۵ (۱)

۳۰- در گراف ساده‌ای $q=15$ و $\delta=3$. این گراف حداقل چند رأس دارد؟

۸ (۴) ۷ (۳) ۶ (۲) ۵ (۱)

آزمون ۴

- | | | | | |
|---|--------|--------|---------|---------|
| ۳۱- در یک گراف همبند که مجموع مرتبه و اندازه‌ی آن ۸ باشد، با افزودن چند یال گراف کامل می‌شود؟ | ۴ (۴) | ۳ (۳) | ۲ (۲) | ۱ (۱) |
| ۳۲- در گراف کامل K_n چند مسیر به طول ۴ داریم که شامل رئوس a و b باشد؟ | ۱۸ (۴) | ۲۶ (۳) | ۱۴۴ (۲) | ۲۴۰ (۱) |
| ۳۳- به یک گراف ۱ منتظم از مرتبه‌ی ۸، حداکثر چند یال می‌توان اضافه کرد تا گراف حاصل، ساده و ناهمبند باقی بماند؟ | ۱۴ (۴) | ۱۲ (۳) | ۱۰ (۲) | ۸ (۱) |
| ۳۴- فاصله‌ی رأس a با تمام رأس‌ها برابر ۱ است. اگر این گراف دارای ۷ رأس و کمترین تعداد یال ممکن باشد، تعداد مسیرهای به طول ۲ در این گراف کدام است؟ | ۲۱ (۴) | ۱۵ (۳) | ۹ (۲) | ۱۲ (۱) |
| ۳۵- چهار خانه‌ی d, c, b, a را به صورت جداگانه به مراکز آب و برق و گاز وصل می‌کنیم. در گراف به وجود آمده، از خانه‌ی a به خانه‌ی b چند مسیر به طول ۴ وجود دارد؟ | ۴ (۴) | ۶ (۳) | ۸ (۲) | ۱۲ (۱) |
| ۳۶- حاصل ضرب مرتبه و اندازه‌ی یک گراف همبند، برابر کدامیک از عددهای زیر می‌تواند باشد؟ | ۳۲ (۴) | ۲۸ (۳) | ۲۷ (۲) | ۲۴ (۱) |
| ۳۷- یک گراف همیلتونی از مرتبه‌ی ۸ و اندازه‌ی 10° که رأسی از درجه‌ی ۴ دارد، دارای چند دور است؟ | ۶ (۴) | ۵ (۳) | ۴ (۲) | ۳ (۱) |



(سراسری ریاضی هارج - ۱۹)

- ۳۹- در گرافی $p=22$ و $q=18$ ، این گراف حداقل از چند بخش جدا از هم تشکیل شده است؟

۱۷ (۴)	۱۶ (۳)	۱۵ (۲)	۱۴ (۱)
--------	--------	--------	--------

۴۰- رابطه‌ی وجود داشتن مسیر، مجموعه‌ی رئوس یک گراف ساده از مرتبه‌ی ۱۲ را به ۴ کلاس همارزی افزایش کرده است. اگر هر بخش این گراف اویلری باشد، تعداد یال‌های این گراف کدام است؟

۱۸ (۴)	۲۴ (۳)	۱۲ (۲)	۳ (۱)
--------	--------	--------	-------

آزمون

- | | | | |
|--------------------|---|---|-------|
| ۱۴ (۴) | ۱۳ (۳) | ۸ (۲) | ۷ (۱) |
| (سراسری ریاضی - ۹) | ماتریس مجاورت گراف G باشد، اندازه‌ی G کدام است؟ | $\begin{bmatrix} \cdot & \cdot & 1 \\ \cdot & \cdot & 1 \\ 1 & 1 & \cdot \end{bmatrix}$ اگر | ۴۲ |
| ۴ (۴) | ۳ (۳) | ۲ (۲) | ۱ (۱) |



- ۴۳- سطر اول ماتریس مجاورت یک درخت مرتبه ۷، دارای ۵ درایه ۱ است. این درخت چند رأس درجه ۱ دارد؟
۶ (۴) ۵ (۳) ۴ (۲) ۲ (۱)
- ۴۴- کدامیک از اعداد زیر نمی‌تواند حاصل ضرب درجه‌های رئوس یک گراف ساده از مرتبه ۶ باشد؟
۲۸۸ (۴) ۱۳۵ (۳) ۹۰ (۲) ۱) صفر
- ۴۵- در یک گراف همبند بدون دور مجموع مرتبه و اندازه برابر ۱۳ است. ماتریس مجاورت این گراف چند درایه صفر دارد؟
۵۰ (۴) ۴۲ (۳) ۳۷ (۲) ۲۶ (۱)
- ۴۶- چند نوع گراف از مرتبه ۶ داریم که در آن $\Delta - \delta = 2$ و بین هر دو رأس آن، یک و فقط یک مسیر وجود داشته باشد؟
۴ (۴) ۲ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)
- ۴۷- ماتریس مجاورت گرافی از مرتبه ۶ دارای ۲۸ درایه یک است. این گراف چند دور به طول ۳ دارد؟
۳۰ (۴) ۲۶ (۳) ۲۰ (۲) ۱۶ (۱)
- ۴۸- چند درخت با دنباله درجه‌های رئوس $1, 1, \dots, 2, 3, 4$ وجود دارد؟
۱ (۴) ۲ (۳) ۳ (۲) ۴ (۱)
- ۴۹- بین هر دو رأس از گراف G دقیقاً یک مسیر وجود دارد. اگر این گراف شامل ۷ رأس درجه یک، ۵ رأس درجه ۲ و k رأس درجه ۳ باشد، k کدام است؟
۳ (۴) ۴ (۳) ۵ (۲) ۶ (۱)
- ۵۰- اگر A ماتریس مجاورت گراف همبند G و درایه‌های واقع در سطر i ام و ستون j ام ماتریس A^T ، عده‌های $4, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1$ باشند، گراف G چند دور دارد؟
۳ (۴) ۲ (۳) ۱ (۲) ۱) هیچ



پس در این گراف ساده از مرتبه‌ی $p = 16$ ، تعداد رأس‌های زوج، عددی زوج (همانند مرتبه‌ی گراف) و تعداد رأس‌های فرد، عددی بُرج است.

۲۲- گزینهٔ ۲

$$p = 7 \quad \text{گزینهٔ ۱}$$

$$q = 20 = \binom{7}{2} - 1$$


یال‌ها برابر $\frac{p(p-1)}{2}$ بوده و تمامی رئوس از درجه‌ی ۱

(درجه) هستند و چنان‌چه یک یال از K_p حذف کنیم، درجه‌ی ۲ رأس به ۲ تغییر می‌کند.

گزینهٔ ۲

$$p = 7$$


$$q = 21 = \binom{7}{2}$$



گزینهٔ ۱

$$p = 7$$


$$q = 21 = \binom{7}{2}$$



گزینهٔ ۳

$$p = 6$$


$$q = 14 = \binom{6}{2} - 1$$



گزینهٔ ۲

$$p = 6$$


$$q = 15 = \binom{6}{2}$$



۲۳- گزینهٔ ۱

نکتهٔ ۱ اگر در گراف ساده‌ای، $n \geq 4$ ضلعی فاقد قطر (اصطلاحاً حفره) وجود داشته باشد، آن گراف حتماً بازه‌ای نیست.

مطلوب شکل، در نمودار گراف ۲ چهارضلعی فاقد قطر ab و $abce$ و $abde$ وجود دارد که با حذف یکی از یال‌های ab (گزینهٔ ۱) و ae ، این چهارضلعی‌ها دیگر وجود خارجی نخواهند داشت! و گراف بازه‌ای می‌شود.




توجه ۱ عدم وجود n ضلعی فاقد قطر در یک گراف ساده، دلیلی قطعی برای بازه‌ای بودن آن گراف نیست و حتماً باید با یافتن بازه‌های مناسب

برای رئوس گراف، این موضوع را بررسی کرد.

۲۴- گزینهٔ ۳

توجه داشته باشید که پروسه‌ی استخدام را شرکت انجام می‌دهد و طبیعی است که شغل‌های خود را به افراد مناسب واگذار می‌کند، نه این‌که به هر فرد متقاضی، حتماً شغل واگذار کند!



آزمون ۳

یکی از ویژگی‌های گراف ساده این است

که تعداد رأس‌های فرد حتماً عددی زوج بوده و تعداد رأس‌های زوج از نظر زوجیت با مرتبه‌ی گراف یکسان است.

۲۱- گزینهٔ ۴



تمرین: اگر تعداد حالت‌های $\{a, b, c\}$ را می‌خواستیم (که سؤال دشوارتری بود) جواب چی می‌شد؟

گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:

۲۷- گزینه ۴


گزینه ۱: $(5, 4, 3, 2, 1, 0)$: چون رأس درجه ۵ $p-1=5$ (درجه Full) به

داریم پس نباید رأس درجه ۵ صفر وجود داشته باشد.

گزینه ۲: $(5, 4, 3, 2, 1, 0)$: تعداد رأس‌های درجه ۵ فرد نباید عددی فرد باشد.

گزینه ۳: $(5, 4, 3, 2, 1, 1)$: رأس درجه ۵ $p-1=5$ (درجه Full) به

تمامی رئوس وصل است. از طرفی رأس درجه ۴ $p-2=4$ به غیر از یک رأس با تمامی رئوس مجاور خواهد بود و به همین دلیل نباید دو رأس درجه ۱ داشته باشیم و حداقل یک رأس درجه ۱ باید وجود داشته باشد.



گزینه ۴: $\Delta = 4$ با توجه به فرض، یک رأس درجه ۴


و دو رأس درجه ۲ وجود دارد و تعداد یال‌ها $= 11$ است، پس اگر

تعداد رئوس درجه ۳ و ۱ را به ترتیب x و y بگیریم، آن‌گاه:

$$\sum \deg v_i = 2q \Rightarrow 4 + 2x + 3x + y = 22 \Rightarrow 3x + y = 14$$

با توجه به معادله اخیر $x_{\max} = 4$ و $y = 2$ خواهد بود. نمودار زیر

مربط به گرافی با دنباله‌ی درجات رئوس $1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4$ راس است:



گزینه ۵: گراف داده شده را با گراف کامل هم‌مرتبه می‌دانیم.

خودش مقایسه می‌کنیم. اگر از گراف کامل K_1 که $q = \binom{10}{2} = 45$ است، یال دارد، ۵ یال برداریم به گراف فوق می‌رسیم.

می‌دانیم که در K_1 درجه ۵ یال را تا حد امکان از رئوس برداشیم

طبق دو حالت زیر به بیشترین و کمترین مقدار δ می‌رسیم:


حالات اول سعی می‌کنیم ۵ یال را تا حد امکان از رئوس برداشیم که با توجه به نمودار زیر، هر 10 رأس از درجه ۸ خواهند شد، پس

$$\max(\delta) = 8$$


حالات دو: هر ۵ یال را از یک رأس برمی‌داریم که در این صورت

$$\min(\delta) = 4$$

به دست می‌آید:



شرکت، مسلمًا استخدام را از شغل بحرانی (که متقاضی کمتری دارد) شروع می‌کند. مطابق نمودار درختی زیر، ابتدا شغل A_2 را که متقاضی کمتری (نسبت به A_1) دارد به یکی از افراد B_2 یا B_3 واگذار کرده و همین روند را ادامه می‌دهیم.



با توجه به نمودار، ۴ روش برای استخدام در این شرکت وجود دارد.

گزینه ۶: می‌دانیم که گراف کامل مرتبه‌ی p همان

گراف « $(p-1)$ منظم از مرتبه‌ی p » است، پس:

$$\text{گراف کامل } \rightarrow 2r = p-1 \quad \text{منظم از مرتبه‌ی } p : \text{گراف اول}$$

$$\Rightarrow p = 2r+1 \Rightarrow q = \binom{p}{2} = \frac{p(p-1)}{2} = (2r+1)r$$

$$= \frac{pr}{2} = r \quad \text{منظم از مرتبه‌ی } p : \text{گراف دوم}$$

$$(2r+1)r - \frac{(2r+1)r}{2} = 39 \rightarrow (2r+1)r = 78 \quad \text{با توجه به فرض}$$

$$= \frac{(2r+1)r}{2} = 39 \Rightarrow (2r+1)r = 78$$

معادله اخیر، یک معادله درجه دو است که با توجه به $78 = 13 \times 6$

می‌توان نتیجه گرفت که $r = 6$.

گزینه ۷: از آنجاکه تعداد یال‌های گراف کامل K_{13} برابر $\binom{13}{2} = 91$ است،

می‌توانستیم این طور نتیجه‌گیری کنیم که $p = 13$ و $r = 6$.


گزینه ۸: ذهن خودتون رو در دیگر روابط پیچیده

نکنید، چرا که کلید حل این سؤال در رسماً گراف است.

در این گراف مرتبه‌ی ۷، یک رأس درجه ۶ (Full درجه) داریم، که

مطابق شکل زیر، رسماً گراف را از آن شروع کرده و به ترتیب به رأس‌های

درجه‌ی ۵ و ۴ می‌رسیم:



سه رأس مشخص شده، مربوط به درجات a , b و c هستند که مطابق نمودار، مقدار اولیه برای مجموع آن‌ها $a+b+c = 3+3+2 = 8$ است.


بسته به این که بین سه رأس a , b و c می‌تواند ۱، ۲ یا ۳ یال وجود داشته

باشد، سه مقدار دیگر $10, 12, 14$ برای $a+b+c$ نیز به دست می‌آید.

بنابراین ۴ مقدار $8, 10, 12, 14$ به دست می‌آید.



همچنان ناهمبند (و البته ساده) بماند، مربوط به حالتی است که نمودار گراف به صورت اجتماع یک K_4 باشد، یعنی نمودار زیر:



تعداد این یال‌های افزودنی به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\left[\binom{6}{2} + \binom{2}{2} \right] - 4 = (15+1) - 4 = 12$$

۳۴- گزینه ۳


طبق تعریف، فاصله‌ی دو رأس u_6 و u_7 از

هم، طول کوتاهترین مسیر بین u_6 و u_7 است.

با توجه به صورت سؤال، فاصله‌ی رأس a از تمام رأس‌ها برابر ۱ است و

این یعنی رأس a با تمام رأس‌ها مجاور است و در نتیجه نمودار آن به

صورت زیر است که کمترین تعداد یال ممکن را دارد:




با توجه به نمودار گراف، در این گراف (به اصطلاح «درخت ستاره‌ای») هر مسیر به طول ۲ به صورت $u_i - a - u_j$ است که در آن u_i و u_j دو رأس متمایز از بین رؤوس u_1 تا u_5 است.

تعداد چنین مسیرهایی به طول ۲ برابر است با «تعداد انتخاب‌های دو

$$\binom{6}{2} = 15$$


با توجه به صورت سؤال، نمودار زیر رسم می‌شود:



در این گراف (به اصطلاح «گراف دوبخشی کامل») تمام رؤوس بخش بالا با تمام رؤوس بخش پایین، مجاور بوده و در هر بخش (چه بالا، چه پایین)، هر دو رأس غیرمجاور هستند.

مسیر به طول ۴ از a به b را می‌توان به صورت زیر در نظر گرفت که رأس‌های دوم و چهارم را باید از بین ۳ رأس بخش پایین و رأس سوم را از بین ۲ رأس c و d انتخاب کرد، پس تعداد چنین مسیرهایی برابر است با:

$$3 \times 2 \times 2 = 12$$




با توجه به دو حالت فوق نتیجه می‌گیریم که δ هر مقدار صحیحی بین $\min(\delta)$ و $\max(\delta)$ را می‌تواند بپذیرد، یعنی یکی از ۵ مقدار ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ است.

۳۰- گزینه ۳

یک جمله‌ی حکیمانه: با توجه به شرط مسئله یعنی $\delta = 3$ ، برای یافتن حداقل تعداد رؤوس، تا می‌توانی به سمت گراف کامل برو!

ابتدا یک رأس از درجه‌ی $\delta = 3$ رسم می‌کنیم. برای رسم ۱۲ یال باقی‌مانده، چون $q(K_5) < 12 < q(K_6)$ ، حداقل نیاز به ۶ رأس دیگر خواهیم داشت، پس این گراف حداقل ۷ رأس دارد.



این قسمت، شامل ۱۲ یال است که با حداقل ۶ رأس رسم می‌شود.

آزمون ۴

۳۱- گزینه ۲

نکته در یک گراف ساده از مرتبه‌ی p :

اولاً $\binom{p}{2} \leq q$ است، زیرا در غیر این صورت، گراف غیرساده خواهد بود! ثانیاً اگر $p-1 < q$ باشد، قطعاً ناهمبند است؛ به بیان دیگر، اگر $q \geq p-1$ باشد، نموداری همبند می‌توان برای آن رسم کرد.

$p+q=8$	→	<table border="1"> <tr><td>p</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr> <tr><td>9</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	p	1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	6	5	4	3	2	1	0	غیرساده	نامبند	گراف G
p	1	2	3	4	5	6	7	8															
9	7	6	5	4	3	2	1	0															

از آن جا که گراف کامل مرتبه‌ی 4 ، (K_4) $= \binom{4}{2} = 6$ یال دارد، لذا با افزودن ۲ یال جدید به گراف G ، کامل خواهد شد.

مسیر به طول ۴ از ۵ رأس تشکیل می‌شود که طبق صورت سؤال، a و b باید جزء آن‌ها باشند. لذا ۳ رأس دیگر

این مسیر را باید از بین ۴ رأس باقی‌مانده‌ی K_4 انتخاب کرد که به $\binom{4}{3} = 4$ حالت صورت می‌گیرد.


حال باید تعداد جایگشت‌های این ۵ رأس را حساب کرده و حاصل را بر 2 تقسیم کنیم، زیرا برگشت هر مسیر، مسیر جدید به حساب نمی‌آید.

پس تعداد مسیرهای موردنظر برابر است با:

$$\binom{4}{3} \times \frac{5!}{2} = 4 \times \frac{120}{2} = 240$$

گراف ۱ منظم از مرتبه‌ی 8 به صورت $\square \square \square \square$ است. حداکثر تعداد یال‌های افزودنی به این گراف، برای آن که





۳۹- گزینه ۳

یک ایده خوب: در یک گراف با مرتبه و اندازه‌ی ثابت، برای این‌که بخش‌های جدا از هم بیشتری داشته باشیم، باید تا حد امکان رأس ایزوله‌ی بیشتری داشته باشیم، یعنی یال‌های

گراف را با رئوس کم‌تری رسم کنیم.

از آن‌جا که $\binom{6}{2} < \binom{7}{2} < \binom{18}{2}$ ، پس $= 18 = q$ یال را با حداقل ۷ رأس می‌توان رسم کرد که با $15 - 7 = 8$ رأس ایزوله‌ی باقی‌مانده، در مجموع ۱۶ بخش جدا از هم (حداکثر مقدار ممکن) را تشکیل می‌دهند.


۴۰- گزینه ۴

توجه کنید که کلاس‌های همارزی در رابطه‌ی «وجود مسیر در گراف»، همان بخش‌های جدا از هم (مؤلفه‌های همبندی) گراف را مشخص می‌کنند. پس با توجه به صورت سؤال، این

گراف از ۴ بخش جدا از هم تشکیل شده است.

نکته یک گراف اویلری است، اگر و فقط اگر، اولاً همبند بوده، ثانیاً درجه‌ی تمام رئوس آن زوج باشد.


چون هر ۴ بخش گراف فوق، اویلری است، پس هر کدام از بخش‌ها حداقل دارای ۳ رأس و درجه‌ی هر رأس حداقل ۲ است. طبق فرض، این گراف ۱۲ رأس دارد، لذا تنها نمودار زیر را می‌توان برای آن رسم کرد که ۱۲ یال دارد:



آزمون ۵

۴۱- گزینه ۵

فرض می‌کنیم سه رأس از درجه‌ی ۵، ۶، ۷ با درجه‌ی بیشتر از ۱ باشند و نمودار آن را رسم می‌کنیم.



مطلوب شکل، تعداد رئوس درجه‌ی ۱ برابر است با:

$$(5+4+3)+2=14$$

توجه نمودار این درخت را طوری رسم کردیم که خودت بتونی یک رابطه برای تعداد رئوس درجه‌ی ۱ پیدا کنی.

۴۲- گزینه ۶

از آن‌جا که تعداد یک‌های ماتریس مجاورت گراف ساده‌ی G ، ۲ برابر تعداد یال‌های آن است. پس $2q = 4$ و در نتیجه $q = 2$.

۳۶- گزینه ۱

نکته در یک گراف ساده‌ی همبند، حدود تعداد یال‌ها به صورت

$p-1 \leq q \leq \frac{p}{2}$ است؛ به بیان دیگر اگر اندازه‌ی گرافی در این ناساوا صدق کند، می‌توان برای آن، نموداری همبند رسم کرد. کافی است اعداد گزینه‌ها را تجزیه کرده و رابطه‌ی (*) را در مورد آن بررسی کنیم.

گزینه ۲

$$p \times q = 27$$

p	q
1	27
27	1
3	9
9	9

گزینه ۱

$$24 = 4 \times 6$$



گزینه ۳

$$p \times q = 32$$

p	q
1	32
32	1
2	16
16	2
4	8
8	4

گزینه ۲

$$p \times q = 28$$

p	q
1	28
28	1
2	14
14	2
4	7
7	4

گراف همیلتونی از مرتبه‌ی ۸، شامل دوری به طول ۸ (شامل تمام رئوس) است که در آن صورت درجه‌ی تمام رأس‌ها حداقل برابر ۲ خواهد بود.

از آن‌جا که این گراف $10 = 8 + 2$ یال دارد و شامل رأسی از درجه‌ی ۴ است، پس مطابق نمودار زیر، هر ۲ یال باقی‌مانده باید به یک رأس متصل باشد:



مطلوب شکل، این گراف ۶ دور دارد.

توجه چون در این سؤال، تعداد دورها را خواسته و طول آن‌ها مهم نیست، پس چگونگی اتصال ۲ یال باقی‌مانده به رأس درجه‌ی ۴ تأثیری در جواب ندارد.

۳۷- گزینه ۴

یک راهکار و توصیه‌ی حکیمانه: تا می‌توانی

با مسئله، ساده برخورد کن!

در این سؤال، دور به طول ۵ در گراف مرتبه‌ی ۶، یعنی این که یک رأس و یال‌های متصل به آن را حذف کن و باقی‌ی رئوس یک دور به طول ۵ بساز.

در این گراف، مطابق شکل زیر ۶ دور به طول ۵ وجود دارد.

۳۸- گزینه ۵


با مسئله، ساده برخورد کن!



می‌دانیم ماتریس مجاورت گراف G از مرتبه p و اندازه‌ی q دارد
 p^2 درایه است که تعداد یک‌ها و صفرهای آن به ترتیب $2q$ و $2 - 2q$ است، پس تعداد صفرهای ماتریس مجاورت این درخت برابر می‌شود با $.2 - 2(6) = 37$

۴۶- گزینه ۳
 اولاً یک ویژگی مهم در درخت (که تنها در درخت برقرار است) اینه که «بین هر دو رأس آن، فقط یک مسیر وجود دارد.»، پس گراف فوق، یک درخت است.
 ثانیاً در درخت با بیش از یک رأس ($p \geq 2$)، مینیمم درجه رئوس برابر $\delta = 1$ است.


پس از رابطه $\Delta - 1 = 2 - \delta$ نتیجه می‌گیریم که: $\Delta = 3$ لذا خواسته‌ی سؤال، تعداد درخت‌های مرتبه $\Delta = 6$ با ماکزیمم درجه رأس $= 3$ است که مطابق شکل ۳ نمودار برای آن وجود دارد:



ماتریس مجاورت این گراف 28 درایه‌ی

یک دارد، پس:
 $2q = 28 \Rightarrow q = 14$
 این گراف (با مشخصات $p=6, q=14$) از گراف کامل هم‌مرتبه‌اش K_6 ، یک یال کمتر دارد. پس باید تعداد دورهای به طول 3 در K_6 را حساب کنیم و ببینیم با حذف یک یال از آن، چند دور به طول 3 حذف می‌شود.

تعداد دورهای به طول 3 در این گراف به صورت زیر به دست می‌آید:




$$\binom{6}{3} - \binom{4}{1} = 20 - 4 = 16$$

↑ تعداد دورهای به طول ۳
↑ به طول ۳
شامل یال ab در K_6

۴۷- گزینه ۱
 برای این درخت، دو حالت می‌تواند وجود داشته باشد.


حالات ۱ رئوس از درجه 3 و 4 مجاور باشند؛ که در این صورت رأس درجه 2 یا با رأس درجه 3 مجاور است یا با رأس درجه 4 .

حالات ۲ رئوس از درجه 3 و 4 مجاور نباشند.



پس در مجموع 3 درخت با دنباله درجه رأس‌های فوق وجود دارد.

۴۳- گزینه ۴
 چون تعداد یک‌های هر سطر در ماتریس مجاورت یک گراف ساده برابر است با درجه‌ی رأس متناظر در آن گراف، پس با توجه به صورت سؤال، این درخت مرتبه 7 ، یک رأس از درجه‌ی 5 دارد. با رسم این رأس درجه 5 ، می‌باید رأس هفتم را به یکی از 5 رأس مجاور با رأس درجه 5 متصل کنیم که نمودار زیر به دست می‌آید:



همان‌طور که می‌بینید، این درخت یک رأس از درجه 5 ، $\Delta = 5$ ، یک رأس از درجه 2 و پنج رأس از درجه $1 = \delta = 1$ دارد.

توجه ۱ چون درخت، گرافی همبند و فاقد دور است، فقط همین نمودار قابل رسم است و لاغیر!


۴۴- گزینه ۲
 در یک گراف ساده‌ی مرتبه 6 ، اولاً باید تمامی درجه‌های رئوس کوچک‌تر مساوی 5 باشند، ثانیاً تعداد رئوس فرد عددی زوج باشد.

گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:


گزینه ۱ هر 6 رأس را از درجه‌ی صفر می‌گیریم (یعنی گراف همه از مرتبه 6 ، که حاصل ضرب درجه‌های رئوس آن برابر صفر می‌شود). ✓

گزینه ۲ عدد 90 فقط یک عامل 2 دارد ($90 = 2 \times 45$)، پس اگر حاصل ضرب 6 عدد برابر 90 باشد، فقط یکی از آن‌ها زوج بوده و 5 تایی دیگر فرد است که در این صورت نمی‌توانند درجهات رئوس یک گراف ساده از مرتبه 6 باشند. ✗

گزینه ۳ با توجه به تجزیه $135 = 5 \times 3^3$ ، کافی است درجه‌های رئوس را $1, 1, 3, 3, 3, 3$ در نظر بگیریم که نمودار این گراف به صورت زیر است:



گزینه ۴ با توجه به تجزیه $288 = 2^5 \times 3^3$ ، کافی است درجه‌های رئوس را $2, 2, 3, 3, 3, 3$ در نظر بگیریم که شکل زیر، نمودار آن است:



۴۵- گزینه ۴
 همان درخت است که در آن رابطه $p = q - 1$ برقرار است.

$$p = 7 \quad \frac{q=p-1}{q+q=13} \quad \begin{cases} p = 7 \\ q = 6 \end{cases}$$

طبق فرض



۴۹- گزینه ۲

نکته تنها در درخت است که بین هر دو رأس آن، دقیقاً یک مسیر وجود دارد.

در این درخت، رابطه‌ی $p - q = 1$ برقرار است، پس:

$$\begin{cases} \text{رأس درجه‌ی } 3 \\ \text{رأس درجه‌ی } k \\ \text{رأس درجه‌ی } 2 \\ \text{رأس درجه‌ی } 1 \end{cases} : \begin{array}{l} \text{درخت} \\ \Rightarrow p = k + 12 \\ \Rightarrow q = k + 11 \\ \Rightarrow 5 = k + 12 \\ \Rightarrow k = 1 \end{array}$$

با توجه به رابطه‌ی $\sum \deg v_i = 2q$ داریم:

$$k \times 3 + 5 \times 2 + 7 \times 1 = 2(k + 11) \Rightarrow 3k + 17 = 2k + 22 \Rightarrow k = 5$$

۵۰- گزینه ۱

درايههای واقع در سطر ۱ام و ستون ۱ام

ماتریس A^T (درايههای قطری)، همان درجات رئوس متناظر است.

پس 1° عدد ۱، 1° عدد ۱، 1° عدد ۱، 1° عدد ۲، 2° عدد ۲، 2° عدد ۳، 2° عدد ۴، دنباله‌ی درجه‌ی رأس‌های

گراف همبند G را تشکیل می‌دهند:

از آن‌جا که رسم نمودار گراف G راحت نیست، ابتدا سراغ اندازه‌ی گراف

می‌رویم:

$$2q = \sum \deg v_i = 4 + 3 + 2 + 2 + 2 + 1 + \dots + 1 = 18 \Rightarrow q = 9$$

دقت کنید که اندازه‌ی گراف، یک واحد از مرتبه‌ی آن کمتر شد، یعنی $q = p - 1$ که با توجه به همبندبودن گراف، نتیجه‌ی می‌گیریم که این گراف، حتماً باید درخت باشد، یعنی فاقد دور است، پس برای یافتن دورهای آن نیازی به رسم نمودارش نیست.

یک نتیجه‌گیری مهم: اگر در گرافی حداقل دو شرط از سه شرط

$q = p - 1$ ، همبندبودن و فاقد دور بودن، برقرار بود، آن گراف حتماً درخت بوده و تمام ویژگی‌های درخت در مورد آن برقرار است.