

فصل اول

درس اول

مجموع جملات دنباله‌های حسابی و هندسی

دنباله حسابی و مجموع جملات آن

دنباله حسابی: دنباله‌ای است که هر جمله آن (به جز جمله اول)، با اضافه کردن عددی ثابت به جمله قبلی به دست می‌آید. این عدد ثابت را قدرنسبت دنباله می‌گوییم. قدرنسبت را با d و جمله اول را با a_1 یا a نمایش می‌دهیم. در شکل کلی، جملات یک دنباله حسابی را به صورت زیر می‌نویسیم:

$$a_1, \underbrace{a_1+d}_{a_2}, \underbrace{a_1+2d}_{a_3}, \underbrace{a_1+3d}_{a_4}, \dots, \underbrace{a_1+(n-1)d}_{a_n}, \dots$$

$$a_{n+1} = a_1 + (n-1)d : \text{جمله عمومی}$$

بنابراین جمله عمومی دنباله حسابی یا همان جمله n به صورت مقابل می‌باشد:
در این رابطه، n تعداد جملات است.

می‌دانیم اگر هر جمله را از جمله بعدی کم کنیم، قدرنسبت به دست می‌آید، پس به طور کلی داریم:

$$a_{n+1} - a_n = d$$

مثال: در یک دنباله حسابی، جمله پنجم -2 و جمله دوازدهم 19 است. جمله عمومی دنباله را مشخص کنید.

$$\begin{cases} a_5 = -2 \Rightarrow a_1 + 4d = -2 \\ a_{12} = 19 \Rightarrow a_1 + 11d = 19 \end{cases} \Rightarrow d = 3, a_1 = -14$$

پاسخ: از رابطه $d = a_1 + (n-1)d$ استفاده می‌کنیم:

$$a_n = a_1 + (n-1)d \Rightarrow a_n = -14 + 3(n-1) \Rightarrow a_n = 3n - 17$$

نکته: اگر a_m و a_n دو جمله از یک دنباله حسابی باشند، آن‌گاه خواهیم داشت:

$$a_m - a_n = (m-n)d$$

برای مثال، در سؤال قبل که $a_5 = -2$ و $a_{12} = 19$ است، داریم:

$$a_{12} - a_5 = (12-5)d \Rightarrow 19 - (-2) = 7d \Rightarrow 21 = 7d \Rightarrow d = 3$$

واسطه حسابی: اگر a , b و c تشکیل دنباله حسابی دهند، آن‌گاه $b = \frac{a+c}{2}$ است. در این حالت می‌گوییم b واسطه حسابی a و c می‌باشد.

رابطه اندیس‌ها: اگر a_k , a_p , a_n , a_m جملاتی از یک دنباله حسابی باشند که رابطه $m+n=p+k$ بین اندیس‌ها برقرار باشد، آن‌گاه همواره داریم:

$$a_m + a_n = a_p + a_k$$

از این رابطه می‌توان نتیجه گرفت که هر جمله، واسطه حسابی بین دو جمله‌ای است که به یک فاصله از طرفین آن قرار دارد.

$$\underbrace{a_{n-k}, \dots, a_n, \dots, a_{n+k}}_{\text{جمله قبل } k} \quad a_{n-k} + a_{n+k} = 2a_n$$

برای مثال با توجه به رابطه اندیس‌ها داریم:

$$a_4 + a_{10} = a_5 + a_9 = 2a_7 ; \quad a_5 + a_{14} + a_{17} = 3a_{12}$$

بررسی یک اشتباه متداول: توجه داشته باشید که در رابطه اندیس‌ها، علاوه‌بر این‌که باید جمع اندیس‌ها در دو سمت تساوی برابر باشد، تعداد جملات نیز باید برابر باشد. پس دقت داشته باشید که:

$$\underbrace{a_4 + a_{10}}_{\text{یک جمله}} \neq \underbrace{a_{14}}_{\text{دو جمله}} ; \quad \underbrace{a_5 + a_{14} + a_{17}}_{\text{سه جمله}} \neq \underbrace{2a_{12}}_{\text{دو جمله}}$$

تسنی: اگر در یک دنباله حسابی $a_1 = 1$ و $a_2 = \frac{5}{3}$ باشد، حاصل کدام است؟

$$\frac{21}{17}(4)$$

$$\frac{7}{17}(3)$$

$$\frac{105}{71}(2)$$

$$\frac{35}{71}(1)$$

پاسخ: قدرنسبت این دنباله برابر است با $d = a_2 - a_1 = \frac{2}{3}$. حال با توجه به رابطه اندیس‌ها داریم:

$$\frac{a_{15} + a_{17} + a_{19}}{a_{33} + a_{35} + a_{37}} = \frac{3a_{17}}{3a_{35}} = \frac{a_{17}}{a_{35}} = \frac{a_1 + 16d}{a_1 + 34d} = \frac{1 + 16\left(\frac{2}{3}\right)}{1 + 34\left(\frac{2}{3}\right)} = \frac{3 + 32}{3 + 68} = \frac{35}{71}$$

پس گزینه (1) صحیح است.

درج m واسطه حسابی بین دو عدد: چنان‌چه بخواهیم بین دو عدد a و b تعداد m جمله قرار دهیم، به طوری که کلیه اعداد با هم تشکیل یک دنباله حسابی بدنهند، اصطلاحاً به این عمل درج m واسطه حسابی می‌گویند. در این حالت چون m جمله درج می‌کنیم، با احتساب جملات a و b در کل $2 + m$ جمله وجود دارد. پس برای تعیین قدرنسبت، کافی است a_{m+2} را تشکیل داد.

$$\begin{array}{ccccccc} a, & \textcircled{O}, & \textcircled{O}, & \dots, & \textcircled{O}, & b \\ \downarrow & & & & \downarrow & \\ a_1 & & & & a_{m+2} & \end{array}$$

مثال: بین اعداد ۲ و ۲۷ چهار واسطه حسابی درج کنید.

پاسخ: روش اول: چون چهار واسطه درج می‌کنیم، پس دنباله حاصل شش جمله دارد که جمله اول برابر ۲ و جمله ششم برابر ۲۷ است:

$$\begin{array}{ccccccc} 2, & \textcircled{O}, & \textcircled{O}, & \textcircled{O}, & \textcircled{O}, & 27 \\ \downarrow & & & & \downarrow & \\ a_1 & & & & a_6 & \end{array}$$

$$a_n = a_1 + (n - 1)d \Rightarrow a_6 = a_1 + 5d \Rightarrow 27 = 2 + 5d \Rightarrow d = 5$$

بنابراین واسطه‌ها به صورت ۲۲، ۱۷، ۱۲ و ۷ به دست می‌آیند.

روش دوم:

نکته: برای درج m واسطه حسابی بین دو عدد a و b به کمک رابطه زیر، قدرنسبت را به دست می‌آوریم:

$$\begin{array}{ccccccc} a, & \textcircled{O}, & \textcircled{O}, & \dots, & \textcircled{O}, & b \\ \downarrow & & & & \downarrow & \\ a_1 & & & & a_{m+2} & \end{array}$$

$$d = \frac{b - a}{m + 1}$$

به کمک نکته بالا داریم:

$$d = \frac{27 - 2}{5} = 5 \Rightarrow 7, 12, 17, 22$$

نکته: جمله عمومی یک دنباله حسابی، عبارتی درجه اول بر حسب n است:

$$a_n = a + (n - 1)d = a + nd - d \Rightarrow a_n = \underset{A}{\underbrace{d n}} + \underset{B}{\underbrace{a - d}} = An + B$$

مالحظه می‌شود که در رابطه جمله عمومی دنباله حسابی، ضریب n ، برابر قدرنسبت می‌باشد.

مثال: کدام‌یک از عبارات زیر می‌تواند جمله عمومی یک دنباله حسابی باشد؟

$$\text{الف) } c_n = -\frac{n}{2} + 3$$

$$\text{ب) } b_n = \frac{n}{n+1}$$

$$\text{ج) } a_n = n^2 + 2n$$

پاسخ: عبارات «الف» و «ب» چون چندجمله‌ای درجه اول نیستند، پس نمی‌توانند جمله عمومی دنباله حسابی باشند، اما «ج» جمله عمومی یک دنباله حسابی با قدرنسبت $\frac{1}{2}$ می‌باشد. (ضریب n ، برابر قدرنسبت است).

مجموع جملات دنباله حسابی

در هر دنباله، مجموع n جمله اول را با S_n نمایش می‌دهند:

در یک دنباله حسابی با جمله اول a_1 برای محاسبه S_n کافی است، مجموع جمله اول و جمله n را در نصف تعداد جملات، ضرب کنیم:

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

اگر در رابطه بالا از تساوی $a_n = a_1 + (n - 1)d$ استفاده کنیم، خواهیم داشت:

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n - 1)d)$$

بدیهی است که هرگاه جمله اول و قدرنسبت را داشتیم، از این رابطه و اگر به جای قدرنسبت، a_n را داشتیم از رابطه قبلی برای محاسبه مجموع جملات استفاده می‌کنیم.

در رابطه S_n ، مجموع $1 - n$ جمله اول، یعنی $a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}$ برابر است با S_{n-1} ، پس نتیجه می‌گیریم:

$$S_n = \underbrace{a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}}_{S_{n-1}} + a_n \Rightarrow S_n = S_{n-1} + a_n$$

بنابراین با در اختیار داشتن S_n می‌توان به کمک رابطه زیر، جمله عمومی دنباله را تعیین کرد:

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

مثال: در دنباله حسابی ۱,۴, ۷, ۱۰, ۱۳, ۱۶,... مجموع بیست جمله اول را به دست آورید.

پاسخ: جمله اول دنباله برابر ۱ و قدرنسبت برابر $-3 = -7 - 4$ می‌باشد، بنابراین:

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n - 1)d) \Rightarrow S_{20} = \frac{20}{2}(2(1) + 19(-3)) = 10(14 - 57) = 10(-43) = -430$$

مثال: مجموع اعداد طبیعی ۱ تا n را به دست آورید.

پاسخ: مقدار $n + \dots + 1 + 2 + \dots$ حاصل جمع n جمله اول یک دنباله حسابی با $a_1 = 1$ و $a_n = n$ است. پس طبق رابطه (n) مقدار آن برابر $\frac{n(n+1)}{2}$ می‌شود.

نتیجه: مجموع اعداد طبیعی ۱ تا n برابر است با:

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

تست: در یک دنباله حسابی، مجموع n جمله اول از رابطه $S_n = 3n^2 + 5n$ به دست می‌آید. جمله عمومی دنباله کدام است؟

$$a_n = 6n + 1 \quad (۱)$$

$$a_n = 14n - 2 \quad (۲)$$

$$a_n = 6n + 2 \quad (۳)$$

پاسخ: روش اول: با توجه به این‌که $S_1 = a_1$, $S_2 = a_1 + a_2$, $S_3 = a_1 + a_2 + a_3$ است داریم:

$$\begin{cases} S_1 = 3 + 5 = 8 \Rightarrow a_1 = 8 \\ S_2 = 3(2)^2 + 5(2) = 22 \Rightarrow a_1 + a_2 = 22 \xrightarrow{a_1 = 8} a_2 = 14 \end{cases} \Rightarrow d = a_2 - a_1 = 14 - 8 = 6$$

$$a_n = a_1 + (n-1)d \Rightarrow a_n = 8 + (n-1)(6) = 6n + 2$$

روش دوم: از رابطه $a_n = S_n - S_{n-1}$ استفاده می‌کنیم:

$$a_n = S_n - S_{n-1} = 3n^2 + 5n - (3(n-1)^2 + 5(n-1)) = 3n^2 + 5n - (3n^2 - 6n + 3 + 5n - 5)$$

$$= 3n^2 + 5n - (3n^2 - n - 2) = 6n + 2$$

بنابراین گزینه (۱) صحیح است.

تست: یک دنباله حسابی دارای ۲۹ جمله است. اگر مجموع سه جمله وسط برابر ۱۸ باشد، مجموع ۲۹ جمله برابر کدام است؟

$$182 \quad (۴)$$

$$162 \quad (۳)$$

$$168 \quad (۲)$$

$$174 \quad (۱)$$

پاسخ: چون دنباله ۲۹ جمله دارد، جمله وسط، جمله پانزدهم است ($\frac{29+1}{2} = 15$), در نتیجه داریم:

$$a_{14} + a_{15} + a_{16} = 18 \xrightarrow{\text{رابطه اندیس ها}} 3a_{15} = 18 \Rightarrow a_{15} = 6$$

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \Rightarrow S_{29} = \frac{29}{2}(a_1 + a_{29}) \xrightarrow{\text{رابطه اندیس ها}} \frac{29}{2}(2a_{15}) = 29 \times 6 = 174$$

پس گزینه (۱) صحیح است.

تست: در یک دنباله حسابی $S_8 - S_5 = 7$ می‌باشد. حاصل عبارت $a_4 + a_5 + \dots + a_8$ کدام است؟

$$\frac{49}{3} \quad (۴)$$

$$49 \quad (۳)$$

$$\frac{14}{3} \quad (۲)$$

$$14 \quad (۱)$$

پاسخ: می‌دانیم $S_8 = a_1 + a_2 + \dots + a_8$ و $S_5 = a_1 + a_2 + \dots + a_5$ است، پس نتیجه می‌گیریم:

$$S_8 - S_5 = a_6 + a_7 + a_8 = 7 \xrightarrow{\text{رابطه اندیس ها}} 3a_7 = 7 \Rightarrow a_7 = \frac{7}{3}$$

$$a_4 + a_5 + \dots + a_8 = (a_4 + a_1) + (a_5 + a_2) + (a_6 + a_3) + a_7 = 2a_7 + 2a_7 + 2a_7 + a_7 = 7a_7 = 7\left(\frac{7}{3}\right) = \frac{49}{3}$$

بنابراین گزینه (۴) صحیح است.

نکته: در یک دنباله حسابی، مجموع تعداد فردی از جملات هم‌فاصله، با حاصل ضرب جمله وسط در تعداد جملات برابر است.

برای مثال در تست قبل داریم:

$$a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8 + a_9 + a_{10} = 7a_7$$

↓
جمله وسط

نکته: مجموع n جمله اول یک دنباله حسابی (S_n), عبارتی درجه دوم بر حسب n است:

$$S_n = \frac{n}{2}(2a + (n-1)d) = an + \frac{n^2}{2}d - \frac{n}{2}d \Rightarrow S_n = \underbrace{\frac{d}{2}n^2}_{A} + \underbrace{(a - \frac{d}{2})n}_{B} = An^2 + Bn$$

مالحظه می‌شود که در رابطه S_n , عدد ثابت وجود ندارد و ضریب n^2 برابر نصف قدرنسبت است.

تسنیت: مجموع n جمله اول یک دنباله حسابی از رابطه $S_n = pn^q + (q+3)n + q$ به دست می‌آید. اگر قدرنسبت برابر ۴ باشد، جمله پنجم دنباله کدام است؟

(۲۱) ۴

(۳۲) ۳

(۳۷) ۲

(۴۲)

پاسخ: در رابطه S_n ، نباید عدد ثابت داشته باشیم، پس $q = 0$ است. از طرفی ضریب n^q برابر نصف قدرنسبت $(\frac{d}{2})$ می‌باشد،
 $S_n = 2n^q + 3n$ یعنی $2 = \frac{p}{2}$ است. بنابراین S_n به صورت زیر در می‌آید:

$$a_1 = S_1 = 2 + 3 = 5 ; a_5 = a_1 + 4d = 5 + 4(4) = 21$$

بنابراین گزینه (۴) صحیح است.

دنباله هندسی و مجموع جملات آن

دنباله هندسی: دنباله‌ای است که هر جمله آن (به جز جمله اول)، از ضرب جمله قبل در یک عدد ثابت به دست آمده باشد. عدد ثابت را قدرنسبت دنباله می‌گوییم. قدرنسبت را با q و جمله اول را با a_1 یا a نمایش می‌دهیم. در شکل کلی، جملات یک دنباله هندسی را به صورت زیر می‌نویسیم:

$$a_1, \underbrace{a_2}_{a_1q}, \underbrace{a_3}_{a_1q^2}, \underbrace{a_4}_{a_1q^3}, \dots, \underbrace{a_n}_{a_1q^{n-1}}, \dots$$

$$a_n = a_1 q^{n-1} : \text{جمله عمومی}$$

بنابراین جمله عمومی دنباله هندسی یا همان جمله n به صورت مقابل است:در این رابطه، n تعداد جملات است.

می‌دانیم حاصل تقسیم هر جمله (به جز جمله اول) به جمله قبل برابر است با قدرنسبت، پس به طور کلی داریم:

$$q = \frac{a_n}{a_{n-1}} \quad (n > 1)$$

نکته: در یک دنباله هندسی اگر جمله اول مثبت (منفی) باشد، آنگاه داریم:۱) $q = 1$: جملات دنباله صعودی (نزولی) هستند.۲) $q < 0$: جملات دنباله نزولی (صعودی) هستند.

توجه: اگر هر جمله یک دنباله (به جز جمله اول) بزرگ‌تر یا مساوی جمله قبل خود باشد، دنباله صعودی و اگر هر جمله، کوچک‌تر یا مساوی جمله قبل خود باشد، دنباله نزولی است.

واسطه هندسی: اگر اعداد a , b و c تشکیل دنباله هندسی بدeneند، آنگاه $b^2 = ac$ است. در این حالت می‌گوییم، b واسطه هندسی a و c می‌باشد.

تسنیت: اعداد 2^3 , $4\sqrt{2}$, 2^b سه جمله متواالی از یک دنباله هندسی هستند. واسطه عددی بین a و b کدام است؟(۴) $\sqrt{2}$ (۳) $1/5$

(۲)

(۱) $2/5$

$$(4\sqrt{2})^2 = 2^b \times 2^3 \Rightarrow 32 = 2^{a+b} \Rightarrow 32 = 2^{a+b} \Rightarrow a+b = 5$$

پاسخ:در نتیجه، واسطه حسابی (عددی) بین a و b برابر $\frac{a+b}{2} = \frac{5}{2}$ می‌باشد. بنابراین گزینه (۱) صحیح است.

درج m واسطه هندسی بین دو عدد: چنان‌چه بخواهیم بین دو عدد a و b ، تعداد m جمله قرار دهیم، طوری که کلیه اعداد با هم تشکیل یک دنباله هندسی بدeneند، اصطلاحاً به این عمل درج m واسطه هندسی می‌گویند. در این حالت چون m جمله درج می‌کنیم با احتساب جملات a و b در کل $2 + m$ جمله وجود دارد. پس برای تعیین قدرنسبت، کافی است a_{m+2} را تشکیل داد.

$$a_1, \underbrace{\mathcal{O}, \mathcal{O}, \dots, \mathcal{O}}_m, b$$

مثال: بین اعداد $\frac{1}{4}$ و -8 چهار واسطه هندسی درج کنید.**پاسخ:** چون چهار واسطه، درج می‌کنیم، پس دنباله حاصل، شش جمله دارد که جمله اول برابر $\frac{1}{4}$ و جمله ششم برابر -8 است:

$$\frac{1}{4}, \underbrace{\mathcal{O}, \mathcal{O}, \mathcal{O}, \mathcal{O}}_4, -8$$

$$a_n = a_1 q^{n-1} \Rightarrow a_5 = a_1 q^4 \Rightarrow -8 = \frac{1}{4} q^4 \Rightarrow q^4 = -32 \Rightarrow q = -2$$

بنابراین واسطه‌ها به صورت $1, -2, 4, -8$ به دست می‌آیند.**تذکر:** برای درج m واسطه هندسی بین دو عدد a و b از رابطه $q^{m+1} = \frac{b}{a}$ نیز می‌توان قدرنسبت را تعیین کرد.

مثال: آیا یک دنباله همی تواند هم یک دنباله هندسی باشد و هم یک دنباله حسابی؟

پاسخ: دنباله ثابت a, a, a, \dots, a , یک دنباله هندسی با قدرنسبت ۱ و یک دنباله حسابی با قدرنسبت صفر محسوب می‌شود. ($a \neq 0$)

تسنیع: در یک دنباله هندسی، حاصل ضرب ۹ جمله اول برابر ۸ است ($a_1 a_2 \cdots a_9 = 8$). حاصل ضرب $a_7 a_8 a_9$ برابر کدام است؟

۴) ۴

۲۷۲) ۳

۲۷۲) ۲

۲۷۲) ۱

پاسخ: با درنظر گرفتن $a_n = a_1 q^{n-1}$ داریم:

$$a_1 a_2 \cdots a_9 = 8 \Rightarrow a_1 (a_1 q) (a_1 q^2) \cdots (a_1 q^8) = a_1^9 q^{(1+2+\cdots+8)} = a_1^9 q^{36} = (a_1 q^4)^9 = 8 \Rightarrow a_1 q^4 = \sqrt[9]{8} = \sqrt[3]{2}$$

$$\text{یادآور می‌شویم که } 1 + 2 + \dots + 8 = \frac{8 \times 9}{2} = 36 \text{. حال داریم:}$$

$$a_7 a_8 a_9 = (a_1 q) (a_1 q^6) (a_1 q^8) = a_1^3 q^{16} = (a_1 q^4)^4 = (\sqrt[3]{2})^4 = 2\sqrt[3]{2}$$

بنابراین گزینه (۱) صحیح است.

رابطه اندیس‌ها: اگر $a_m, a_n, a_p, a_q, a_r, a_s$ جملاتی از یک دنباله هندسی باشند که رابطه $m+n=p+k$ بین اندیس‌ها برقرار باشد، آن‌گاه همواره داریم:

$$a_m a_n = a_p a_k$$

(توجه داشته باشید که از رابطه اندیس‌ها در دنباله هندسی کمتر استفاده می‌شود.)

برای مثال در یک دنباله هندسی، تساوی‌های زیر برقرارند:

$$a_4 a_{10} = a_5 a_9 = (a_7)^9 ; \quad a_6 a_9 a_{15} = a_7 a_{10} a_{13} = (a_{10})^9 ; \quad a_7 a_8 a_9 a_{10} = (a_5)^4$$

تسنیع: در یک دنباله هندسی مجموع جملات اول و دوم $\frac{9}{2}$ و مجموع جملات چهارم و پنجم ۳۶ می‌باشد. جمله سوم این دنباله کدام است؟

۱۲) ۴

۹) ۳

۸) ۲

۱) ۱

پاسخ:

$$\begin{cases} a_1 + a_2 = \frac{9}{2} \Rightarrow a_1 + a_1 q = \frac{9}{2} \\ a_4 + a_5 = 36 \Rightarrow a_1 q^3 + a_1 q^4 = 36 \end{cases} \xrightarrow{\text{ تقسیم دو رابطه }} \frac{a_1 + a_1 q}{a_1 q^3 + a_1 q^4} = \frac{\frac{9}{2}}{36} \Rightarrow \frac{a_1 (1+q)}{a_1 q^3 (1+q)} = \frac{9}{2 \times 36}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{q^3} = \frac{1}{\lambda} \Rightarrow q^3 = \lambda \Rightarrow q = 2$$

حال با توجه به رابطه $a_1 + a_1 q = \frac{9}{2}$ ، مقدار a_1 را تعیین می‌کنیم:

$$a_1 + a_1 q = \frac{9}{2} \xrightarrow{q=2} a_1 + 2a_1 = \frac{9}{2} \Rightarrow 3a_1 = \frac{9}{2} \Rightarrow a_1 = \frac{3}{2}$$

$$a_3 = a_1 q^2 = \frac{3}{2} (2)^2 = 6$$

بنابراین گزینه (۱) صحیح است.

تسنیع: در یک دنباله عددی (حسابی)، جملات اول، پنجم و یازدهم به ترتیب سه جمله متولی از یک دنباله هندسی صعودی‌اند، قدرنسبت این دنباله کدام است؟

۳) ۴

۲) ۳

۵) ۲

۶) ۵

پاسخ: روش اول: می‌دانیم اگر a, b و c سه جمله متولی یک دنباله هندسی باشند، آن‌گاه $b^2 = ac$ است. در این تسنیع، جملات اول (a_1, a_2)

پنجم (a_5, a_6) و یازدهم (a_11, a_12) از یک دنباله حسابی، سه جمله متولی یک دنباله هندسی هستند، پس داریم:

$$(a_1 + 4d)^2 = a_1 (a_1 + 10d) \Rightarrow a_1^2 + 16d^2 + 8a_1 d = a_1^2 + 10a_1 d \Rightarrow 16d^2 = 2a_1 d \xrightarrow{d \neq 0} a_1 = 8d$$

$$a_1, a_1 + 4d, a_1 + 10d \xrightarrow{a_1 = 8d} 8d, 12d, 18d : \text{جملات متولی دنباله هندسی}$$

می‌دانیم قدرنسبت در دنباله هندسی، از نسبت هر جمله به جمله قبلی به دست می‌آید، پس

روش دوم:

نکته: اگر در یک دنباله حسابی غیرثابت، جملات m, n, p و q ($p > n > m$)، به ترتیب جملات متولی از یک دنباله هندسی باشند،

آن‌گاه قدرنسبت دنباله هندسی از رابطه $q = \frac{p-n}{n-m}$ به دست می‌آید.

با توجه به نکته بالا $q = \frac{11-5}{5-1} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$ می‌باشد. بنابراین گزینه (۴) صحیح است.

مجموع جملات دنباله هندسی

$$S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$$

در یک دنباله هندسی با جمله اول a_1 و قدرنسبت q ، مجموع n جمله اول دنباله از رابطه مقابل به دست می‌آید: ($q \neq 1$)

از رابطه بالا در مواردی که $q = 1$ باشد، نمی‌توان استفاده کرد. بدینهی است در حالتی که قدرنسبت برابر ۱ باشد، دنباله ثابت a, a, \dots, a را داریم که مجموع n جمله اول آن از رابطه $S_n = na$ به دست می‌آید.

مثال: در یک دنباله هندسی، جمله اول برابر $\frac{1}{2}$ است. الف) وضعیت جملات دنباله از لحاظ صعودی یا نزولی بودن چگونه است؟ ب) مجموع ۸ جمله اول آن را به دست آورید.

پاسخ: الف) چون جمله اول منفی و قدرنسبت $1 < q < 0$ است، پس دنباله صعودی می‌باشد. البته با نوشتن چند جمله اول آن، این موضوع به سادگی قابل مشاهده است:

$$-3, -\frac{3}{2}, -\frac{3}{4}, -\frac{3}{8}, \dots$$

$$b) \text{ برای محاسبه } S_8 \text{ با استفاده از رابطه } S_n = \frac{a(1-q^n)}{1-q} \text{ داریم:}$$

$$S_8 = \frac{-3\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^8\right)}{1-\frac{1}{2}} = \frac{-3\left(1-\frac{1}{256}\right)}{\frac{1}{2}} = -6\left(1-\frac{1}{256}\right) = -6\left(\frac{255}{256}\right) = -\frac{765}{128}$$

نکته: در مسائل مربوط به دنباله‌های هندسی، از اعداد توان دار زیاد استفاده می‌شود، پس بهتر است برای این‌که سریع‌تر پاسخ بدھید آن‌ها را به خاطر بسپارید:

$2^3 = 8, 2^4 = 16, 2^5 = 32, 2^6 = 64, 2^7 = 128, 2^8 = 256, 2^9 = 512, 2^{10} = 1024$

$3^3 = 27, 3^4 = 81, 3^5 = 243, 3^6 = 64, 3^7 = 216, 3^8 = 625, 3^9 = 125$

تسنی: در یک دنباله هندسی، مجموع هشت جمله اول، $\frac{5}{4}$ مجموع چهار جمله اول آن است. جمله هفتم چند برابر جمله اول است؟

$$\frac{1}{4}(4) \quad \frac{5}{32}(3) \quad \frac{1}{8}(2) \quad \frac{1}{16}(1)$$

پاسخ: با توجه به رابطه ($q \neq 1$), داریم:

$$S_8 = \frac{5}{4}S_4 \Rightarrow \frac{a_1(1-q^8)}{1-q} = \frac{5}{4} \times \frac{a_1(1-q^4)}{1-q} \Rightarrow 1-q^8 = \frac{5}{4}(1-q^4) \xrightarrow{\text{اتحاد مزدوج}} (1-q^4)(1+q^4) = \frac{5}{4}(1-q^4)$$

$$\Rightarrow 1+q^4 = \frac{5}{4} \Rightarrow q^4 = \frac{1}{4} \Rightarrow q^2 = \frac{1}{2}$$

$$\frac{a_7}{a_1} = \frac{a_1 q^6}{a_1} = q^6 = (q^2)^3 = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$$

بنابراین گزینه (۲) صحیح است.

$$\frac{S_{2n}}{S_n} = q^{n+1}$$

($q \neq \pm 1$) جمله اول و مجموع n جمله اول رابطه زیر برقرار است:


به عنوان مثال، در تست قبل برای تعیین قدرنسبت می‌توان گفت:

$$\frac{S_8}{S_4} = q^4 + 1 \Rightarrow q^4 + 1 = \frac{5}{4} \Rightarrow \dots$$

تسنی: طول ضلع مربعی ۱ متر است. ابتدا $\frac{2}{3}$ از مساحت آن را رنگ کرده، سپس $\frac{2}{3}$ از مساحت باقی‌مانده را رنگ می‌کنیم.

به همین ترتیب در هر مرحله $\frac{2}{3}$ از مساحت باقی‌مانده را رنگ می‌کنیم. پس از چند مرحله حداقل $\frac{99}{5}$ درصد سطح مربع رنگ شده است؟

$$4(4) \quad 5(3) \quad 6(2) \quad 7(1)$$



پاسخ: روش اول: مساحت مربع اولیه برابر ۱ است. در مرحله اول $\frac{2}{3}$ از سطح مربع رنگ می‌شود. در مرحله دوم

$\frac{2}{3}$ از $\frac{1}{3}$ باقی‌مانده، یعنی $\frac{2}{9}$ رنگ می‌شود، در مرحله سوم نیز $\frac{2}{3}$ از $\frac{1}{9}$ باقی‌مانده، یعنی $\frac{2}{27}$ رنگ می‌شود و به

همین ترتیب، قسمتی از مربع که در هر مرحله رنگ می‌شود، تشکیل یک دنباله هندسی با جمله اول $\frac{2}{3} = a_1$ و

قدرнسبت $q = \frac{1}{3}$ می‌دهند:

$$\frac{2}{3}, \frac{2}{9}, \frac{2}{27}, \dots$$

$$S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{\frac{1}{3}(1-(\frac{1}{3})^n)}{1-\frac{1}{3}} = \frac{\cancel{\frac{1}{3}}(1-(\frac{1}{3})^n)}{\cancel{\frac{1}{3}}} = 1 - (\frac{1}{3})^n$$

$$S_n \geq \frac{99/5}{100} \Rightarrow 1 - (\frac{1}{3})^n \geq \frac{99/5}{100} \Rightarrow (\frac{1}{3})^n \leq 1 - \frac{99/5}{100} \Rightarrow (\frac{1}{3})^n \leq \frac{5/5}{100} \Rightarrow \frac{1}{3^n} \leq \frac{1}{200} \Rightarrow n \geq 5$$

یعنی از مرحله پنجم، حداقل $\frac{99/5}{100}$ درصد مربع رنگ شده است.

روش دوم: به جای این که بگوییم مجموع مساحت‌های رنگ شده بزرگ‌تر یا مساوی باشد، می‌گوییم باید مساحت قسمت رنگ نشده کم‌تر یا مساوی باشد.

در مرحله اول $\frac{1}{3}$ ، مرحله دوم $\frac{1}{27}$ ، مرحله سوم $\frac{1}{243}$ و به همین ترتیب در مرحله n آم، $\frac{1}{3^n}$ از مساحت مربع، رنگ نشده است. پس داریم: $\frac{1}{3^n} \leq \frac{5/5}{100} \Rightarrow \frac{1}{3^n} \leq \frac{1}{200} \Rightarrow 3^n \geq 200 \Rightarrow n \geq 5$

بنابراین گزینه (۳) صحیح است.

اثبات چند اتحاد مهم به کمک مجموع جملات دنباله هندسی

$$S = 1 + a + a^2 + \dots + a^{n-1}$$

اگر a یک عدد حقیقی و n یک عدد طبیعی باشد، آن‌گاه فرض کنید:

S مجموع جملات دنباله هندسی با جمله اول $1 = a_1$ و قدرنسبت $q = a$ می‌باشد، پس داریم:

$$S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} \Rightarrow S = \frac{(1-a^n)}{1-a} = \frac{-(a^n-1)}{-(a-1)} = \frac{a^n-1}{a-1} \Rightarrow a^n-1 = S(a-1) \Rightarrow a^n-1 = (1+a+a^2+\dots+a^{n-1})(a-1)$$

اگر n عددی فرد باشد، با تبدیل a به $-a$ خواهیم داشت:

با توجه به مطالب بالا اتحادهای مهم زیر را می‌توان نتیجه گرفت: ($n \in \mathbb{N}$)

$$x^n - y^n = (x - y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 + \dots + xy^{n-2} + y^{n-1})$$

$$x^n + y^n = (x + y)(x^{n-1} - x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 - \dots - xy^{n-2} + y^{n-1}) \quad (\text{فرد})$$

$$x^n - y^n = (x + y)(x^{n-1} - x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 - \dots + xy^{n-2} - y^{n-1}) \quad (\text{زوج})$$

مثال: حاصل عبارت $x + x^3 + x^5 + \dots + x^{2n+1}$ را بازای $x = \sqrt[2n+1]{3}$ به دست آورید.

$$A = \frac{(x+1)(x^4-x^3+x^2-x+1)(x-1)}{(x-1)(x+1)} + x^3 + x = x^4 - x^3 + x^2 - x + 1 + x^3 + x$$

$$= x^4 + x^2 + 1 = \sqrt[2n+1]{3} + \sqrt[2n+1]{3} + 1 = 2\sqrt[2n+1]{3} + 1$$

پاسخ: با تجزیه عبارت $x + x^3 + x^5 + \dots + x^{2n+1}$ داریم:

$$t = \frac{1+\sqrt{17}}{2} \quad \text{با بازی} \quad A = \frac{t^4-t^3+t^2-\dots-t+1}{t^6-t^4+1} \quad \text{تسنی: حاصل عبارت}$$

۶ (۴)

۵ (۳)

۴ (۲)

۳ (۱)

پاسخ: روش اول: عبارت $A = 1 - t + t^2 - \dots - t^7 + t^8$ مجموع ۹ جمله اول یک دنباله هندسی با جمله اول $1 = a_1$ و قدرنسبت $t = -t$ می‌باشد.

$$A = S_q = \frac{a_1(1-q^9)}{1-q} = \frac{(1-(-t)^9)}{1-(-t)} = \frac{1+t^9}{1+t}$$

عبارت $t^6 + t^3 + 1 = 1 - t^3 + t^6$ مجموع ۳ جمله اول یک دنباله هندسی با جمله اول $1 = a_1$ و قدرنسبت $t = -t^3$ می‌باشد. بنابراین:

$$B = S_r = \frac{a_1(1-q^3)}{1-q} = \frac{(1-(-t^3)^3)}{1-(-t^3)} = \frac{1+t^9}{1+t} \Rightarrow \frac{A}{B} = \frac{1+t^3}{1+t} = \frac{(1+t)(1-t+t^2)}{1+t} = 1 - t + t^2 = 1 - \frac{1+\sqrt{17}}{2} + \left(\frac{1+\sqrt{17}}{2}\right)^2$$

$$= 1 - \frac{1+\sqrt{17}}{2} + \frac{18+2\sqrt{17}}{4} = 1 + \frac{-2-2\sqrt{17}+18+2\sqrt{17}}{4} = 1 + 4 = 5$$

$$t^9 + 1 = (t+1)(t^8 - t^7 + \dots - t + 1), \quad t^9 + 1 = ((t^3)^3 + 1) = (t^3 + 1)(t^6 - t^3 + 1)$$

روش دوم: با توجه به اتحادهای گفته شده داریم:

$$\Rightarrow \frac{t^8 - t^7 + t^6 - \dots - t + 1}{t^6 - t^3 + 1} = \frac{\cancel{t^9 + 1}}{\cancel{t^6 + 1}} = \frac{t^3 + 1}{t + 1} = \frac{(t+1)(t^2 - t + 1)}{(t+1)} = t^2 - t + 1$$

مانند روش اول ۵

بنابراین گزینه (۳) صحیح است.

دنباله حسابی و مجموع جملات آن

کتاب درسی

۱- حاصل $1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1)$ کدام است؟

$$n^2 - 1 \quad (2n-1)^2 \quad (n+1)^2$$

$$(1) \quad n^2$$

۲- بر محیط دایره‌ای ۲ نقطه متمایز وجود دارد. از هر نقطه به نقاط دیگر وصل می‌کنیم. تعداد کل وترهای متمایز به دست آمده کدام است؟

کتاب درسی

$$420 \quad (4) \quad 380 \quad (3) \quad 210 \quad (2) \quad 190 \quad (1)$$

۳- اگر $\frac{5}{3}, x, y, z, 1$ چهار جمله اول یک دنباله حسابی باشند، مجموع ۱۵ جمله اول این دنباله کدام است؟

$$68 \quad (4) \quad 67/5 \quad (3) \quad 62/5 \quad (2) \quad 57 \quad (1)$$

$$(1) \quad 370$$

۴- در یک دنباله حسابی، جمله نوزدهم برابر ۱۰ می‌باشد. مجموع ۳۷ جمله اول این دنباله کدام است؟

$$135 \quad (4) \quad 270 \quad (3) \quad 185 \quad (2) \quad 130 \quad (1)$$

ریاضی خارج

۵- در یک دنباله عددی، جمله هفتم، نصف جمله سوم می‌باشد. مجموع چند جمله اول از این دنباله صفر است؟

$$21 \quad (4) \quad 20 \quad (3) \quad 19 \quad (2) \quad 18 \quad (1)$$

۶- در یک دنباله حسابی، مجموع n جمله اول از رابطه $S_n = 4n^2 + 3n$ بدست می‌آید. جمله عمومی دنباله a_n کدام است؟

$$a_n = 4n + 1 \quad (4) \quad a_n = 4n + 3 \quad (3) \quad a_n = 8n - 1 \quad (2) \quad a_n = 8n + 1 \quad (1)$$

۷- جمله چهارم و شانزدهم از یک دنباله حسابی به ترتیب ۱ و ۱۷ می‌باشند. مجموع ۱۳ جمله اول آن کدام است؟

$$65 \quad (4) \quad 56 \quad (3) \quad 36 \quad (2) \quad 33 \quad (1)$$

۸- در دنباله حسابی ...-۲۷, x, -۲۱, ..., -۳ مجموع جملات منفی کدام است؟

$$-270 \quad (4) \quad -75 \quad (3) \quad -150 \quad (2) \quad -135 \quad (1)$$

کتاب درسی

۹- در دنباله حسابی ... ۵, ۸, ۱۱, ..., ۵۰ حداقل چند جمله آن را با هم جمع کنیم تا حاصل بیشتر از ۵۰۰ شود؟

$$20 \quad (4) \quad 19 \quad (3) \quad 18 \quad (2) \quad 12 \quad (1)$$

۱۰- بین اعداد -۱۳ و ۷۱، بیست و سه طبقه حسابی درج کرده‌ایم. قدرنسبت دنباله و مجموع این بیست و سه طبقه حسابی به ترتیب از راست به چپ، کدام است؟

$$593, 3 \quad (4) \quad 580, 3 \quad (3) \quad 593, 4 \quad (2) \quad 580, 4 \quad (1)$$

۱۱- در یک دنباله عددی مجموع ۲۰ جمله اول، سه برابر مجموع ۱۲ جمله اول آن است. اگر جمله سوم آن برابر ۶ باشد، جمله دهم آن کدام است؟

$$38 \quad (4) \quad 26 \quad (3) \quad 34 \quad (2) \quad 32 \quad (1)$$

۱۲- در یک دنباله حسابی با جمله اول a ، اگر یک واحد به قدرنسبت افزوده شود، آن‌گاه به مجموع ۲۰ جمله اول چه قدر افزوده خواهد شد؟

$$83 \quad (4) \quad 180 \quad (3) \quad 170 \quad (2) \quad 160 \quad (1)$$

کتاب درسی

۱۳- مجموع اعداد طبیعی فرد و بخش پذیر بر عدد ۳ که کوچک‌تر از ۱۰۱ می‌باشند، کدام است؟

$$884 \quad (4) \quad 867 \quad (3) \quad 852 \quad (2) \quad 816 \quad (1)$$

ریاضی داخل

۱۴- مجموع تمام اعداد طبیعی دو رقمی مضرب ۷، کدام است؟

$$742 \quad (4) \quad 735 \quad (3) \quad 728 \quad (2) \quad 721 \quad (1)$$

کتاب درسی

۱۵- مجموع همه اعداد طبیعی سه رقمی مضرب ۷ کدام است؟


$$70336 \quad (4) \quad 70400 \quad (3) \quad 692237 \quad (2) \quad 35168 \quad (1)$$

۱۶- مجموع اعداد بین ۲۰ تا ۲۰۰ که باقی‌مانده تقسیم آن‌ها بر عدد ۴ برابر ۲ باشد، کدام است؟

- (۱) ۴۷۵۲ (۲) ۴۹۲۸ (۳) ۴۹۵۰ (۴) ۴۹۹۵

۱۷- مطابق شکل، تعدادی توپ روی یک خط مستقیم و به فاصله ۳ متر از هم قرار دارند. فاصله توپ اول تا سبد ۳ متر است. دوندهای باشد از کنار سبد شروع کرده و هر توپ را برداشته و به سبد بیندازد و مجدداً به طرف توپ بعدی بددود و آن را تا سبد حمل کند و به داخل آن بیندازد. اگر این دونده مجموعاً ۹۱۸ متر دویده باشد، او چند توپ را در سبد انداخته است؟

کتاب درسی



- (۱) ۱۵ (۲) ۱۶ (۳) ۱۷ (۴) ۱۸

۱۸- مجموع n جمله اول از یک دنباله حسابی به صورت $S_n = \frac{n(n-1)}{2}$ می‌باشد. در این دنباله، مجموع جملات با شروع از جمله هفتم و ختم به جمله هجدهم، کدام است؟

ریاضی خارج ۹۰

- (۱) ۱۸۴ (۲) $\frac{49}{3}$ (۳) $\frac{29}{3}$ (۴) ۹

۱۹- در دنباله‌ای با جمله عمومی $a_n = \frac{n}{n-1}$ ، مجموع جملات متولی با شروع از جمله دهم و ختم به جمله سی‌ام کدام است؟

- (۱) ۱۶۸ (۲) ۱۸۹ (۳) ۱۹۰ (۴) ۲۱۰

۲۰- در یک دنباله عددی، مجموع ۴ جمله اول برابر ۱۵ و مجموع ۵ جمله بعدی آن برابر ۳۰ می‌باشد. جمله یازدهم این دنباله کدام است؟

- (۱) ۷/۵ (۲) ۸ (۳) ۸/۵ (۴) ۹

۲۱- در یک دنباله حسابی، مجموع ۵ جمله اول، $\frac{1}{3}$ مجموع ۵ جمله بعدی می‌باشد. جمله دوم چند برابر جمله اول است؟

- (۱) $\frac{3}{2}$ (۲) $\frac{5}{2}$ (۳) ۳ (۴) ۴

۲۲- یک دنباله حسابی دارای ۴۱ جمله است. اگر مجموع ۵ جمله وسط برابر ۲۰ باشد، مجموع این ۴۱ جمله کدام است؟

- (۱) ۱۲۳ (۲) ۱۶۴ (۳) ۲۰۵ (۴) ۲۴۶

۲۳- در یک دنباله حسابی $S_7 = S_{10} - a_6 - a_7 - \dots - a_{12}$ است. حاصل عبارت $a_{12} + a_6 + \dots + a_7$ کدام است؟

- (۱) ۱۴ (۲) ۱۶ (۳) ۱۸ (۴) ۲۰

۲۴- در بیست جمله اول از یک دنباله حسابی، مجموع جملات ردیف فرد ۱۳۵ و مجموع جملات ردیف زوج ۱۵۰ می‌باشد. جمله اول کدام است؟

کتاب درسی

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

۲۵- در دنباله حسابی به صورت‌های $\dots, 6, 4, 2, 0, \dots, 5, 11, 14, 20, \dots$ مجموع جملات مشترک کمتر از ۱۰۰ کدام است؟

- (۱) ۸۴۸ (۲) ۷۵۰ (۳) ۶۵۸ (۴) ۶۴۲

۲۶- در یک دنباله حسابی، $a_1 = 3 + \sqrt{2}$ و $a_7 = 5 + \sqrt{2}$ است. مجموع چهار جمله چهارم این دنباله چه قدر از مجموع چهار جمله دومش بیشتر است؟

- (۱) ۸ (۲) ۶۴ (۳) ۱۶ (۴) ۳۲

۲۷- در یک دنباله حسابی، مجموع ۸ جمله اول آن با مجموع ۱۴ جمله اول آن برابر است. مجموع ۲۲ جمله اول دنباله کدام است؟

- (۱) ۱۴ (۲) ۲۸ (۳) ۱۴ (۴) صفر

۲۸- در دنباله حسابی $\dots, 1, 4, 7, 10, 14, \dots$ ، مجموع جملات چهارم، هشتم، دوازدهم، ... و شصتم کدام است؟

- (۱) ۱۳۸۰ (۲) ۱۳۹۰ (۳) ۱۴۰۰ (۴) ۱۴۱۰

۲۹- کدام گزینه به ترتیب جمله عمومی و مجموع n جمله اول، یک دنباله حسابی را نشان می‌دهد؟

$$\left\{ 2n^2 + 5 \right\}, \left\{ 3n + \frac{1}{n} \right\} \quad \left\{ 2n^2 + n \right\}, \left\{ 3n + \frac{1}{n} \right\} \quad \left\{ 2n^2 + 5 \right\}, \left\{ 3n - \frac{1}{2} \right\} \quad \left\{ 2n^2 + n \right\}, \left\{ 3n - \frac{1}{2} \right\}$$

۳۰- اگر $a_n = (p-2)n^3 + (2p-1)n^2 + pn + q + 1$ جمله عمومی یک دنباله حسابی باشد، مجموع ده جمله اول این دنباله کدام است؟

- (۱) ۹۵ (۲) ۱۱۰ (۳) ۱۱۵ (۴) ۱۲۵

۳۱- مجموع n جمله اول یک دنباله حسابی از رابطه $S_n = (2p-1)n^3 + qn^2 + pn + q + 1$ به دست می‌آید. مجموع ۵ جمله دوم این دنباله کدام است؟

- (۱) -۸۷/۵ (۲) -۸۲/۵ (۳) -۷۷/۵ (۴) -۷۲/۵

-۳۲- در یک دنباله حسابی ۶ جمله‌ای، مجموع ۱۱ جمله اول برابر با ۷۰ و مجموع ۱۱ جمله آخر برابر ۵۱ می‌باشد. مجموع تمام جملات کدام است؟

(۴) ۵۱۰

(۳) ۴۲۰

(۲) ۳۳۰

(۱) ۲۴۰

-۳۳- در یک دنباله حسابی، مجموع سه جمله اول ۱۵ و مجموع سه جمله آخر برابر ۶۹ است و مجموع تمام جملات ۱۶۸ می‌باشد. این دنباله چند جمله دارد؟

(۴) ۱۰

(۳) ۱۱

(۲) ۱۲

(۱) ۱۳

-۳۴- اعداد طبیعی فرد را به طریقی دسته‌بندی می‌کنیم که تعداد جمله هر دسته برابر شماره آن دسته باشد. ... (۱), (۳, ۵), (۷, ۹, ۱۱), ... ریاضی خارج ۹۱

(۴) ۴۲۳

(۳) ۴۲۱

(۲) ۴۱۹

(۱) ۴۱۵

-۳۵- اعداد طبیعی را به طریقی دسته‌بندی می‌کنیم که آخرین جمله هر دسته، مجدور کامل باشد. ... (۱), (۲, ۳, ۴), (۵, ۶, ۷, ۸, ۹)

مجموع جملات در دسته دهم کدام است؟

(۴) ۱۷۴۸

(۳) ۱۷۲۹

(۲) ۱۷۱۰

(۱) ۱۶۹۱

-۳۶- در یک دنباله حسابی، مجموع ۵ جمله متولی برابر ۵ و مجموع مربعات آن‌ها ۴۵ می‌باشد. جمله وسط این پنج جمله چند برابر مجدور قدرنسبت می‌باشد؟

(۴) $\frac{1}{4}$

(۳) ۲

(۲) -۲

(۱) $-\frac{1}{4}$

-۳۷- اعداد $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-1}, a_n$ جملات متولی تصاعد حسابی هستند. اگر $a_1 = 4$ و $a_n = 169$ باشند، مجموع $\frac{1}{\sqrt{a_1} + \sqrt{a_2}} + \frac{1}{\sqrt{a_2} + \sqrt{a_3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{a_{n-1}} + \sqrt{a_n}}$ برابر کدام است؟

(۴) $\frac{n-1}{15}$ (۳) $\frac{n}{15}$ (۲) $\frac{n-1}{12}$ (۱) $\frac{n}{12}$

-۳۸- در یک دنباله عددی جمله دوم ۳ برابر جمله سوم می‌باشد و داریم: $a_n = a_{n+3} + 9$. مجموع چهار جمله سوم این دنباله کدام است؟

(۴) -۷۶

(۳) -۷۸

(۲) -۸۲

(۱) -۸۴

-۳۹- بین دو عدد ۵ و ۵۳، تعدادی عدد طوری قرار می‌دهیم که کل اعداد تشکیل دنباله حسابی بدنه و تفاضل کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین این اعداد ۳۶ باشد. مجموع کل اعداد قرار داده شده کدام است؟

(۴) ۲۰۳

(۳) ۱۹۷

(۲) ۲۱۰

(۱) ۱۸۷

(۴) $\frac{2}{a_1 a_2} + \frac{2}{a_2 a_3} + \frac{2}{a_3 a_4} + \dots + \frac{2}{a_{12} a_{13}}$ کدام است؟


(۴) ۰/۹۸

(۳) ۰/۹۶

(۲) ۰/۹۴

(۱) ۰/۹۲

-۴۱- کوهنوردی از نقطه A پایین کوه در مسیری به شکل مقابل در حال صعود به نوک کوه است به طوری که هر کدام از فواصل افقی را در زمان $1/5$ دقیقه و هر کدام از فواصل عمودی را در $1/75$ دقیقه طی می‌کند. فواصل افقی $2/0$ و فواصل عمودی $0/0$ متر در هر مرحله کاهش می‌یابد. اگر او بعد از ۶۵ دقیقه به نوک قله کوه یعنی نقطه B برسد، طول AB کدام است؟

(۴) $100\sqrt{164}$ (۳) $100\sqrt{154}$ (۲) $100\sqrt{152}$ (۱) $100\sqrt{132}$

دنباله هندسی و مجموع جملات آن

-۴۲- در یک دنباله هندسی، مجموع پنج جمله اول برابر ۱۲ و جمله ششم ۲۴ واحد از جمله اول بیشتر می‌باشد. قدرنسبت این دنباله کدام است؟

(۴) $\frac{5}{2}$ (۳) $\frac{3}{2}$

(۲) ۳

(۱) ۲

-۴۳- دنباله هندسی $\dots, x, 2, \frac{1}{2}, \dots$ غیرنژولی است. مجموع شش جمله اول آن کدام است؟

(۴) $\frac{23}{16}$ (۳) $\frac{11}{8}$ (۲) $\frac{21}{16}$ (۱) $\frac{41}{32}$

-۴۴- در یک دنباله هندسی صعودی به صورت $\dots, b, a, 9, 4$ ، مجموع شش جمله اول کدام است؟

(۴) $83\frac{1}{8}$ (۳) $82\frac{3}{8}$ (۲) $81\frac{7}{8}$ (۱) $81\frac{3}{8}$

-۴۵- در یک دنباله هندسی، مجموع سه جمله اول 136 و مجموع شش جمله اول آن 153 می‌باشد. جمله اول چند برابر جمله پنجم است؟

۸۹ ریاضی داخل ۱۶ (۴) ۹ (۳) ۸ (۲) $\frac{11}{16}$ (۱)

-۴۶- در یک دنباله هندسی، مجموع ده جمله اول $(1 + \sqrt{2})^4$ برابر مجموع ۵ جمله اول است. در این دنباله، مجموع ۸ جمله اول چند برابر مجموع چهار جمله اول است؟

۱۷ (۴) ۹ (۳) ۳ (۲) $\frac{5}{16}$ (۱)

-۴۷- در یک دنباله هندسی نزولی با جمله اول مثبت، بین جملات، رابطه $= 64 = \frac{a_1 a_2 a_3}{(a_4)^3}$ برقرار است. مجموع شش جمله اول، چند برابر جمله اول است؟

$\frac{63}{16}$ (۴) $\frac{63}{128}$ (۳) $\frac{63}{32}$ (۲) $\frac{63}{64}$ (۱)

-۴۸- بین دو عدد 2 و $16\sqrt{2}$ ، شش عدد چنان درج شده‌اند که هشت عدد حاصل، دنباله هندسی تشکیل داده‌اند. مجموع این 8 عدد کدام است؟

۸۸ ریاضی خارج $36(\sqrt{2} + 1)$ (۴) $30(\sqrt{2} + 1)$ (۳) $48\sqrt{2}$ (۲) $30(2 + \sqrt{2})$ (۱)

-۴۹- در یک دنباله هندسی، مجموع جملات اول و سوم برابر 1 و مجموع چهار جمله اول آن برابر 3 می‌باشد. مجموع شش جمله اول کدام است؟

۸۸ ریاضی داخل $13/4$ (۴) $12/6$ (۳) $11/2$ (۲) $10/8$ (۱)

-۵۰- برای محافظت از تابش مضر مواد رادیو اکتیویته، لایه‌های محافظتی ساخته شده است که شدت تابش پس از عبور از آن‌ها نصف می‌شود. حداقل چند لایه باید استفاده کنیم تا شدت تابش مواد مضر 97 درصد کاهش یابد؟

کتاب درسی ۹ (۴) ۸ (۳) ۷ (۲) $\frac{6}{1}$ (۱)

-۵۱- طول ضلع مربعی 1 متر است. ابتدا نیمی از مساحت آن و سپس نیمی از مساحت باقی‌مانده را رنگ می‌کنیم. به همین ترتیب در هر مرحله، نیمی از مساحت باقی‌مانده از مرحله قبل را رنگ می‌کنیم. پس از چند مرحله، حداقل 99 درصد سطح مربع، رنگ شده است؟

کتاب درسی ۹ (۴) ۸ (۳) ۷ (۲) $\frac{6}{1}$ (۱)

-۵۲- تعداد جملات یک دنباله هندسی عددی زوج است. اگر مجموع تمام جملات آن 3 برابر مجموع جملات با ردیف فرد باشد، قدرنسبت آن کدام است؟

۹۴ ریاضی داخل $3/4$ (۴) $2/3$ (۳) $\frac{1}{2}$ (۲) $\frac{1}{3}$ (۱)

-۵۳- جملات اول، دوم و ششم از یک دنباله حسابی، جملات متواالی یک دنباله هندسی هستند. مجموع 10 جمله اول این دنباله حسابی چند برابر جمله اول آن است؟

۱۴۵ (۴) ۱۵۵ (۳) ۱۲۵ (۲) 120 (۱)

-۵۴- در یک دنباله حسابی جملات اول، پنجم و هفدهم به ترتیب سه جمله اول یک دنباله هندسی هستند. مجموع چهار جمله اول دنباله هندسی چند برابر جمله اول آن است؟

۵۶ (۴) ۸۵ (۳) 40 (۲) 15 (۱)

-۵۵- حاصل $A = (1 + x + x^2 + \dots + x^8)(1 - x + x^2 - \dots + x^8)$ بهازی $x = \sqrt{2}$ کدام است؟

۵۱۶ (۴) ۵۱۲ (۳) ۵۱۱ (۲) 507 (۱)

-۵۶- حاصل عبارت $t = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$ بهازی $t = \frac{t^{11} + t^{10} + t^9 + \dots + t + 1}{t^9 + t^8 + t^3 + 1}$ کدام است؟

۹۳ ریاضی داخل ۵ (۴) ۴ (۳) ۳ (۲) 2 (۱)

-۵۷- در دنباله هندسی $\dots, \sqrt[3]{243}, \sqrt[4]{243}, \dots$ مجموع چهار جمله اول چند برابر مجموع چهار جمله دوم است؟

$\frac{1}{81}$ (۴) $\frac{1}{27}$ (۳) $\frac{1}{9}$ (۲) $\frac{1}{3}$ (۱)

-۵۸- بهازی یک مقدار x ، اعداد $2 - x^3$ ، $2x - x^3$ و $x^3 + 4$ به ترتیب سه جمله اول از دنباله هندسی نزولی‌اند. مجموع هفت جمله اول این دنباله کدام است؟

۹۳ تجربی داخل $\frac{127}{8}$ (۴) $\frac{63}{4}$ (۳) $\frac{125}{16}$ (۲) $\frac{117}{16}$ (۱)

-۵۹- در خانه اول شترنج، یک عدد گندم می‌گذاریم. در خانه سوم ۴ گندم، در خانه دوم ۲ گندم، در خانه اول ۱ گندم و به همین ترتیب در هر خانه دو برابر خانه قبل گندم قرار می‌دهیم. اگر وزن هر دانه گندم یک گرم باشد، وزن کل گندم‌ها چند گرم می‌شود؟ مقدار آن از ۱۰۰۰ میلیارد تن بیشتر است یا کم‌تر؟ (صفحه شترنج ۶۴ خانه دارد.)

کتاب درسی

(۱) ۱۰^۸، بیشتر (۲) ۱۰^۸-۱۰^۹، کم‌تر (۳) ۱۰^۹-۱۰^{۱۰}، بیشتر

-۶۰- در خانه اول شترنج یک عدد گندم، در خانه دوم ۲ گندم، در خانه سوم ۴ گندم و به همین ترتیب در هر خانه دو برابر خانه قبل گندم می‌گذاریم. اگر وزن هر دانه گندم یک گرم باشد، حداقل در چند خانه، گندم قرار داده شود تا میزان کل گندم بیشتر از ۶۴ کیلوگرم باشد؟

(۱) ۱۷ (۲) ۱۸ (۳) ۲۰ (۴) ۱۶

-۶۱- توپی را از سطح زمین به هوا پرتاب می‌کنیم به طوری که تا ارتفاع ۶۴ متری بالا می‌رود و بعد از هر بار برخورد به زمین به اندازه نصف ارتفاع قبلی بالا می‌رود. در لحظه‌ای که برای دهمین بار به زمین برخورد می‌کند، این توپ چه مسافتی را بر حسب متر طی کرده است؟

(۱) ۱۲۷/۷۵ (۲) ۱۹۱/۷۵ (۳) ۲۵۵/۷۵ (۴) ۲۶۴/۷۵

-۶۲- یک بانک به حساب سپرده مشتری، سالانه ۲۰٪ سود می‌دهد. اگر شخصی دو میلیون تومان سپرده‌گذاری کند، بعد از ۵ سال مقدار موجودی حسابش تقریباً چند میلیون تومان می‌شود؟ (فرض کنید $250000 \times 1.2^5 = 2500000$)

(۱) ۴ (۲) ۴/۵ (۳) ۵/۵ (۴) ۵ (۴)

-۶۳- موجی بر روی نیم‌دایره‌های بالای یک محور حرکت می‌کند. با قطر اولیه یک واحد، هر بار که به محور برخورد کند، ۲۰ درصد از طول قطر آن کاسته می‌شود. اندازه محیط این نیم‌دایره‌های متولی دنباله‌ای از اعداد حقیقی است. مجموع ۵ جمله اول این دنباله کدام است؟

(۱) $\frac{5\pi}{2} \left(1 - \left(\frac{4}{5}\right)^5\right)$ (۲) $\frac{5\pi}{2} \left(1 - \left(\frac{4}{5}\right)^4\right)$ (۳) $5\pi \left(1 - \left(\frac{4}{5}\right)^5\right)$ (۴) $5\pi \left(1 - \left(\frac{4}{5}\right)^4\right)$

-۶۴- با توجه به دنباله حسابی، مجموع $\frac{1}{2 \times 5} + \frac{1}{5 \times 8} + \frac{1}{8 \times 11} + \dots + \frac{1}{17 \times 20}$ کدام است؟

(۱) ۰/۱۵ (۲) ۰/۱۸ (۳) ۰/۲۴ (۴) ۰/۲۵

-۶۵- در تجزیه $x^3y^3 + x^3y^3$ کدام عامل وجود دارد؟

(۱) $x^3 - y$ (۲) $x^3 + y$ (۳) $x^3 + y^3 + x^3y$ (۴) $x^3 + y^3 - x^3y$

-۶۶- در تجزیه عبارت $(x^3 + x^3 + 1)^9 + (x^3 - x^3 + 2)^9$ کدام عامل وجود دارد؟

(۱) $x^3 + 2$ (۲) $2x^3 - 1$ (۳) $x^3 - 1$ (۴) $x^3 - 2x^3$

-۶۷- حاصل عبارت $A = \frac{(x^4 + 1)(x - 2)}{x^3 - x - 2}$ به ازای $x = \sqrt{3}$ کدام است؟

(۱) ۴۰ (۲) ۴۱ (۳) ۴۲ (۴) ۴۳

-۶۸- در یک دنباله هندسی که نه صعودی است و نه نزولی، مجموع چهار جمله اول $\frac{1}{3}$ مجموع جملات پنجم تا دوازدهم می‌باشد. قدرنسبت این دنباله کدام است؟

(۱) $-\sqrt{2}$ (۲) $\sqrt{2}$ (۳) $-\sqrt[3]{2}$ (۴) $\sqrt[3]{2}$

-۶۹- سه عدد، جملات متولی یک دنباله هندسی اند به طوری که مجموع آن‌ها ۲۱ و مجموع معکوس آن‌ها $\frac{7}{12}$ است. عدد بزرگ‌تر کدام است؟

(۱) ۹ (۲) ۱۰ (۳) ۱۲ (۴) ۱۵




گاماتیکس

۱۱ روش اول: مجموع $(1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1))$ جمله اول یک دنباله حسابی با جمله اول $a_1 = 1$ و قدرنسبت $d = 2$ است. بنابراین:

$$S_n = \frac{n}{2} (2a_1 + (n-1)d) = \frac{n}{2} (2(1) + (n-1)2) = \frac{n}{2} (2n) = n^2$$

روش دوم: چون $a_n = 2n$ را داریم، پس از رابطه $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$ نیز می‌توان استفاده کرد:

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{n}{2}(1 + (2n-1)) = \frac{n}{2}(2n) = n^2$$



در این تیپ تست‌ها می‌توانی از عدگزاری هم استفاده کنی، یعنی این‌که می‌دونیم در این‌جا، مجموع یک جمله اول برابر ۱ و مجموع دو جمله اول برابر ۴ هست، حالا آگه توی گزینه‌ها $n=2$ و $n=2$ رو گذاریم، تنها گزینه‌ای که بواب درست می‌ده گزینه یکه.

توجه: مطابق آن‌چه در کتاب درسی به آن اشاره شده، مجموع n جمله اول اعداد فرد را از شکل رویه رو نیز می‌توان بدست آورد. بدین ترتیب که اگر در n سطر و n ستون، دایره قرار دهیم، بدین‌است که تعداد دایره‌ها برابر n^2 می‌شود. حال بهصورتی که در شکل، مشخص است کل دایره‌ها را n قسمت می‌کنیم، طوری که در قسمت اول ۱ دایره، در قسمت دوم ۳ دایره، در قسمت سوم ۵ دایره و به همین صورت در قسمت n ام، $2n-1$ دایره وجود دارد. می‌دانیم مجموع تعداد آن‌ها باید برابر n^2 باشد، پس:

$$1 + 3 + \dots + (2n-1) = n^2$$

۱۲ نقطه اول را به هریک از نقاط دیگر وصل می‌کنیم، در این صورت ۱۹ وتر پدید می‌آید. با وصل نقطه دوم به نقاط دیگر (به غیر از نقطه اول) ۱۸ وتر به دست می‌آید. سپس نقطه سوم را به نقاط دیگر غیر از نقاط اول و دوم وصل می‌کنیم تا ۱۷ وتر حاصل شود. با ادامه این عمل، تعداد وترهای حاصل برابر $1+2+\dots+17+18+19$ می‌شود. می‌دانیم $n = 1+2+\dots+n$ مجموع جملات یک دنباله حسابی با جمله اول ۱ و قدرنسبت ۱ می‌باشد که بعد از ساده کردن به رابطه $1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$ می‌رسیم. بنابراین داریم:

$$1+2+\dots+17+18+19 = \frac{19(19+1)}{2} = 190$$

با توجه به سؤال $a_1 = 1$ و $a_4 = \frac{5}{2}$ است. بنابراین:

$$a_n = a_1 + (n-1)d \Rightarrow a_4 = 1 + 3d = \frac{5}{2} \Rightarrow 3d = \frac{3}{2} \Rightarrow d = \frac{1}{2}$$

$$S_n = \frac{n}{2} (2a_1 + (n-1)d) \Rightarrow S_{15} = \frac{15}{2} (2 + 14(\frac{1}{2})) = 67.5$$

$$a_n = a_1 + (n-1)d \Rightarrow a_{19} = a_1 + 18d = 10 \quad (*)$$

۱۴ روش اول:

$$S_n = \frac{n}{2} (2a_1 + (n-1)d) \Rightarrow S_{37} = \frac{37}{2} (2a_1 + 36d) = \frac{37}{2} (2(a_1 + 18d)) = 37(a_1 + 18d) \xrightarrow{\text{رابطه (*)}} 37(10) = 370$$

روش دوم: از رابطه $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$ استفاده می‌کنیم:

$$S_{37} = \frac{37}{2} (a_1 + a_{37}) \xrightarrow{\text{رابطه اندیس‌ها}} \frac{37}{2} (2a_{19}) = 37a_{19} = 37(10) = 370$$

$$a_7 = \frac{1}{2}a_7 \Rightarrow 2a_7 = a_7 \Rightarrow 2(a_1 + 6d) = a_1 + 2d \Rightarrow 2a_1 + 12d = a_1 + 2d \Rightarrow a_1 = -10d$$

$$S_n = 0 \Rightarrow \frac{n}{2} (2a_1 + (n-1)d) = 0 \xrightarrow{a_1 = -10d} \frac{n}{2} (-20d + (n-1)d) = 0 \Rightarrow \frac{n}{2} (d(-20 + n - 1)) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{nd}{2} (n - 21) = 0 \xrightarrow{nd \neq 0} n - 21 = 0 \Rightarrow n = 21$$

۱۵ روش اول: با توجه به این‌که $S_7 = a_1 + a_2$ و $S_1 = a_1$ است، داریم:

$$\begin{cases} S_1 = 4 + 3 = 7 \Rightarrow a_1 = 7 & (*) \\ S_7 = 4(2)^7 + 3(2) = 22 \Rightarrow a_1 + a_7 = 22 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{(*)} 7 + a_7 = 22 \Rightarrow a_7 = 15 \Rightarrow d = a_7 - a_1 = 15 - 7 = 8$$

$$a_n = a_1 + (n-1)d \Rightarrow a_n = 7 + (n-1)(8) = 8n - 1$$

توجه: برای تعیین d می‌توانستی از این تکته استفاده کنی که ضربی n^2 برابر نصف قدرنسبت، پس $\frac{d}{2} = 4$ و در نتیجه $d = 8$ می‌شه.

$$a_n = S_n - S_{n-1} = 4n^2 + 3n - (4(n-1)^2 + 3(n-1)) = 4n^2 + 3n - (4n^2 - 8n + 4 + 3n - 3) = 8n - 1$$

روش دوم: از رابطه $a_n = S_n - S_{n-1}$ استفاده می‌کنیم:

۴ ۷

ابتدا با تشکیل a_4 و a_{16} و محاسبه تفاضل آن‌ها مقدار قدرنسبت را تعیین کرده و سپس S_{13} را بدست می‌آوریم:

$$a_n = a_1 + (n-1)d \Rightarrow \begin{cases} a_4 = a_1 + 3d \\ a_{16} = a_1 + 15d \end{cases} \Rightarrow a_{16} - a_4 = (a_1 + 15d) - (a_1 + 3d) = 12d$$

$$\Rightarrow 16 - 4 = 12d \Rightarrow 12 = 12d \Rightarrow d = \frac{4}{3}$$

$$a_4 = a_1 + 3d = 1 \Rightarrow a_1 + 3\left(\frac{4}{3}\right) = 1 \Rightarrow a_1 + 4 = 1 \Rightarrow a_1 = -3$$

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) \Rightarrow S_{13} = \frac{13}{2}\left(2(-3) + 12\left(\frac{4}{3}\right)\right) = \frac{13}{2}(-6 + 16) = \frac{13}{2}(10) = 13 \times 5 = 65$$

البته می‌توان در قسمت اول راه حل از رابطه $d = a_{16} - a_4 = 12d$ $a_m - a_n = (m-n)d$ نیز استفاده کرد.

۱ ۸

$$2x = (-27) + (-21) \Rightarrow 2x = -48 \Rightarrow x = -24$$

پس جملات دنباله حسابی به صورت $\dots, -27, -24, -21, \dots$ در می‌آیند و در نتیجه $-27 - (-27) = 0$ می‌شود. حال جمله عمومی دنباله را تعیین می‌کنیم:

$$a_n = a_1 + (n-1)d \Rightarrow a_n = -27 + (n-1)(0) = 3n - 3$$

برای یافتن تعداد جملات منفی، نامعادله $3n - 3 < 0$ را حل می‌کنیم:

$$3n - 3 < 0 \Rightarrow 3n < 3 \Rightarrow n < 1 \Rightarrow n \leq 0$$

۹

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) \Rightarrow S_9 = \frac{9}{2}(2(-27) + 8(0)) = \frac{9}{2}(-54 + 24) = \frac{9}{2}(-30) = 9(-15) = -135$$

۲ ۹

$$5, 8, 11, \dots \Rightarrow a_1 = 5, d = a_4 - a_1 = 8 - 5 = 3$$

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) \Rightarrow S_n = \frac{n}{2}(2(5) + (n-1)3) = \frac{n}{2}(10 + 3n - 3) = \frac{n}{2}(3n + 7)$$

برای این‌که $S_n > 500$ شود، به جای حل نامعادله $500 > 3n + 7$ که وقت‌گیر است، بهتر است از اعداد گزینه‌ها استفاده کنیم:

$$n = 17 \Rightarrow \frac{n}{2}(3n + 7) = \frac{17}{2}(58) = 493 < 500$$

$$n = 18 \Rightarrow \frac{n}{2}(3n + 7) = \frac{18}{2}(61) = 549 > 500$$

بنابراین اگر حداقل ۱۸ جمله را با هم جمع کنیم، حاصل بیشتر از ۵۰۰ می‌شود.

۱ ۱۰

چون 2^0 واسطه درج می‌کنیم، پس دنباله حاصل ۲۲ جمله دارد که جمله اول برابر -13 و جمله بیست و دوم برابر 71 است. برای پیدا کردن مجموع 2^0 واسطه حسابی، ابتدا مجموع کل اعداد را حساب کرده و حاصل را منهای اعداد -13 و 71 می‌کنیم:

$$\underbrace{-13, O, O, \dots, O}_{a_1}, \underbrace{O, O, \dots, O}_{2^0 \text{ جمله}}, \underbrace{71}_{a_{22}}$$

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \Rightarrow S_{22} = \frac{22}{2}(a_1 + a_{22}) = 11(-13 + 71) = 11(58) = 638$$

$$638 - (-13 + 71) = 638 - 58 = 580$$

حال برای تعیین قدرنسبت، کافی است a_{22} را تشکیل دهیم:

$$a_n = a_1 + (n-1)d \Rightarrow a_{22} = a_1 + 21d \Rightarrow 71 = -13 + 21d \Rightarrow 84 = 21d \Rightarrow d = 4$$

☞ تذکر: برای این‌که مجموع بیست و اسطه را حساب کنی، این طوری هم می‌شود:

$$S_{2^0} = \frac{2^0}{2}(a_1 + a_{2^0}) = 1^0(a_1 + a_{2^0}) = 1^0(-13 + 71) = 1^0(58) = 580$$

با توجه به رابطه $(n-1)d = S_n - a_1$ داریم:

$$S_{2^0} = \frac{2^0}{2}(2a_1 + 19d) = 2^0a_1 + 19^0d \quad ; \quad S_{12} = \frac{12}{2}(2a_1 + 11d) = 12a_1 + 66d$$

$$S_{2^0} = 2^0 S_{12} \Rightarrow 2^0 a_1 + 19^0 d = 36a_1 + 198d \Rightarrow -188d = 16a_1 \Rightarrow d = -2a_1$$

از طرفی جمله سوم برابر 6 می‌باشد، پس $a_1 + 2d = 6$ ، در نتیجه داریم:

$$a_1 + 2d = 6 \Rightarrow a_1 - 4a_1 = 6 \Rightarrow -3a_1 = 6 \Rightarrow a_1 = -2 \Rightarrow d = -2a_1$$

$$a_{1^0} = a_1 + 9d = -2 + 9(-2) = -2 + 36 = 34$$

۲ ۱۱

۱۲ مجموع ۲۰ جمله اول دنباله حسابی با جمله اول a و قدرنسبت d برابر است با:

$$S_{20} = \frac{10}{2} (2a + 19d) = 20a + 190d \quad (*)$$

حال مجموع ۲۰ جمله اول دنباله با جمله اول a و قدرنسبت $1+d$ را حساب می‌کنیم:

$$S'_{20} = \frac{10}{2} (2a + 19(d+1)) = 20a + 190(d+1) = (20a + 190d) + 190 \stackrel{(*)}{=} S_{20} + 190$$

بنابراین اگر یک واحد به قدرنسبت اضافه شود، به مجموع ۲۰ جمله اول، ۱۹۰ واحد افزوده خواهد شد.

۱۳ روش اول: اولین عدد طبیعی فرد مضرب ۳ برابر خود عدد ۳ و آخرين آن که کوچکتر از ۱۰۱ باشد، عدد ۹۹ است. بنابراین اعداد فرد مضرب ۳ کوچکتر از ۱۰۱ به صورت ۹۹, ۹۶, ۹۳, ۹۰, ۸۷, ۸۴, ۸۱, ۷۸, ۷۵, ۷۲, ۶۹, ۶۶, ۶۳, ۶۰, ۵۷, ۵۴, ۵۱, ۴۸, ۴۵, ۴۲, ۳۹, ۳۶, ۳۳, ۳۰, ۲۷, ۲۴, ۲۱, ۱۸, ۱۵, ۱۲, ۹, ۶ می‌باشند.

کوچکتر از ۱۰۱ تعداد جملات این دنباله ۶ است. ابتدا تعداد جملات این دنباله و سپس مجموع آن را تعیین می‌کنیم:

$$a_n = a_1 + (n-1)d \Rightarrow 99 = 3 + (n-1)(6) \Rightarrow 96 = 6n - 6 \Rightarrow 6n = 102 \Rightarrow n = 17$$

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \Rightarrow S_{17} = \frac{17}{2}(3 + 99) = \frac{17}{2}(102) = 17 \times 51 = 867$$

روش دوم: با توجه به صورت سؤال این اعداد تشکیل یک دنباله حسابی با قدرنسبت ۶ و جمله اول ۳ می‌دهند. ابتدا جمله عمومی دنباله را تعیین می‌کنیم:

$$a_n = a_1 + (n-1)d \Rightarrow a_n = 3 + (n-1)(6) \Rightarrow a_n = 6n - 3$$

با حل نامعادله $101 < a_n$ تعداد جملات فرد مضرب ۳، کمتر از ۱۰۱ به دست می‌آید:

$$6n - 3 < 101 \Rightarrow 6n < 104 \Rightarrow n < \frac{104}{6} = \frac{52}{3} \approx 17.33 \Rightarrow n \leq 17$$

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) \Rightarrow S_{17} = \frac{17}{2}(2(3) + 16(6)) = \frac{17}{2}(6 + 96) = \frac{17}{2}(102) = 867$$

۱۴ کوچکترین و بزرگترین عدد دو رقمی مضرب ۷ به ترتیب ۱۴ و ۹۸ است. اعداد دو رقمی مضرب ۷ تشکیل یک دنباله

حسابی با جمله اول ۱۴ و قدرنسبت ۷ می‌دهند که با نوشتن جمله عمومی، تعداد جملات آن را تعیین می‌کنیم:

$$14, 21, \dots, 98$$

$$a_n = a_1 + (n-1)d \Rightarrow 98 = 14 + (n-1)(7) \Rightarrow 84 = 7(n-1) \Rightarrow n-1 = 12 \Rightarrow n = 13$$

پس این دنباله، ۱۳ جمله دارد، حال مجموع این جملات را حساب می‌کنیم:

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \Rightarrow S_{13} = \frac{13}{2}(14 + 98) = 13(7 + 49) = 728$$

۱۵ تذکر: برای تعیین تعداد جملات، چون دنباله به صورت $14 \times 7, 21 \times 7, \dots, 14 \times 7, 3 \times 7, 2 \times 7$ است، پس می‌توان گفت $13 = 14 - 2 + 1 = 14 - 2 \times 6$.

کوچکترین و بزرگترین عدد سه رقمی مضرب ۷ به ترتیب برابر ۱۰۵ و $142 \times 7 = 994$ است. بنابراین تعداد جملات دنباله

برابر $128 = 142 - 15 + 1 = 128$ می‌باشد. اعداد سه رقمی مضرب ۷ تشکیل یک دنباله حسابی با قدرنسبت ۷ می‌دهند که مجموع جملات آن را حساب می‌کنیم:

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \Rightarrow S_{128} = \frac{128}{2}(105 + 994) = 64(1099) = 70336$$

به پای این که $14 \times 7 = 98$ رو در $105 \times 7 = 705$ ضرب کنی می‌توانی بکار یکان عدد هاصل برابر ۶ می‌شه، پس گزینه (۱۴) درسته.

۱۶ کوچکترین و بزرگترین عدد بین ۲۰ تا ۲۰۰ که باقیمانده تقسیم آن بر عدد ۴ برابر ۲ است، برابر ۲۲ و ۱۹۸ می‌باشد. پس اعداد مورد نظر،

تشکیل یک دنباله حسابی با جمله اول ۲۲ و قدرنسبت ۴ می‌دهند که با نوشتن جمله عمومی، تعداد جملات آن را تعیین می‌کنیم:

$$a_n = a_1 + (n-1)d \Rightarrow 198 = 22 + (n-1)(4) \Rightarrow 176 = 4(n-1) \Rightarrow n-1 = 44 \Rightarrow n = 45$$

بنابراین این دنباله ۴۵ جمله دارد، حال مجموع این اعداد را حساب می‌کنیم:

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \Rightarrow S_{45} = \frac{45}{2}(22 + 198) = \frac{45}{2}(220) = 45(110) = 4950$$

۱۷ دونده برای برداشت توب اول و قرار دادن آن در سبد، باید مسافت $6 = 2(3)$ متر را طی کند، برای توب دوم باید $12 = 2(3+3)$ متر و برای

توب سوم $= 18 = 2(3+3+3)$ متر و ... بنابراین مسافت‌های طی شده در هر مرحله، تشکیل یک دنباله حسابی با جمله اول ۶ و قدرنسبت ۶ می‌دهند. اگر

تعداد توب‌های انداخته شده در سبد باشد، از فرمول مجموع جملات دنباله حسابی، داریم:

$$6, 12, 18, \dots$$

$$S = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) \Rightarrow 918 = \frac{n}{2}(12 + (n-1)6) \Rightarrow 918 = \frac{n}{2}(6n + 6) \Rightarrow 918 = 3n(n+1) \Rightarrow 306 = n(n+1)$$

برای حل معادله $306 = n(n+1)$ به جای استفاده از دلتا بهتر است، بگوییم ضرب دو عدد طبیعی متولی ۳۰۶ شده و چون $306 = 17 \times 18$ ، پس $n = 17$ می‌باشد.

۴ ۱۸

چون رابطه S_n را داریم، برای محاسبه $a_7 + a_8 + \dots + a_{18}$ کافی است، مجموع هجده جمله اول را منهای مجموع شش جمله اول کنیم:

$$S_n = \frac{n(n-15)}{6} \Rightarrow S_{18} = \frac{18(18-15)}{6} = 9 ; S_6 = \frac{6(6-15)}{6} = -9$$

$$a_7 + a_8 + \dots + a_{18} = \underbrace{S_{18}}_{a_1 + a_2 + \dots + a_{18}} - \underbrace{S_6}_{a_1 + a_2 + \dots + a_6} = 9 - (-9) = 18$$

نتیجه: با در اختیار داشتن S_n ، برای تعیین مجموع جملات m تا n آم (۱۸) داریم:

$$a_m + a_{m+1} + \dots + a_n = S_n - S_{m-1}$$

چون a_n یک عبارت درجه اول برحسب n می باشد، پس این دنباله، حسابی است. (با نوشتن چند جمله اول دنباله هم می توان فهمید که دنباله حسابی است).

روش اول: می خواهیم مجموع جملات $a_{10}, a_{11}, \dots, a_{29}$ را تعیین کنیم، این دنباله ۲۱ جمله دارد (زیرا $21 = 21 - 10 + 1 = 30 - 10$). حال با توجه به

$$\text{این که } 1 - 1 = 0, \text{ پس } 4 - 1 = 3 \text{ و } a_{30} = \frac{30}{2} - 1 = 14 \text{ و } a_{10} = \frac{10}{2} - 1 = 4 \text{ و } a_n = \frac{n}{2} - 1$$

$$S_n = \frac{n}{2} \Rightarrow S_{21} = \frac{21}{2}(4 + 14) = \frac{21}{2}(18) = 21 \times 9 = 189$$

روش دوم:

$$a_n = \frac{n}{2} - 1 \Rightarrow \begin{cases} a_1 = -\frac{1}{2} \\ a_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow d = a_2 - a_1 = \frac{1}{2}$$

مجموع جملات با شروع از جمله دهم و ختم به جمله سی آم، برابر است با $S_9 - S_{20}$ ، بنابراین:

$$S_{20} - S_9 = \frac{30}{2}\left(2\left(-\frac{1}{2}\right) + 29\left(\frac{1}{2}\right)\right) - \frac{9}{2}\left(2\left(-\frac{1}{2}\right) + 8\left(\frac{1}{2}\right)\right) = 15\left(-1 + \frac{29}{2}\right) - \frac{9}{2}\left(-1 + 4\right) = 15\left(\frac{27}{2}\right) - \frac{9}{2}(3) = \frac{405}{2} - \frac{27}{2} = 189$$

مجموع ۴ جمله اول، برابر ۱۵ ($S_4 = 15$) و مجموع ۵ جمله بعدی برابر ۳۰ است. پس نتیجه میگیریم مجموع ۹ جمله اول آن برابر $45 = 30 + 15$ (۲۰)

$$\begin{cases} S_4 = 15 \Rightarrow \cancel{\frac{4}{2}}(2a_1 + 3d) = 15 \Rightarrow 2a_1 + 3d = \frac{15}{2} \\ S_9 = 45 \Rightarrow \cancel{\frac{9}{2}}(2a_1 + 8d) = \cancel{\frac{45}{2}} \Rightarrow \frac{1}{2}(2(a_1 + 4d)) = 5 \Rightarrow a_1 + 4d = 5 \end{cases} \Rightarrow a_1 = 3, d = \frac{1}{2}$$

$$a_{11} = a_1 + 10d = 3 + 10\left(\frac{1}{2}\right) = 3 + 5 = 8$$

مجموع پنج جمله اول S_5 و مجموع پنج جمله بعدی $S_{10} - S_5$ است. بنابراین طبق فرض مسئله داریم:

$$S_5 = \frac{1}{2}(S_{10} - S_5) \xrightarrow{\text{خواهد بود}} 3S_5 = S_{10} - S_5 \Rightarrow 4S_5 = S_{10} \Rightarrow \cancel{\frac{4}{2}} \times \cancel{\frac{5}{2}}(2a_1 + 4d) = \cancel{\frac{10}{2}}(2a_1 + 9d) \Rightarrow 10(2a_1 + 4d) = 5(2a_1 + 9d)$$

$$\Rightarrow 4a_1 + 8d = 2a_1 + 9d \Rightarrow d = 2a_1 \Rightarrow \frac{a_2}{a_1} = \frac{a_1 + d}{a_1} \xrightarrow{\text{دسته بندی}} \frac{a_1 + 2a_1}{a_1} = \frac{3a_1}{a_1} = 3$$

چون دنباله، ۴۱ جمله دارد، پس جمله وسط، جمله ۲۱ آم است (زیرا $21 = \frac{41+1}{2}$). بنابراین:

$$a_{21} = 20 \xrightarrow{\text{رابطه اندیس ها}} 5a_{21} = 20 \Rightarrow a_{21} = 4$$

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \Rightarrow S_{41} = \frac{41}{2}(a_1 + a_{41}) \xrightarrow{\text{رابطه اندیس ها}} \frac{41}{2}(2a_{21}) = 41(a_{21}) = 41(4) = 164$$

برای تعیین مجموع جملات از نکته زیر نیز می توان استفاده کرد:

نکته: اگر در یک دنباله حسابی تعداد جملات فرد باشد، مجموع جملات آن برابر است با تعداد جملات ضرب در جمله وسط.

بنابراین در این تست می توان نوشت: می دانیم $a_1 + a_2 + \dots + a_{10} = S_{10}$ و $a_1 + a_2 + \dots + a_7 = S_7$ ، پس نتیجه میگیریم:

$$S_{10} - S_7 = a_8 + a_9 + a_{10} = 6 \xrightarrow{\text{رابطه اندیس ها}} 3a_9 = 6 \Rightarrow a_9 = 2$$

$$a_6 + a_7 + \dots + a_{12} = (a_6 + a_{12}) + (a_7 + a_{11}) + (a_8 + a_{10}) + a_9 = 2a_9 + 2a_9 + 2a_9 + a_9 = 7a_9 = 7(2) = 14$$

$$\begin{aligned} a_1 + a_4 + a_6 + \dots + a_{19} &= 150 \\ a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{19} &= 135 \end{aligned}$$

مجموع جملات زوج و فرد را نوشته و از هم کم می‌کنیم:

۱ ۲۴

$$(a_2 - a_1) + (a_4 - a_3) + (a_6 - a_5) + \dots + (a_{19} - a_{18}) = 15 \Rightarrow d + d + \dots + d = 15 \Rightarrow 10d = 15 \Rightarrow d = 1.5$$

می‌دانیم $S_{20} = 150 + 135 = 285$, بنابراین:

$$S_{20} = \frac{20}{2} (2a_1 + 19d) = 285 \xrightarrow{d=1.5} 10(2a_1 + 19 \times 1.5) = 285 \Rightarrow 285 = 20a_1 + 285 \Rightarrow a_1 = 0.$$

۱ ۲۵

نکته: اگر دو دنباله حسابی با قدرنسبت‌های d_1 و d_2 دارای جملات مشترک باشند، این جملات مشترک، با یکدیگر تشکیل یک دنباله حسابی با قدرنسبتی برابر $k \cdot d_1 + d_2$ خواهند داد.

$$\left\{ \begin{array}{l} 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, \dots \Rightarrow 2 = \text{قدرنسبت} \\ 5, 8, 11, 14, 17, \dots \Rightarrow 3 = \text{قدرنسبت} \end{array} \right.$$

دنباله جملات مشترک به صورت $\dots, 8, 14, 20, \dots$ می‌باشد که جمله اول آن برابر ۸ و قدرنسبت آن برابر ۶ است (ک.م.م اعداد ۲ و ۳ برابر عدد ۶ می‌باشد).

حال تعداد جملات کمتر از ۱۰۰ این دنباله را تعیین می‌کنیم:

$$a_1 = 8, d = 6 ; a_n = a_1 + (n-1)d \Rightarrow a_n = 8 + (n-1)6 \Rightarrow a_n = 6n + 2$$

$$6n + 2 < 100 \Rightarrow 6n < 98 \Rightarrow n < \frac{98}{6} = 16.33 \Rightarrow n = 1, 2, \dots, 16$$

$$S_n = \frac{n}{2} (2a_1 + (n-1)d) \Rightarrow S_{16} = \frac{16}{2} (2 \times 8 + 15 \times 6) = 8(16 + 90) = 8 \times 106 = 848$$

این دنباله ۱۶ جمله دارد، بنابراین داریم:

$$\begin{array}{ccccccccc} & & 4 & & 4 & & 4 & & 4 \\ & \text{جمله اول} & \text{جمله دوم} & \text{جمله سوم} & \text{جمله چهارم} & & & & \\ a_1, \dots, a_4 & a_5, \dots, a_8 & a_9, \dots, a_{12} & a_{13}, \dots, a_{16} & & & & & \end{array}$$

۲ ۲۶

مجموع چهار جمله چهارم را منهای مجموع چهار جمله دوم می‌کنیم. با توجه به رابطه $a_m - a_n = (m-n)d$ داریم:

$$\begin{aligned} & a_{13} + a_{14} + a_{15} + a_{16} \\ - & a_5 + a_6 + a_7 + a_8 \end{aligned}$$

$$(a_{13} - a_5) + (a_{14} - a_6) + (a_{15} - a_7) + (a_{16} - a_8) = 8d + 8d + 8d + 8d = 32d$$

$$d = a_7 - a_1 = (5 + \sqrt{2}) - (3 + \sqrt{2}) = 2 \Rightarrow 32d = 64$$

$$\text{اگر رابطه } d = a_m - a_n = (m-n)d \text{ را بروایت نبود، لایهی همۀ عمومی هر کدوی را بنویسی و از هم کم کنی. مثلاً: } a_1 - a_5 = (a_1 + 12d) - (a_1 + 4d) = 8d$$

با توجه به رابطه $S_n = \frac{n}{2} (2a + (n-1)d)$ داریم:

$$S_8 = S_{14} \Rightarrow \frac{8}{2} (2a + 7d) = \frac{14}{2} (2a + 13d) \Rightarrow 8a + 28d = 14a + 91d \Rightarrow 6a + 63d = 0$$

$$\Rightarrow 3(2a + 21d) = 0 \Rightarrow 2a + 21d = 0 \quad (*)$$

$$S_{22} = \frac{22}{2} (2a + 21d) \xrightarrow{(*)} S_{22} = 11 \times 0 = 0$$

۲ ۲۷

نکره: به طور کلی می‌توان گفت در هر دنباله حسابی، اگر $S_m = S_n$ باشد، آنگاه $S_{m+n} = S_m + S_n$ برابر صفر است. اثبات این موضوع را در تست‌های یک گام فراتر خواهید دید.

۲ ۲۸ دنباله $\dots, 1, 4, 7, 10, \dots$ یک دنباله حسابی با قدرنسبت $3 = d$ می‌باشد، پس:

$$a_8 = a_1 + 7d = 1 + 21 = 22, a_{20} = a_1 + 19d = 1 + 59(3) = 178$$

بنابراین جملات $a_4, a_8, a_{12}, \dots, a_{20}$ به صورت $10, 22, \dots, 178$ در می‌آیند که خود یک دنباله عددی با جمله اول ۱۰ و قدرنسبت ۱۲ را تشکیل می‌دهند.

$$178 = 10 + (n-1)(12) \Rightarrow 12(n-1) = 168 \Rightarrow 12n = 180 \Rightarrow n = 15$$

در نتیجه داریم:

$$S_{15} = \frac{15}{2} (2(10) + (15-1)(12)) = \frac{15}{2} (188) = 15 \times 94 = 1410$$

برای تعیین قدرنسبت دنباله جدید از نکته زیر نیز می‌توان استفاده کرد:

نکته: اگر در دنباله حسابی $\{a_n\}$ با قدرنسبت d , جملات آن را با فاصله k از هم انتخاب کنیم، جملات حاصل، تشکیل یک دنباله حسابی جدید با قدرنسبت kd می‌دهند.

در این تست چون جملات چهارم، هشتم، دوازدهم و ... با فاصله ۴ تا از هم هستند، پس قدرنسبت برابر $4 \times 3 = 12$ است.

با توجه به مطالع درسنامه، a_n باید یک عبارت درجه دوم باشد که فقط گزینه (۱) این شرایط را دارد.
با توجه به مطالع درسنامه می‌دانیم جمله عمومی یک دنباله حسابی، عبارتی درجه اول برحسب n است و ضریب n برابر قدرنسبت می‌باشد.

پس برای این‌که a_n عبارت درجه دوم نباشد، باید ضریب n^2 را صفر بگیریم:

$$p - 2 = 0 \Rightarrow p = 2 \Rightarrow a_n = 3n - 5 \Rightarrow d = 3, a_1 = -2$$

$$S_n = \frac{n}{2} (2a + (n-1)d) \Rightarrow S_{10} = \frac{1}{2} (2(-2) + 9(3)) = 5(-4 + 27) = 115$$

می‌دانیم زمانی ۱ $S_n = (2p - 1)n^3 + qn^2 + pn + q + 1$ جمله اول یک دنباله حسابی باشد که جمله درجه سوم و جمله n مستقل از n نداشته باشد. بنابراین:

$$2p - 1 = 0 \Rightarrow p = \frac{1}{2}, q + 1 = 0 \Rightarrow q = -1 \Rightarrow S_n = -n^2 + \frac{n}{2}$$

$$S_{10} - S_5 = (-100 + 5) - \left(-25 + \frac{5}{2}\right) = -72.5$$

$$a_1 + a_2 + \dots + a_{10} = 70; \quad a_5 + a_{10} + \dots + a_{50} = 51$$

$$(a_1 + a_6) + (a_2 + a_{59}) + \dots + (a_{10} + a_{51}) + (a_{11} + a_{50}) = 121 \quad (*)$$

ابتدا دو رابطه بالا را با هم جمع می‌کنیم:

$$a_1 + a_6 = a_2 + a_{59} = \dots = a_{11} + a_{50} \xrightarrow{(*)} 11(a_1 + a_6) = 121 \Rightarrow a_1 + a_6 = 11$$

طبق رابطه اندیس‌ها داریم:

$$\text{مجموع } n \text{ جمله اول دنباله حسابی به فرم } S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \text{ می‌باشد، بنابراین:} \\ S_{10} = \frac{10}{2}(a_1 + a_{10}) = 5 \times 11 = 55$$

فرض می‌کنیم دنباله n جمله دارد. بنابراین با جمع سه جمله اول و سه جمله آخر داریم:

$$\begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 = 15 \\ a_n + a_{n-1} + a_{n-2} = 59 \end{cases} \Rightarrow (a_1 + a_n) + (a_2 + a_{n-1}) + (a_3 + a_{n-2}) = 84$$

با توجه به رابطه اندیس‌ها $a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = a_3 + a_{n-2}$ است، بنابراین:

$$3(a_1 + a_n) = 84 \Rightarrow a_1 + a_n = 28$$

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \Rightarrow 168 = \frac{n}{2}(28) \Rightarrow 168 = 14n \Rightarrow n = 12$$

در دسته اول، یک عدد فرد، در دسته دوم، دو عدد فرد، در دسته سوم، سه عدد فرد و به همین ترتیب در دسته بیستم، بیست عدد فرد وجود

$$1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2} \Rightarrow 1+2+\dots+20 = \frac{20 \times 21}{2} = 210 \quad \text{دارد. ابتدا تعداد کل جملات را از دسته اول تا دسته بیستم تعیین می‌کنیم:}$$

بنابراین آخرین جمله دسته بیستم، ۲۱۰ امین جمله دنباله اعداد فرد می‌باشد:

$$1, 3, 5, 7, \dots$$

$$a_n = a_1 + (n-1)d \xrightarrow{a_1=1, d=2} a_{21} = 1 + 20 \times 2 = 41$$

با توجه به فرض سوال، جمله آخر دسته ۲۱۰ برابر n است. پس آخرین عدد دسته نهم و دهم به ترتیب ۸۱ و ۱۰۰ هستند و در نتیجه دسته دهم

به صورت $(100, 82, 83, \dots, 82)$ خواهد بود، بنابراین دنباله دسته دهم، ۱۹ جمله دارد (زیرا $1 = 19 = 100 - 82$) که را به صورت زیر تعیین می‌کنیم:

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \Rightarrow S_{19} = \frac{19}{2}(82 + 100) = 1729$$

۵ جمله متولی دنباله حسابی را به صورت $a - 2d, a - d, a, a + d, a + 2d$ نمایش می‌دهیم، بنابراین:

$$a - 2d + a - d + a + a + d + a + 2d = 5a = 5 \Rightarrow a = 1 \quad \text{جمله وسط}$$

$$= (1 - 2d)^2 + (1 - d)^2 + 1^2 + (1 + d)^2 + (1 + 2d)^2 = 45 \quad \text{مجموع مربعات ۵ جمله}$$

$$\Rightarrow 1 + 4d^2 - 4d + 1 + d^2 - 2d + 1 + 1 + d^2 + 2d + 1 + 4d^2 + 4d = 45 \Rightarrow 5 + 10d^2 = 45 \Rightarrow d^2 = 4$$

جمله وسط برابر ۱ و $d^2 = 4$ است، بنابراین جمله وسط، $\frac{1}{4}$ مجذور قدرنسبت می‌باشد.

هریک از کسرهای راگویا می‌کنیم. تفاضل جملات متولی برابر قدرنسبت d است:

$$\underbrace{\frac{\sqrt{a_2} - \sqrt{a_1}}{a_2 - a_1}}_d + \underbrace{\frac{\sqrt{a_3} - \sqrt{a_2}}{a_3 - a_2}}_d + \dots + \underbrace{\frac{\sqrt{a_n} - \sqrt{a_{n-1}}}{a_n - a_{n-1}}}_d = \frac{\cancel{\sqrt{a_2} - \sqrt{a_1}} + \cancel{\sqrt{a_3} - \sqrt{a_2}} + \dots + \cancel{\sqrt{a_n} - \sqrt{a_{n-1}}}}{d}$$

$$= \frac{\sqrt{a_n} - \sqrt{a_1}}{d} = \frac{a_n - a_1}{d(\sqrt{a_n} + \sqrt{a_1})} = \frac{a_1 + (n-1)d - a_1}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a_1}} = \frac{n-1}{\sqrt{169} + \sqrt{4}} = \frac{n-1}{15}$$

$$a_n = a_{n+3} + 9 \Rightarrow a_1 + (n-1)d = a_1 + (n+2)d + 9 \Rightarrow 3d = -9 \Rightarrow d = -3$$

۱ ۳۸

$$a_7 = 3a_1 + d = 3(a_1 + 2d) \xrightarrow{d=-3} a_1 - 3 = 3a_1 - 18 \Rightarrow a_1 = \frac{15}{2}$$

برای تعیین مجموع چهار جمله سوم، دو روش وجود دارد:

روش اول:

$$a_n = a_9 + a_{10} + a_{11} + a_{12} = a_1 + 8d + a_1 + 9d + a_1 + 10d + a_1 + 11d = 4a_1 + 38d = 30 - 114 = -84$$

روش دوم:

$$S_{12} - S_8 = S_{12} - S_8 = \frac{12}{2}(2a_1 + 11d) - \frac{8}{2}(2a_1 + 7d) = 6(15 - 33) - 4(15 - 21) = -84$$

با فرض $a_1 = 5$ و $a_n = 53$ داریم: ۴ ۳۹

$$5, a_2, \dots, a_{n-1}, 53 \Rightarrow a_{n-1} - a_2 = 36 \Rightarrow a_1 + (n-2)d - (a_1 + d) = 36 \Rightarrow (n-3)d = 36 \quad (1)$$

$$a_n = a_1 + (n-1)d \Rightarrow 53 = 5 + (n-1)d \Rightarrow (n-1)d = 48 \quad (2)$$

از تقسیم دو رابطه (۱) و (۲)، تعداد جملات و قدرنسبت را به دست می‌آوریم:

$$\frac{(n-3)d}{(n-1)d} = \frac{36}{48} \Rightarrow \frac{n-3}{n-1} = \frac{3}{4} \Rightarrow 4n - 12 = 3n - 3 \Rightarrow n = 9 \xrightarrow{(n-3)d=36} d = 6$$

بنابراین واسطه‌های عددی به صورت $47, 11, 17, \dots$ می‌باشند که شامل ۷ جمله هستند. در نتیجه:

$$S_7 = \frac{7}{2}(11 + 47) = 7 \times 29 = 203$$

در دنباله $a_n = 2n - 1$ ، جمله اول برابر ۱ و جمله دوم برابر ۳ است، پس قدرنسبت دنباله ۲ می‌شود. از طرفی می‌دانیم اگر هر جمله را از جمله

بعدی کم کنیم، قدرنسبت به دست می‌آید، بنابراین:

$$\begin{aligned} & \frac{2}{a_1 a_2} + \frac{2}{a_2 a_3} + \frac{2}{a_3 a_4} + \dots + \frac{2}{a_{12} a_{13}} = \frac{d}{a_1 a_2} + \frac{d}{a_2 a_3} + \frac{d}{a_3 a_4} + \dots + \frac{d}{a_{12} a_{13}} \\ & = \frac{a_2 - a_1}{a_1 a_2} + \frac{a_3 - a_2}{a_2 a_3} + \frac{a_4 - a_3}{a_3 a_4} + \dots + \frac{a_{13} - a_{12}}{a_{12} a_{13}} = \frac{1}{a_1} - \cancel{\frac{1}{a_2}} + \cancel{\frac{1}{a_3}} - \cancel{\frac{1}{a_4}} + \cancel{\frac{1}{a_5}} - \cancel{\frac{1}{a_6}} + \dots + \cancel{\frac{1}{a_{12}}} - \cancel{\frac{1}{a_{13}}} \\ & = \frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_{13}} = \frac{1}{1} - \frac{1}{2(13)-1} = 1 - \frac{1}{25} = 1 - \frac{4}{100} = 0.96 \end{aligned}$$

دو مرحله که شامل یک حرکت افقی و یک حرکت عمودی است $3/25 = 1/5 + 1/75 = 3/25$ دقیقه (۱/۵ + ۱/۷۵ = ۳/۲۵) طول می‌کشد. پس اگر n تعداد مرحله‌هاباشد $20 = \frac{60}{3/25} = 20$ می‌شود. یعنی کوهنورد بعد از ۲۰ مرحله حرکت افقی و عمودی به قله می‌رسد. حال اگر S_1 و S_2 به ترتیب مجموع فواصل افقی وعمودی باشد، با توجه به رابطه $S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$ داریم: $S_1 = \frac{2}{2}(2(5/9) + 19(-1/2)) = 10(10/8 - 3/8) = 10(1/8) = 1000$

$$S_2 = \frac{2}{2}(2(43/8) + 19(-1/4)) = 10(87/8 - 7/8) = 10(10/8) = 100$$

$$AB = \sqrt{S_1^2 + S_2^2} = \sqrt{(1000)^2 + (100)^2} = \sqrt{1000000 + 10000} = \sqrt{1040000} = \sqrt{164 \times 10^4} = 100\sqrt{164}$$

می‌دانیم $a_6 - a_1 = 24$ است، پس با توجه به $a_n = a_1 q^{n-1}$ داریم: $a_6 - a_1 = 24 \Rightarrow a_1 q^5 - a_1 = 24 \Rightarrow a_1 (q^5 - 1) = 24$ ۲ ۴۲از طرفی $S_5 = 12$ است، بنابراین:

$$S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} \Rightarrow S_5 = \frac{a_1(1-q^5)}{1-q} \xrightarrow{a_1(q^5-1)=24} 12 = \frac{-24}{1-q} \Rightarrow 1-q = \frac{-24}{12} \Rightarrow 1-q = -2 \Rightarrow q = 3$$

می‌دانیم اگر a, b, c سه جمله متوالی دنباله هندسی باشند، آنگاه $ac = b^2$. پس ابتدا مقدار X را بدست می‌آوریم و به کمک آن q را تعیین می‌کنیم:

$$x^2 = 2\left(\frac{1}{2}\right) \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \Rightarrow 2, 1, \frac{1}{2}, \dots \Rightarrow \text{دنباله نزولی} \\ x = -1 \Rightarrow 2, -1, \frac{1}{2}, \dots \Rightarrow \text{دنباله غیرنزولی} \end{cases}$$

$$S_n = \frac{a(1-q^n)}{1-q} \Rightarrow S_5 = \frac{a_1(1-q^5)}{1-q} = \frac{2\left(1-\left(-\frac{1}{2}\right)^5\right)}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{2\left(1-\frac{1}{32}\right)}{\frac{3}{2}} = \frac{2\left(\frac{31}{32}\right)}{\frac{3}{2}} = \frac{4}{3} \times \frac{31}{32} = \frac{21}{16}$$

طبق واسطه هندسی بین سه جمله متولی دنباله هندسی داریم: ۴ ۴۴

$$a^2 = 4 \times 9 \Rightarrow a^2 = 36 \Rightarrow a = \pm 6 \Rightarrow \begin{cases} a = 6 & \Rightarrow 4, 6, 9, \dots \\ a = -6 & \Rightarrow 4, -6, 9, \dots \end{cases}$$

دنباله صعودی است. دنباله نه صعودی و نه نزولی است.

پس $a = 6$ قابل قبول است و در نتیجه $q = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$ می‌شود. بنابراین:

$$S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} \Rightarrow S_5 = \frac{4\left(1-\left(\frac{3}{2}\right)^5\right)}{1-\frac{3}{2}} = \frac{4\left(1-\frac{729}{64}\right)}{-\frac{1}{2}} = -8\left(1-\frac{729}{64}\right) = -8\left(-\frac{665}{64}\right) = \frac{665}{8} = 83\frac{1}{8}$$

با توجه به رابطه $(q \neq 1) S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$ داریم: ۴ ۴۵

$$\begin{cases} S_5 = \frac{a_1(1-q^5)}{1-q} = 153 \\ S_3 = \frac{a_1(1-q^3)}{1-q} = 136 \end{cases} \xrightarrow{\text{ تقسیم دو رابطه }} \frac{\cancel{a_1(1-q^5)}}{\cancel{1-q}} = \frac{153}{136} \Rightarrow \frac{1-q^5}{1-q^3} = \frac{153}{136}$$

$$\xrightarrow{\text{ مزدوج }} \frac{(1-q^4)(1+q^3)}{1-q^4} = \frac{153}{136} \Rightarrow 1+q^3 = \frac{153}{136} \Rightarrow q^3 = \frac{17}{136} = \frac{1}{8} \Rightarrow q = \frac{1}{2}$$

$$\frac{a_1}{a_5} = \frac{\cancel{a_1}}{\cancel{a_1}q^4} = \frac{1}{q^4} = \frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^4} = \frac{1}{\frac{1}{16}} = 16$$

حال نسبت $\frac{a_1}{a_5}$ را تعیین می‌کنیم:

یادت باشید در تست‌های این بخش، هم با در معادله‌ای $(q-1)$ رو با هم ساده کردیم، با فرض $1 \neq q$ این کار رو انجام دادیم.

تذکر: با توجه به درسنامه بین مجموع n جمله اول و مجموع $2n$ جمله اول، رابطه $1 + q^n = q^{2n}$ برقرار است، بنابراین در این تست از همان ابتدا می‌توانستیم بگوییم $1 + q^3 = q^6$ تا محاسبات ما بسیار کوتاه‌تر شود. در تست‌های بعد هم می‌توانید در صورت امکان این کار را انجام دهید.

از معادله $S_5 = (4\sqrt{2} + 1) S_1$ مقدار قدرنسبت را تعیین کرده و سپس حاصل $\frac{S_1}{S_4}$ را به دست می‌آوریم: ۱ ۴۶

$$S_1 = (4\sqrt{2} + 1) S_5 \Rightarrow \frac{\cancel{a_1(1-q^5)}}{1-q} = (4\sqrt{2} + 1) \left(\frac{\cancel{a_1(1-q^4)}}{1-q} \right) \xrightarrow{\text{ مزدوج }} (1-q^4)(1+q^4) = (4\sqrt{2} + 1)(1-q^4)$$

$$1+q^4 = 4\sqrt{2} + 1 \Rightarrow q^4 = 4\sqrt{2} = \sqrt{32} = \sqrt{16} = (\sqrt{2})^4 \Rightarrow q = \sqrt{2} \quad (*)$$

$$\frac{S_5}{S_4} = \frac{\frac{\cancel{a_1(1-q^5)}}{1-q}}{\frac{\cancel{a_1(1-q^4)}}{1-q}} = \frac{1-q^5}{1-q^4} \xrightarrow{\text{ مزدوج }} \frac{(1-q^4)(1+q^4)}{1-q^4} = 1+q^4 \xrightarrow{(*)} 1+(\sqrt{2})^4 = 1+16 = 17$$

$$\frac{a_1 a_2 a_3}{(a_4)^3} = \frac{a_1 \times a_1 q \times a_1 q^2}{(a_1 q^3)^3} = 64 \Rightarrow \frac{\cancel{a_1^3} q^3}{\cancel{a_1^3} q^9} = 64 \Rightarrow q^6 = \frac{1}{64} \Rightarrow q = \pm \frac{1}{2} \xrightarrow{\text{ دنباله نزولی با جمله اول مثبت }} q = \frac{1}{2}$$

باز هم یادآور می‌شویم که اگر $q < 0$ باشد، دنباله نه صعودی و نه نزولی است. حال $\frac{S_6}{a_1}$ را تعیین می‌کنیم:

$$\frac{S_5}{a_1} = \frac{\cancel{a_1(1-q^5)}}{\cancel{a_1}} = \frac{1-q^5}{1-q} = \frac{1-\frac{1}{64}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{\frac{63}{64}}{\frac{1}{2}} = \frac{63}{32}$$

چون شش جمله درج می‌کنیم، پس دنباله حاصل ۸ جمله دارد که جمله اول ۲ و جمله هشتم برابر $16\sqrt{2}$ است: ۲ ۴۷

$$a_8 = a_1 q^7 \Rightarrow 16\sqrt{2} = 2q^7 \Rightarrow 8\sqrt{2} = q^7 \Rightarrow 2^3 \times 2^2 = q^7 \Rightarrow 2^2 = q^7 \Rightarrow (\frac{1}{2^2})^7 = q^7 \Rightarrow (\sqrt{2})^7 = q^7 \Rightarrow q = \sqrt{2}$$

$$S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} \Rightarrow S_8 = \frac{2(1-(\sqrt{2})^8)}{1-\sqrt{2}} = \frac{2(1-16)}{1-\sqrt{2}} = \frac{-30}{1-\sqrt{2}} = \frac{30}{\sqrt{2}-1} \times \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}+1} = 30(\sqrt{2}+1)$$

۳ ۴۹

$$S_4 = 3 \Rightarrow \frac{a_1(1-q^4)}{1-q} = 3 \Rightarrow \frac{a_1(1-q)(1+q)(1+q^2)}{1-q} = 3 \Rightarrow a_1(1+q)(1+q^2) = 3$$

$$a_1 + a_4 = 1 \Rightarrow a_1 + a_1 q^3 = 1 \Rightarrow a_1(1+q^3) = 1$$

از تقسیم دو رابطه بالا داریم:

$$\frac{a_1(1+q)(1+q^2)}{a_1(1+q^3)} = 3 \Rightarrow 1+q = 3 \Rightarrow q = 2 \xrightarrow{a_1(1+q^2)=1} a_1 = \frac{1}{5} \Rightarrow S_5 = \frac{a_1(1-q^5)}{1-q} = \frac{\frac{1}{5}(1-32)}{-1} = \frac{1}{5}(-27) = -\frac{27}{5}$$

روش اول: هر لایه، مقداری از مواد، مضر را جذب و مقداری را رد می‌کند. در این روش معلوم می‌کنیم که چند لایه قرار دهیم تا مجموع جذب لایه‌ها بیشتر از ۹۷ درصد شود.

اولین لایه، نصف مواد مضر را جذب و نصف آن را رد می‌کند، دومین لایه از نیم باقی مانده، نیمی از مواد مضر یعنی $\frac{1}{4}$ آن را جذب می‌کند و به همین ترتیب مقداری که هر لایه، مواد مضر را جذب می‌کند به صورت دنباله زیر خواهد بود:

اين دنباله يك دنباله هندسي با قدرناسبت $\frac{1}{2}$ مي باشد. حال مي خواهيم بدانيم چند جمله از جملات اين دنباله جمع شود تا حاصل، حداقل ۹۷ درصد شود:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} \geq \frac{97}{100} \Rightarrow \frac{\frac{1}{2}(1-(\frac{1}{2})^n)}{1-\frac{1}{2}} \geq \frac{97}{100} \Rightarrow 1 - \frac{1}{2^n} \geq \frac{97}{100} \Rightarrow \frac{1}{2^n} \leq \frac{3}{100} \Rightarrow 2^n \geq \frac{100}{3} \approx 33.3 \Rightarrow n \geq 6$$

توجه کنید که با آزمایش اعداد طبیعی در نامعادله $2^n \geq 33.3$ و این که $2^6 = 64$ ، در می‌باییم که حداقل مقدار n برابر ۶ خواهد بود. پس تعداد لایه‌ها باید حداقل ۶ تا باشد.

روش دوم: وقتی می‌گوییم ۹۷ درصد مواد، جذب لایه‌های محافظتی شده، بدین معنی است که ۳ درصد مواد مضر از لایه‌ها رد شده‌اند. در این روش معلوم می‌کنیم که چند لایه قرار دهیم تا کمتر از ۳ درصد مواد از لایه‌ها خارج شوند. اولین لایه شدت تابش را $\frac{1}{2}$ می‌کند، یعنی نصف مواد مضر از آن رد می‌شوند، لایه دوم از


نیم باقی‌مانده، نیمی از مواد مضر یعنی $\frac{1}{4}$ را رد می‌کند و به همین ترتیب در لایه n ام $\frac{1}{2^n}$ از مواد مضر از آن خارج می‌شود. بنابراین:

روش اول، روش کتاب درسی، اما روش دو، سریع‌تر و کوتاه‌تره. سعی کن مفهوم هر دو روش رو فوب یاد بگیری.

روش اول: مساحت مربع اولیه برابر ۱ است. در مرحله اول $\frac{1}{2}$ ، مرحله دوم $\frac{1}{4}$ ، مرحله سوم $\frac{1}{8}$ و به همین ترتیب، قسمتی از مربع که در هر مرحله رنگ

می‌شود، تشکیل يك دنباله هندسي با جمله اول $a_1 = \frac{1}{2}$ و قدرناسبت $\frac{1}{2}$ می‌دهند:

حال باید مجموع این مساحت‌های رنگ شده، بزرگ‌تر یا مساوی $\frac{99}{100}$ باشد:



$$S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{\frac{1}{2}(1-(\frac{1}{2})^n)}{1-\frac{1}{2}} = 1 - (\frac{1}{2})^n$$

$$S_n \geq \frac{99}{100} \Rightarrow 1 - (\frac{1}{2})^n \geq \frac{99}{100} \Rightarrow \frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{100} \Rightarrow 2^n \geq 100 \Rightarrow n \geq 7$$

یعنی بعد از مرحله هفتم، حداقل ۹۹ درصد مربع رنگ شده است.

روش دوم: به جای این‌که بگوییم، مجموع مساحت‌های رنگ شده بزرگ‌تر یا مساوی $\frac{99}{100}$ باشد، می‌گوییم باید مساحت قسمت رنگ‌نشده کمتر یا مساوی $\frac{1}{100}$

باشد. در مرحله اول $\frac{1}{2}$ ، مرحله دوم $\frac{1}{4}$ ، مرحله سوم $\frac{1}{8}$ و به همین ترتیب در مرحله n ام، $\frac{1}{2^n}$ از مساحت مربع رنگ نشده است. پس داریم:

$\frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{100} \Rightarrow 2^n \geq 100 \Rightarrow n \geq 7$

می‌دانیم اگر جمله اول یک دنباله هندسی a_1 ، قدرناسبت آن q و تعداد جملات آن n باشد، آن‌گاه مجموع تمام جملات برابر است با:

$$S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$$

دباله جملات ردیف فرد، یک دنباله هندسی است که جمله اول آن a_1 ، قدرناسبت آن q^3 و تعداد جملات آن $\frac{n}{3}$ می‌باشد. پس مجموع جملات ردیف فرد برابر است با:

$$S_{\frac{n}{3}} = \frac{a_1((1-q^3)^{\frac{n}{3}})}{1-q^3} = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q^3}$$

۳ ۵۲

در نتیجه داریم:

$$S_n = \frac{3}{\gamma} S_{\frac{n}{\gamma}} \Rightarrow \frac{a(1-q^n)}{1-q} = 3 \times \frac{a(1-q^{\frac{n}{\gamma}})}{1-q^{\frac{\gamma}{\gamma}}} \Rightarrow \frac{1}{1-q} = \frac{3}{1-q^{\frac{\gamma}{\gamma}}} \Rightarrow \frac{1}{1-q} = \frac{3}{(1-q)(1+q)} \Rightarrow \frac{3}{1+q} = 1 \Rightarrow q+1=3 \Rightarrow q=2$$

جملات اول، دوم و ششم دنباله حسابی به صورت $a, a+d, a+2d, \dots, a+(n-1)d$ هستند. چون این جملات، تشکیل دنباله هندسی می‌دهند، پس می‌توان نوشت:

$$a(a+2d) = (a+d)^2 \Rightarrow a^2 + 2ad = a^2 + d^2 + 2ad \Rightarrow 2ad = d^2 \xrightarrow{d \neq 0} d = 2a$$

$$S_n = \frac{n}{\gamma} (2a + (n-1)d) \Rightarrow S_{\frac{n}{\gamma}} = \frac{1}{\gamma} (2a + (n-1)d) \xrightarrow{d=2a} S_{\frac{n}{\gamma}} = 5(2a + 27a) = 5(29a) = 145a$$

روش اول: جملات اول، پنجم و هفدهم دنباله حسابی به صورت $a, a+4d, a+16d, \dots, a+(n-1)4d$ هستند. چون این جملات، تشکیل دنباله هندسی می‌دهند پس می‌توان نوشت:

$$a(a+16d) = (a+4d)^2 \Rightarrow a^2 + 16ad = a^2 + 16d^2 + 8ad \Rightarrow 8ad = 16d^2 \xrightarrow{d \neq 0} a = 2d$$

با جایگزینی $a = 2d$ جملات $a, a+4d, a+16d, \dots, a+(n-1)4d$ به صورت $2d, 6d, 18d, \dots, 2d+(n-1)8d$ در می‌آیند. چون این اعداد، جملات متولای دنباله هندسی اند،

پس $q = 3$ می‌شود. حال مجموع چهار جمله اول دنباله هندسی را به دست می‌آوریم:

$$S_4 = \frac{a(1-q^4)}{1-q} = \frac{a(1-3^4)}{1-3} = \frac{a(-80)}{-2} = 40a$$

یادآوری: اگر در یک دنباله حسابی غیرثابت جملات m, n, \dots, p ($p > n > m$) به ترتیب جملات متولای از یک دنباله هندسی باشند، آن‌گاه

$$\text{قدرنسبت دنباله هندسی از رابطه } q = \frac{p-n}{n-m} \text{ به دست می‌آید.}$$

روش دوم: با توجه به مطلب بالا $q = \frac{17-5}{5-1} = \frac{12}{4} = 3$ می‌باشد و در ادامه مانند راه حل اول $S_4 = 40a$ به دست می‌آید.

روش اول: عبارت $x^1 + x^2 + \dots + x^p$ مجموع ۹ جمله اول دنباله هندسی با جمله اول $a_1 = 1$ و قدرنسبت $x = q$ و $a_1 = 1$

$$S_n = \frac{a(1-q^n)}{1-q} = \frac{a(1-q^9)}{1-q} = \frac{a(-512)}{-1} = 512 \quad \text{قدرنسبت دنباله هندسی از رابطه } q = \frac{p-n}{n-m} \text{ به دست می‌آید.}$$

$$A = \frac{(1-x^9)}{1-x} \times \frac{1-(-x)^9}{1+x} = \frac{(1-x^9)(1+x^9)}{(1-x)(1+x)} \xrightarrow{\text{اتحاد مزدوج}} \frac{1-x^{18}}{1-x^2} \quad \text{داریم:}$$

$$\frac{x=\sqrt{2}}{1-(\sqrt{2})^2} \frac{1-(\sqrt{2})^{18}}{1-2} = \frac{1-2^9}{1-2} = \frac{1-512}{-1} = 511 \quad \text{روش دوم: از اتحادهایی که در درسنامه به آن‌ها اشاره شد استفاده می‌کنیم:}$$

$$(x^n - y^n) = (x-y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + \dots + y^{n-1}) \Rightarrow x^9 - 1 = (x-1)(x^8 + x^7 + \dots + 1)$$

$$(x^n + y^n) = (x+y)(x^{n-1} - x^{n-2}y + \dots + y^{n-1}) \Rightarrow x^9 + 1 = (x+1)(x^8 - x^7 + \dots + 1)$$

$$\Rightarrow A = (1+x+x^2+\dots+x^8)(1-x+x^2-\dots+x^8) = \frac{x^9-1}{x-1} \times \frac{x^9+1}{x+1} = \frac{x^{18}-1}{x^2-1} \quad \text{مانند روش اول ۵۱۱}$$

عبارت $A = 1+t+t^2+\dots+t^8$ مجموع ۱۲ جمله اول یک دنباله هندسی با جمله اول $a_1 = 1$ و $q = t$ می‌باشد. هم‌چنین

عبارت $B = 1+t^3+t^6+t^9$ مجموع ۴ جمله اول یک دنباله هندسی با جمله اول $a_1 = 1$ و $q = t^3$ می‌باشد، بنابراین:

$$A = S_{12} = \frac{1(1-t^{12})}{1-t}$$

$$B = S_4 = \frac{1(1-t^4)}{1-t^3} \Rightarrow \frac{A}{B} = \frac{1-t^3}{1-t} = \frac{(1-t)(1+t+t^2)}{1-t} = 1+t+t^2 = 1 + \frac{\sqrt{5}-1}{2} + \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^2 \\ = 1 + \frac{\sqrt{5}-1}{2} + \frac{6-2\sqrt{5}}{4} = 1 + \frac{2\sqrt{5}-2+6-2\sqrt{5}}{4} = 1+1=2$$

روش اول: می‌دانیم حاصل تقسیم دو جمله متولای یک دنباله هندسی برابر قدرنسبت است:

$$q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{\sqrt[4]{243}}{\sqrt[3]{27}} = \frac{\sqrt[4]{243}}{\sqrt[4]{9}} = \sqrt[4]{27}$$

در نتیجه نسبت مجموع چهار جمله اول به مجموع چهار جمله دوم برابر است با:

$$\frac{a_1+a_2+a_3+a_4}{a_5+a_6+a_7+a_8} = \frac{a_1+a_1q+a_1q^2+a_1q^3}{a_1q^4+a_1q^5+a_1q^6+a_1q^7} = \frac{a_1+a_1q+a_1q^2+a_1q^3}{q^4(a_1+a_1q+a_1q^2+a_1q^3)} = \frac{1}{q^4} = \frac{1}{(\sqrt[4]{27})^4} = \frac{1}{27}$$

روش دوم: قدرنسبت مانند روش اول برابر $q = \sqrt[4]{27}$ است.

مجموع چهار جمله اول S_4 و مجموع چهار جمله دوم $S_8 - S_4$ را تعیین کنیم، برای راحتی کار ابتدا S_4 را به دست آورده و جواب حاصل را معکوس می‌کنیم:

$$\frac{S_8 - S_4}{S_4} = \frac{S_8}{S_4} - 1 = \frac{\frac{a(1-q^8)}{1-q}}{\frac{a(1-q^4)}{1-q}} - 1 = \frac{1-q^8}{1-q^4} - 1 = \frac{(1-q^4)(1+q^4)}{1-q^4} - 1 = 1+q^4 - 1 = q^4 = (\sqrt[4]{27})^4 = 27 \Rightarrow \frac{S_4}{S_8 - S_4} = \frac{1}{27}$$

می‌دانیم اگر a, b و c دنباله‌ای هندسی تشکیل دهند، آن‌گاه $b^2 = ac$ است، بنابراین:

$$(2x)^2 = (x^2 - 2)(x^2 + 4) \Rightarrow 4x^2 = x^4 + 2x^2 - 8 \Rightarrow x^4 - 2x^2 - 8 = 0 \Rightarrow (x^2)^2 - 2(x^2) - 8 = 0$$

$$\Rightarrow (x^2 - 4)(x^2 + 4) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x^2 + 4 = 0 \Rightarrow x^2 = -4 \\ x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2 \end{cases}$$

از جواب $x = 2$ دنباله هندسی ...,-4,-2,-8 به دست می‌آید که نزولی نیست، اما از جواب $x = -2$ دنباله هندسی نزولی ...,-4,-2,-8 به دست می‌آید که قدرنسبت

آن برابر $\frac{1}{2}$ است. در نتیجه داریم:

$$S_7 = \frac{a(1 - (\frac{1}{2})^7)}{1 - \frac{1}{2}} = 16\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^7\right) = 16 - 16 \times \frac{1}{2^7} = 16 - \frac{1}{8} = \frac{127}{8}$$

اگه نموده می‌کنیم $x^4 - 8 - 2x^2 = 0$ را فوب تفهیمی داریم، در بخش بعدی این نوع معادلات را توضیح می‌دمیم.

تعداد گندمهای موجود در هر خانه تشکیل یک دنباله هندسی می‌دهند که جمله اول آن ۱، قدرنسبت آن ۲ و تعداد جمله‌ها ۶۴ می‌باشد. تعداد کل گندمهای حاصل جمع جملات این دنباله است:

$$S_n = \frac{a(1 - q^n)}{1 - q} = \frac{1(1 - 2^{64})}{1 - 2} = 2^{64} - 1 = (2^4)^{16} - 1 = 16^{16} - 1$$

حال $1 - 2^{64}$ گرم را با 1000 میلیارد تن مقایسه می‌کنیم. (با صرفنظر کردن از یک گرم عدد $1 - 2^{64}$ را به صورت ساده‌تر 2^{64} می‌نویسیم)، می‌دانیم هزار میلیارد برابر 10^{12} و هر یک تن برابر 10^6 گرم است، پس هزار میلیارد تن برابر 10^{18} گرم می‌باشد. از طرفی $(10^3)^6 = 10^{18}$ و $2^{64} = (2^{10})^6 = 10^{18}$ است.

بنابراین داریم: $2^{10} = 1024$, $10^3 = 1000$ $\Rightarrow 2^{10} > 10^3$ $\Rightarrow 2^{10} > (10^3)^6$ $\Rightarrow 2^{10} > 10^{18}$

پس وزن کل گندمهای از 1000 میلیارد تن بیشتر است. (البته با مقایسه بالا حتی می‌توان گفت از 16000 میلیارد تن هم بیشتر است). این مسئله به نام مسئله شترنج معروفه که ابویهان بیرونی، ریاضی‌دان پرسنسته ایرانی به روش فوتش اون رو حل کرده. عدد حاصل، این قدر زیاده که اگه کل مساحت کره زمین رو هم گندم پکاریم باز پاسخ‌گوی این میزان گندم نیست.

جملات دنباله به صورت $1, 2, 4, 8, \dots$ است که باید $S_n \geq 64$ باشد. (هر کیلوگرم برابر 1000 گرم است). در نتیجه داریم:

$$S_n = \frac{a(1 - q^n)}{1 - q} = \frac{1 - 2^n}{1 - 2} \geq 64 \quad (1000) \Rightarrow 2^n - 1 \geq 64 \quad (1000) \Rightarrow 2^n \geq 65 \quad (1000) + 1$$

برای حل ساده‌تر نامعادله بالا ابتدا از عدد ۱ صرفنظر می‌کنیم:

$$2^n \geq 65 \quad (1000) \Rightarrow 2^n \geq 2^6 \quad (1000) \Rightarrow \frac{2^n}{2^6} \geq \frac{1000}{64} \Rightarrow 2^{n-6} \geq 1000$$


می‌دانیم $2^{10} = 1024$ و $2^9 = 512$ می‌باشد، بنابراین نامعادله بالا زمانی برقرار است که $10 - n \geq 6 \geq 16 - n$ و در نتیجه $n \geq 16$ باشد.

وقتی توپ را پرتاب می‌کنیم، 64 متر بالا رود و بعد 64 متر پایین می‌آید، یعنی از لحظه پرتاب تا برخورد اول $128 = 2 \times 64$ متر مسافت طی می‌کند، سپس 32 متر بالا و 22 متر پایین می‌آید، یعنی در مرحله دوم 64 متر طی می‌کند. بنابراین دنباله مسافت‌های طی شده (برحسب متر) در هر مرحله به صورت مقابل است: $128, 64, 32, \dots$


این دنباله، یک دنباله هندسی با جمله اول $128 = a_1$ و قدرنسبت $q = \frac{1}{2}$ است.

برای این‌که کل مسافت پیموده شده در لحظه‌ای که توپ برای بار دهم به زمین برخورد می‌کند را حساب کنیم، کافی است S_{10} را به دست آوریم:

$$S_n = \frac{a(1 - q^n)}{1 - q} \Rightarrow S_{10} = \frac{128\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{10}\right)}{1 - \frac{1}{2}} = 256\left(1 - \frac{1}{2^{10}}\right) = 256\left(\frac{2^{10} - 1}{2^{10}}\right) = 256\left(\frac{1024 - 1}{1024}\right) = \frac{1023}{4} = 255.75$$



سؤال: در شرایط این تست اگر توب را از ارتفاع ۶۴ متری رها کنیم چه مسافتی را طی خواهد کرد؟



در این حالت توب فقط در مرتبه اول برخورد به زمین، یک مسافت از بالا به پایین را طی می‌کند. اما در مراتب بعدی یک مسافت پایین به بالا و یک مسافت بالا به پایین را طی می‌کند. یعنی در اولین برخورد ۶۴ متر، دومین برخورد $2 \times 32 = 64$ متر و سومین برخورد $2 \times 16 = 32$ متر را می‌پیماید که به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند. یعنی کل مسافت حاصل $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 64 + 64 + 32 + 16 + \dots + 8$ می‌باشد که ۶۴ متر کمتر از حاصل این تست می‌باشد، بنابراین: $255/75 - 64 = 191/75$

۱۶۲ اگر موجودی اولیه را m در نظر بگیریم، بعد از یک سال، سود آن برابر $\frac{2}{100}m = \frac{2}{10}m$ است. پس در پایان سال اول، موجودی برابر $a_1 = m + \frac{2}{10}m = m(1 + \frac{2}{10})$ می‌شود، در نتیجه در پایان سال دوم، موجودی برابر است با:

$$a_2 = a_1 + \frac{2}{10}a_1 = a_1(1 + \frac{2}{10}) = m(1 + \frac{2}{10})(1 + \frac{2}{10}) = m(1 + \frac{2}{10})^2$$

به همین ترتیب مقدار موجودی در هر سال، جملات یک دنباله هندسی با قدرنسبت $\frac{2}{10} + 1 = \frac{12}{10}$ می‌باشد. بنابراین مقدار موجودی بعد از n سال به صورت زیر به دست می‌آید:

$$a_n = m(1 + \frac{2}{10})^n \Rightarrow a_5 = 2000000(1 + \frac{2}{10})^5 = 2 \times 10^6 (\frac{12}{10})^5 = 2 \times 10^6 \times \frac{12^5}{10^5} = 20(250000) = 5000000$$

۱۶۳ محیط دایره به قطر d برابر است با $P = \pi d$ ، پس محیط نیم‌دایره $\frac{\pi d}{2}$ می‌باشد.

در این سؤال هر بار که موج به محور برخورد می‌کند، ۲۰ درصد از طول قطر آن کم می‌شود، یعنی ۸۰ درصد از طول قطر آن باقی می‌ماند، بنابراین داریم:

$\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \dots, \frac{\pi}{2}$: دنباله محیط نیم‌دایره‌ها $\rightarrow 1, 0, 8, 0, 8, 0, \dots$: دنباله طول قطرها

مالحظه می‌شود که محیط نیم‌دایره‌ها تشکیل یک دنباله هندسی با جملة اول $\frac{\pi}{2}$ و قدرنسبت $0/8 = \frac{1}{8}$ می‌دهند، در نتیجه:

$$S_n = \frac{a(1-q^n)}{1-q} \Rightarrow S_5 = \frac{\frac{\pi}{2}(1-(\frac{4}{5})^5)}{1-\frac{4}{5}} \Rightarrow S_5 = \frac{5\pi}{2}(1-(\frac{4}{5})^5)$$

۱۶۴ کافی است هر یک از کسرها را به صورت زیر تفکیک کنیم:

$$\frac{1}{2 \times 5} = \frac{1}{3}(\frac{5-2}{2 \times 5}) = \frac{1}{3}(\frac{1}{2} - \frac{1}{5}) ; \quad \frac{1}{5 \times 8} = \frac{1}{3}(\frac{8-5}{5 \times 8}) = \frac{1}{3}(\frac{1}{5} - \frac{1}{8})$$

به همین ترتیب همه کسرها را تفکیک کرده و از $\frac{1}{3}$ فاکتور می‌گیریم:

$$\frac{1}{2 \times 5} + \frac{1}{5 \times 8} + \dots + \frac{1}{17 \times 20} = \frac{1}{3}(\frac{1}{2} - \cancel{\frac{1}{5}} + \cancel{\frac{1}{5}} - \cancel{\frac{1}{8}} + \cancel{\frac{1}{8}} - \cancel{\frac{1}{11}} + \cancel{\frac{1}{11}} - \dots - \cancel{\frac{1}{17}} + \cancel{\frac{1}{17}} - \cancel{\frac{1}{20}}) = \frac{1}{3}(\frac{1}{2} - \frac{1}{20}) = \frac{3}{20} = \frac{15}{100} = 0/15$$

معمولأ بررسی این نوع سؤال‌ها در کتاب نظام قدریم بخش سری مطرح می‌شود. و میشه گفت به دنباله حسابی فیلی ربط نداره اپن آگه راهنم این تست به ذهننت نرسید نگران نباش.

۱۶۵ ابتدا از x^3 فاکتور می‌گیریم و بعد از اتحاد چاق و لاغر $(a^3 + b^3) = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$ استفاده می‌کنیم:

$$x^9 + x^3y^3 = x^3(x^6 + y^3) = x^3((x^2)^3 + y^3) = x^3(x^2 + y)(x^4 - x^2y + y^2)$$

۱۶۶ می‌دانیم اگر n فرد باشد $(x+y)^n = (x+y)(x^{n-1} - x^{n-2}y + \dots + y^{n-1})$ یعنی $x^n + y^n = (x+y)(x^{n-1} - x^{n-2}y + \dots + y^{n-1})$ بخش پذیر است، بنابراین عبارت $x^n + y^n$ بخش پذیر است. نیز بر $(x^3 + 2x^2 + 1)^9 + (x^3 - x^2 + 3)^9$ بخش پذیر است.

۱۶۷ با استفاده از اتحاد $(x^n + y^n) = (x+y)(x^{n-1} - x^{n-2}y + \dots + y^{n-1})$ را تجزیه می‌کنیم:

$$A = \frac{(x+1)(x^6 - x^5 + x^4 - x^3 + x^2 - x + 1)(x-2)}{(x+1)(x-2)} + x^5 + x^3 + x = x^6 + x^4 + x^2 + 1$$

$$\frac{x=\sqrt{3}}{=} (\sqrt{3})^6 + (\sqrt{3})^4 + (\sqrt{3})^2 + 1 = 3^3 + 3^2 + 3 + 1 = 40$$