

مقدمه ناشر

خیلیا برای فرار از درس ریاضی و خیلیا به عشق درس ریاضی رشته‌شون رو انتخاب می‌کنن. گروه اول همیشه در شگفت‌اند که این ریاضی مگه چی داره که بعضیا دیوانه‌وار عاشقش و باهاش حال می‌کنن؟! ولی گروه دوم، مثل خود شما که رشتتون ریاضیه بهتر از هر کس می‌دونین که «لذتی که در حل مسئله هست حتی در انتقام هم نیست!». اون لحظه باشکوه، حس عجیبی به آدم می‌ده. همون لحظه که میگی «آهان! فهمیدم!». همون لحظه کشف جواب! انگار با آریبی جی زدی وسط تانک دشمن. هر چی مسئله چغرت تر و بد بدن تر، این حس قوی تر و لذت بخش تر. نمی‌دونم توی اون لحظه کدوم محرک باعث می‌شه که چه بخشی از مغزمون دستور صادر کنه تا چه هورمونی از کجای بدنمون فوران کنه! ولی هر چی که هست معرکه است. مخصوصن اگه با یه مسئله هندسه طرف باشیم. امیدواریم این کتاب براتون پر از این لحظه‌های ناب باشه و با خوندنش هم حسابی کیف کنید و هم توی کنکورها حسابی بترکونید.

برای به ثمر رسیدن این کتاب آدمای مهم و زیادی زحمت کشیدن. دم همتون گرم. مصطفی جان و علیرضا جان، خسته نباشین! انصافن خوب کتابی شد. رسول خان، ممنون که از اول تا آخر خط کنارمون بودی. زنده باد دوستای خستگی‌ناپذیرمون در واحد تألیف و تولید خیلی سبز و درود بر ویراستارای خوب و دقیقمون.

**بروبچه‌های ریاضی، دم شما هم گرم
مواظب خودتون باشید!**

مقدمه مولف

به کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای هندسهٔ جامع خوش آمدید.

حتماً می‌دانید که درس هندسه در کنکورهای نظام جدید (از سال ۱۳۹۸ به بعد) بیشتر از قبل اهمیت پیدا کرده و سهم قابل توجهی از تست‌های ریاضیات را به خود اختصاص داده است. پس لازم است برای رسیدن به یک نتیجهٔ عالی به این درس توجه ویژه‌ای داشته باشید. این کتاب هم برای همین کار تألیف شده است و قرار است شما را برای آزمون‌های آزمایشی، امتحانات مدرسه و در نهایت برای کنکور آماده کند.

دربارهٔ کتاب:

- درس‌نامه‌ها با دقت و وسواس زیاد و تا حد ممکن خودآموز و کاربردی نوشته شده است. تلاش کردیم از چهارچوب مباحث نظام جدید خارج نشویم.
- برای طراحی تست‌ها، تمام فعالیت‌ها و تمرین‌های کتاب درسی و سؤالات کنکور بیست سال اخیر را به دقت بررسی کردیم و برای دسته‌بندی و چیدمان تست‌ها روند آموزشی مناسب را معیار قرار داده‌ایم.
- پاسخ‌های تشریحی به صورت گام به گام و با توضیح کافی نوشته شده‌اند.
- در تست‌های هر درس، کنار تست‌های عادی یک آیکون (☹) گذاشته‌ایم. قرار است شما بعد از حل هر تست و بررسی پاسخ‌نامهٔ آن این آیکون را به یکی از سه آیکون زیر تبدیل کنید:
☺ یعنی تست آسان ☹ یعنی تست متوسط ☹ یعنی تست دشوار
- این نمادگذاری باعث می‌شود تا بعداً که خواستید فصل را دوره کنید بتوانید تصمیم بگیرید که کدام تست‌ها را باید حل کنید.
- شمارهٔ تست‌های مهم را رنگی کرده‌ایم. از این تست‌ها برای مرور و جمع‌بندی مباحث استفاده کنید. برای بعضی از تست‌ها هم نماد (Ⓢ) داریم. این نماد نشان‌دهندهٔ تست‌های دشوار است.
- برای سه فصل اول، که مربوط به کل کتاب درسی هندسهٔ دوازدهم هستند و حجم زیادی دارند، یک آزمون جامع در پایان فصل قرار داده‌ایم.

قدردانی:

- مخاطب اولین تشکر دکتر کمیل نصری است؛ بابت اعتمادشان به ما.
- از دکتر کورش اسلامی، مهندس سروش موئینی و دکتر علی‌اصغر شریفی بابت نظرات و پیشنهادهای سازنده‌شان تشکر می‌کنیم.
- تشکر ویژه از مدیر تألیف باهوش و باسواد، مهندس نوید شاهی و دوست عزیزمان مهندس رسول محسنی‌منش که سهم ویژه‌ای در تولید کتاب، از ابتدا تا انتها داشتند. طی جلسات متعددی، ساعت‌های زیادی صرف ویرایش و اصلاح نوشته‌هایمان کردیم تا کتاب به شکلی که می‌بینید، درآید. جلسه‌های دوشنبه عصر برای ما بسیار شیرین بود.
- از تیم اجرایی، به ویژه خانم هدی ملک‌پور گرامی و واحد تولید خیلی‌سبز، خیلی خیلی ممنونیم. دمتان گرم.

فهرست

تست	درس نامه		
۴۲	۸	درس ۱: ماتریس و اعمال روی ماتریس‌ها	فصل اول ماتریس و کاربردها
۵۰	۲۳	درس ۲: وارون ماتریس و دترمینان	
۱۰۱	۶۸	درس ۱: مکان هندسی	فصل دوم آشنایی با مقاطع مخروطی
۱۰۲	۷۰	درس ۲: دایره	
۱۰۷	۸۲	درس ۳: بیضی	
۱۱۲	۹۳	درس ۴: سهمی	
۱۴۱	۱۲۱	درس ۱: معرفی فضای R^3	فصل سوم بردارها
۱۴۸	۱۳۳	درس ۲: ضرب داخلی دو بردار	
۱۵۴	۱۳۷	درس ۳: ضرب خارجی دو بردار	
۱۶۸	۱۵۹		فصل چهارم ترسیم‌های هندسی و استدلال
۱۸۸	۱۷۶		فصل پنجم قضیهٔ تالس، تشابه و کاربردها
۲۲۱	۱۹۹		فصل ششم چندضلعی‌ها
۲۴۷	۲۳۵		فصل هفتم تجسم فضایی
۲۷۰	۲۵۶		فصل هشتم دایره
۲۹۱	۲۸۱		فصل نهم تبدیل‌های هندسی و کاربردها
۳۱۴	۳۰۰		فصل دهم روابط طولی در مثلث
۳۲۴			پاسخ‌نامهٔ تشریحی


دترمینان ماتریس ۳×۳

دترمینان ماتریس‌های ۳×۳ را با دو روش کلی می‌توانیم حساب کنیم: ۱) ساروس ۲) بسط دترمینان برحسب یک سطر یا ستون که هر کدام از این‌ها را مفصل بحث می‌کنیم:

۱) ساروس: فرض کنید دترمینان ماتریس A را می‌خواهیم به دست آوریم $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$. در ابتدا ستون‌های اول و دوم ماتریس را در سمت راست

ماتریس می‌نویسیم، سپس مجموع حاصل ضرب درایه‌های روی قطر اصلی و دو خط موازی آن را منهای مجموع حاصل ضرب درایه‌های روی قطر فرعی و دو خط موازی آن می‌کنیم:

$$|A| \Rightarrow \begin{vmatrix} a & b & c & a & b \\ d & e & f & d & e \\ g & h & i & g & h \end{vmatrix} \Rightarrow |A| = (aei + bfg + cdh) - (ceg + afh + bdi)$$



دترمینان ماتریس $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 5 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ با روش ساروس به صورت زیر، به دست می‌آید:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & 0 & -1 \\ 5 & 1 & 2 & 5 & 1 \end{vmatrix} \Rightarrow |A| = (-2 + 4 + 0) - (-15 + 4 + 0) = 38 - (-11) = 49$$

۱) تست: برای محاسبه دترمینان ماتریس $A = \begin{bmatrix} x & 2 & 3 \\ -1 & y & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ با روش ساروس از مدل زیر، استفاده شده است. مقدار دترمینان A کدام است؟

$\begin{vmatrix} x & 2 & 3 & x & 2 \\ -1 & y & 0 & -1 & y \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \end{vmatrix}$	-17 (۲)	-16 (۱)
	-19 (۴)	-18 (۳)

۲) پاسخ: در روش ساروس باید ۲ ستون اول را در سمت راست ماتریس بنویسیم، پس $y = 5$ و $x = 1$ داده است. حالا روش ساروس را می‌نویسیم:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & 5 & 0 & -1 & 5 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} \Rightarrow |A| = (10 - 3) - (30 - 4) = -19$$

۲) روش بسط دترمینان:

دترمینان ۳×۳ را می‌توانیم برحسب یک سطر یا یک ستون دلخواه بنویسیم. مثلاً در ماتریس زیر دترمینان را برحسب سطر اول می‌نویسیم:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \Rightarrow |A| = (-1)^{1+1} a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

و دقت کنید که دترمینان ۲×۲ ای که در a_{11} ضرب شد در واقع باقی‌مانده ماتریسی بود که از حذف سطر و ستون اول باقی مانده بود و همین‌طور می‌توانیم برحسب سطر دوم، ستون سوم و ... بنویسیم.

دترمینان ماتریس روبه‌رو را با روش بسط برحسب سطر اول به صورت زیر، حساب می‌کنیم:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow |A| = 1 \times \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 0 \times \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = (3 - 4) - 2(-1 - 8) + 0 = 17$$

حالا همین دترمینان را یک بار دیگر با بسط برحسب ستون دوم حساب می‌کنیم:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow |A| = -2 \times \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 3 \times \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = -2 \times (-9) + 3(1) - (4) = 17$$

حواستون باشه که در روش بسط، علامت روی قطر اصلی، مثبت و بقیه یکی درمیان مثبت و منفی هستند. مثلاً در روش بسط با ستون سوم، عدد ۰ مثبت، عدد ۴ منفی و عدد ۱ که روی قطر اصلی است، مثبت است و برای یک ماتریس ۳×۳ داریم:

$$\begin{bmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{bmatrix}$$

تست ۱ حاصل $\begin{vmatrix} 3 & -4 & 1 \\ 3 & -4 & 7 \\ 5 & 6 & -3 \end{vmatrix}$ کدام است؟

(۱) -۲۲۴ (۲) -۲۲۶ (۳) -۲۲۸ (۴) -۲۳۰

پاسخ ۲ دترمینان را بر حسب سطر اول می‌نویسیم:

$$\begin{vmatrix} 3 & -4 & 1 \\ 3 & -4 & 7 \\ 5 & 6 & -3 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} -4 & 7 \\ 6 & -3 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 5 & -3 \end{vmatrix} + 1 \times \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = 3(-30) + 4(-44) + (38) = -228$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & a & 0 \\ a & 2 & a \\ 3 & 2a & 1 \end{bmatrix}$$

تست ۲ اگر دترمینان ماتریس روبه‌رو -۴ باشد، مقدار مثبت a کدام است؟

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

پاسخ ۲ دترمینان را بر حسب سطر اول می‌نویسیم:

$$|A| = 2 \times \begin{vmatrix} a & a \\ 2a & 1 \end{vmatrix} - a \times \begin{vmatrix} a & a \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + 0 = 2(2 - 2a^2) - a(a - 3a) = 4 - 4a^2 + 2a^2 = 4 - 2a^2 = -4 \Rightarrow 2a^2 = 8 \Rightarrow a^2 = 4 \Rightarrow a = \pm 2$$

و چون مقدار مثبت a را می‌خواهیم $a = 2$ قابل قبول است.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 4 & x+5 \\ x-1 & 6 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

تست ۳ مجموع جواب‌های معادله روبه‌رو کدام است؟

(۱) ۳ (۲) ۴ (۳) ۵ (۴) ۶

پاسخ ۳ دترمینان را بر حسب سطر اول می‌نویسیم:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 4 & x+5 \\ x-1 & 6 & -1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow 1 \times \begin{vmatrix} 4 & x+5 \\ 6 & -1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -2 & x+5 \\ x-1 & -1 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ x-1 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (-4 - 6x - 30) - 2(2 - x^2 - 4x + 5) + 3(-12 - 4x + 4) = 0$$

$$-6x - 34 + 2x^2 + 8x - 14 - 24 - 12x = 0 \Rightarrow 2x^2 - 10x - 72 = 0$$

$$\xrightarrow{\div 2} x^2 - 5x - 36 = 0 \Rightarrow (x-9)(x+4) = 0 \Rightarrow x = 9, -4$$

حالا معادله را مرتب می‌کنیم:

و جمع جواب‌ها برابر ۵ است.

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ a & b & 1 \\ c & d & 1 \end{vmatrix} = 0$$

تست ۴ با حل معادله روبه‌رو، یک معادله خط بر حسب x و y به دست می‌آید. شیب آن کدام است؟

(۱) $\frac{d-b}{a-c}$ (۲) $\frac{a-b}{c-d}$ (۳) $\frac{a-c}{b-d}$ (۴) $\frac{b-d}{a-c}$

پاسخ ۴ دترمینان را بر حسب سطر اول می‌نویسیم:

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ a & b & 1 \\ c & d & 1 \end{vmatrix} = x \begin{vmatrix} b & 1 \\ d & 1 \end{vmatrix} - y \begin{vmatrix} a & 1 \\ c & 1 \end{vmatrix} + 1 \times \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow x(b-d) - y(a-c) + (ad-bc) = 0$$

حالا باید y را تنها کنیم و ضریب x ، شیب خط می‌شود:

$$\Rightarrow y(a-c) = x(b-d) + \Delta \Rightarrow y = \frac{b-d}{a-c}x + \bigcirc$$

(مهم نیست)

بسط دترمینان براساس یک سطر یا یک ستون خاص

معمولاً دترمینان‌های 3×3 را با ساروس و یا بر حسب سطر اول می‌نویسیم مگر در حالت‌های زیر:

۱ حالت اول: در برخی ماتریس‌ها در یک سطر یا ستون تعدادی صفر داریم که بهتر است براساس آن سطر یا ستون بنویسیم تا کارمان در محاسبات راحت‌تر باشد.

مثلاً در محاسبه دترمینان ماتریس روبه‌رو بهتر است بسط بر حسب ستون سوم بنویسیم، چون دو درایه آن صفر است:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & 5 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow |A| = 2 \times \begin{vmatrix} -1 & 5 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} + 0 = 2(-2 - 20) = -44$$

آ تست ۱ در معادله روبه‌رو مقدار x کدام است؟

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & x & -1 \\ 0 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 16$$

- ۱ (۱)
۲ (۲)
۳ (۳)
۴ (۴)

پاسخ ۱ با توجه به این که در ستون اول دو تا صفر داریم پس برای راحتی محاسبات بهتر است دترمینان را براساس ستون اول بنویسیم:

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & x & -1 \\ 0 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 2 \times \begin{vmatrix} x & -1 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} + 0 = 2(\Delta x + 3) = 16 \Rightarrow \Delta x + 3 = 8 \Rightarrow x = 1$$

۲ حالت دوم: به جز حالتی که در یک سطر یا یک ستون تعدادی صفر داشته باشیم، گاهی صورت سؤال طوری طراحی شده که ما مجبور می‌شویم برحسب سطر یا ستون خاص بسط ماتریس را بنویسیم.

$$\begin{vmatrix} 1 & 7 & 3 \\ -1 & 3 & 5 \\ 4 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} + x$$

مثلاً ۱ فرض کنید صورت تست رابطه روبه‌رو را داده و از ما x را می‌خواهد:

در این جا باید دترمینان را برحسب سطر سوم یا ستون اول بنویسیم تا ۴ در بسط باشد و بقیه بسط مقدار x را می‌دهد، که در این جا برحسب سطر سوم می‌نویسیم. (اگر برحسب ستون اول هم بنویسیم فرقی نمی‌کند.)

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 7 & 3 \\ -1 & 3 & 5 \\ 4 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} - 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & 7 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} \Rightarrow x = -1 \times (\Delta + 3) + 2(3 + 7) = 12$$

آ تست ۱ اگر $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 2 & -1 & 1 \\ x & 1 & 2 \end{vmatrix} = A + x \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$ باشد، مقدار A کدام است؟

- ۱ (۱)
۲ (۲)
۳ (۳)
۴ (۴)
۵ (۵)
۶ (۶)

پاسخ ۱ **راه ۱** بسط ماتریس را برحسب ستون اول می‌نویسیم:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 2 & -1 & 1 \\ x & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + x \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \Rightarrow A = 1 \times (-2 - 1) - 2(4 - 7) = 3$$

راه ۲ می‌توانیم به x صفر بدهیم تا از جریان محاسبات خارج شود و دترمینان ماتریس روبه‌رو را به دست آوریم:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = (-2 - 1) - 2(4 - 7) = 3$$

بسط حول ستون اول:

نکته اگر در ماتریس 3×3 به یک درایه عددی اضافه و یا کم کنیم و دترمینان تغییری نکند، دترمینان ۲ در ۲ با حذف سطر و ستون آن درایه باید صفر باشد.

مثلاً ۱ در ماتریس زیر اگر به x سه واحد اضافه کنیم و دترمینان تغییر نکند، با حذف سطر و ستون مربوط به x به دترمینان ۲ در ۲ زیر می‌رسیم که باید صفر باشد و مقدار y به دست می‌آید:

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & y \\ x & 5 & 3 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & y \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow 2y - 12 = 0 \Rightarrow y = 6$$

آ تست ۱ در دترمینان $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -3 & a & 1 \\ 4 & 2 & -2 \end{vmatrix}$ اگر به عنصر واقع بر سطر سوم و ستون سوم ۴ واحد اضافه شود و مقدار دترمینان تغییری نکند، آن گاه a کدام است؟

- ۱ (۱)
۲ (۲)
۳ (۳)
۴ (۴)

پاسخ ۲ سطر سوم و ستون سوم را حذف می‌کنیم و دترمینان باقی‌مانده باید صفر باشد:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -3 & a & 1 \\ 4 & 2 & -2 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -3 & a \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow 2a + 3 = 0 \Rightarrow a = -\frac{3}{2}$$

آ تست ۱ اگر درایه سطر دوم و ستون سوم ماتریس $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & a \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix}$ را دو برابر کنیم، از حاصل دترمینان آن ۳ واحد کم می‌شود. مقدار a کدام است؟

- ۱ (۱)
۲ (۲)
۳ (۳)
۴ (۴)

پاسخ ۱ ابتدا اطلاعات مسئله را به زبان ریاضی می‌نویسیم:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2a \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & a \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} - 3$$

حالا چون هم a در سطر دوم است و هم صفر داریم، دترمینان را بر حسب سطر دوم می‌نویسیم:

$$0 + 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} - 2a \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 0 + 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} - a \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - 3 \Rightarrow 6a = 2a - 3 \Rightarrow 4a = -3 \Rightarrow a = -\frac{3}{4}$$

قوانین دترمینان

دترمینان ویژگی‌هایی دارد که با کمک آن‌ها مسئله‌ها ساده‌تر حل می‌شوند و گاهی نیازی به روش ساروس یا بسط دترمینان نیست.

$ A^n = A ^n$	دترمینان ماتریس A^n برابر است با دترمینان ماتریس A به توان n .	۱
$ A \times B = A \times B $	اگر دترمینان ماتریس $A \times B$ را بخواهیم، لازم نیست که خود ماتریس $A \times B$ را حساب کنیم و کافی است دترمینان A را در دترمینان B ضرب کنیم.	۲
$\begin{vmatrix} a & \circ & \circ \\ \circ & b & \circ \\ \circ & \circ & c \end{vmatrix} = abc$	دترمینان ماتریس‌های قطری و بالا مثلثی و پایین مثلثی برابر حاصل ضرب درایه‌های روی قطر اصلی است.	۳
$\begin{vmatrix} a & \circ & \circ \\ d & b & \circ \\ e & f & c \end{vmatrix} = abc$		
$\begin{vmatrix} a & d & e \\ \circ & b & f \\ \circ & \circ & c \end{vmatrix} = abc$		
$\begin{vmatrix} \circ & \circ & a \\ \circ & b & \circ \\ c & \circ & \circ \end{vmatrix} = -abc$	دترمینان ماتریس شبه‌قطری و شبه بالا مثلثی و شبه پایین مثلثی مطابق جدول روبه‌رو برابر منفی حاصل ضرب درایه‌های روی قطر فرعی است.	۴
$\begin{vmatrix} \circ & \circ & a \\ \circ & b & d \\ c & e & f \end{vmatrix} = -abc$		
$\begin{vmatrix} e & d & a \\ f & b & \circ \\ c & \circ & \circ \end{vmatrix} = -abc$		
$ KA_{2 \times 2} = K^2 A $	اگر در تمام درایه‌های یک ماتریس 2×2 عدد K ضرب شود، دترمینان، K^2 برابر می‌شود.	۵
$ KA_{3 \times 3} = K^3 A $	اگر تمام درایه‌های یک ماتریس 3×3 در عدد K ضرب شود، دترمینان، K^3 برابر می‌شود.	۶
$K \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} Ka & Kb & Kc \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & Kb & c \\ d & Ke & f \\ g & Kh & i \end{vmatrix} = \dots$	اگر عدد K در یک دترمینان ضرب شود، تمام درایه‌های یک سطر یا یک ستون دلخواه را در K ضرب می‌کنیم:	۷
	و برعکس: می‌توان از یک سطر یا یک ستون دترمینان عامل مشترکی را فاکتور گرفت و به بیرون دترمینان انتقال داد.	
	اگر دو ماتریس برابر باشند، دترمینان آن‌ها با هم برابر است ولی عکس این قضیه برقرار نیست.	۸
$ AB = BA = A B $	دترمینان ماتریس‌های AB و BA با هم برابر است:	۹
$ A+B \neq A + B $	دترمینان جمع و تفریق دو ماتریس تفکیک‌پذیر نمی‌باشد:	۱۰

مثلاً ۱ اگر دترمینان ماتریس A را برابر ۳ داشته باشیم، برای محاسبه دترمینان ماتریس A^4 ، لازم نیست که ماتریس A را به توان ۴ برسانیم، فقط کافی است که دترمینان A را به توان ۴ برسانیم، یعنی داریم:

$$|A^4| = |A|^4 = 3^4 = 81$$

مثلاً ۲ اگر A ماتریس زیر باشد، دترمینان A برابر $(-1)(2)(-3)$ و برابر ۶ است و دترمینان ماتریس A^2 هم بدون حساب کردن خود ماتریس A^2 به راحتی برابر $|A|^2 = 6^2$ و برابر ۳۶ است.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

تست ۱ اگر $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 5 & 7 & -1 \end{bmatrix}$ باشد، دترمینان ماتریس $A^T - 2A^2$ کدام است؟

(۱) ۲۷ (۲) -۲۷ (۳) ۹ (۴) -۹

پاسخ ۱ می‌دانیم دترمینان ماتریس پایین مثلثی A برابر $3(-1)(-1) = 3$ است. حالا از عبارت $A^T - 2A^2$ یک A^T فاکتور می‌گیریم:

$$|A^T - 2A^2| = |A^T(A - 2I)| = |A^T| \times |A - 2I| = 9 \times |A - 2I| = 9|A - 2I|$$

حالا ماتریس $A - 2I$ را هم تشکیل می‌دهیم: (البته معلوم است که باز هم پایین مثلثی می‌شود).

$$A - 2I = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 5 & 7 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & 0 \\ 5 & 7 & -3 \end{bmatrix}$$

پس $|A - 2I|$ هم برابر $3(-1)(-3) = 3$ می‌شود و بنابراین دترمینان ماتریس $A^T - 2A^2$ برابر می‌شود با:

$$|A^T - 2A^2| = |A^T| \times |A - 2I| = 9 \times 3 = 27$$

تست ۲ اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & -a & -2 \\ 1 & a & 1 \end{bmatrix}$ و $|2A^T| = 64$ باشد، مقدار a کدام است؟

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

پاسخ ۲ ابتدا دترمینان A را با بسط بر حسب سطر اول حساب می‌کنیم:

$$|A| = 1 \times \begin{vmatrix} -a & -2 \\ a & 1 \end{vmatrix} + 0 = -a + 2a = a \Rightarrow |2A^T| = 2^3 \times |A|^3 = 8|A|^3 = 8a^3 = 64 \Rightarrow a^3 = 8 \Rightarrow a = 2$$

تست ۳ دترمینان ماتریس مرتبه ۲، A برابر -۲ است. دترمینان ماتریس $A \times A^T$ کدام است؟

(۱) -۴ (۲) -۸ (۳) -۱۶ (۴) -۳۲

پاسخ ۳ می‌دانیم اگر عدد k در ماتریس $A_{2 \times 2}$ ضرب شود، دترمینان، k^2 برابر می‌شود:

$$\Rightarrow \underbrace{|A \times A^T|}_{k^2} = \underbrace{|A|^2}_{k^2} \times |A^T| = |A|^2 \times |A|^2 = |A|^4 = (-2)^4 = 16$$

تست ۴ ماتریس A از مرتبه ۲ و می‌دانیم $|A| = 10$ و $|A| + \frac{3}{|A|}A = 10|A|$ است. $|A^2|$ کدام می‌تواند باشد؟

(۱) ۴ (۲) ۹ (۳) ۱۶ (۴) ۲۵

پاسخ ۴ طبق قوانین دترمینان، داریم:

$$|A| + \frac{3}{|A|}A = 10|A| \Rightarrow |A|^2 + 3 = 10|A| \Rightarrow |A|^2 - 10|A| + 3 = 0$$

حالا اگر طرفین را در $|A|$ ضرب کنیم و $|A|^2$ را x بگیریم، داریم:

$$\frac{\times |A|}{\times |A|} \rightarrow |A|^4 + 9 = 10|A|^2 \xrightarrow{|A|^2 = x} x^2 + 9 = 10x \Rightarrow x^2 - 10x + 9 = 0 \Rightarrow (x-1)(x-9) = 0 \Rightarrow x = 1, 9$$

بنابراین $|A^2|$ برابر ۱ یا ۹ است.

تست ۱ اگر $\begin{vmatrix} a & 2b & c \\ \Delta d & 10e & \Delta f \\ g & 2h & i \end{vmatrix} = 20$ باشد، حاصل $\begin{vmatrix} a & b & 4c \\ 3c & 3d & 12f \\ e & f & 4i \end{vmatrix}$ کدام است؟

۱۱ (۱) ۱۲ (۲) ۲۲ (۳) ۲۴ (۴)

پاسخ ۱ در ابتدا از سطر دوم عبارت $\begin{vmatrix} a & 2b & c \\ \Delta d & 10e & \Delta f \\ g & 2h & i \end{vmatrix}$ را فاکتور می‌گیریم و با 20 ساده می‌کنیم و سپس از ستون دوم هم از عدد 2 فاکتور می‌گیریم و ساده می‌کنیم:

$$\begin{vmatrix} a & 2b & c \\ \Delta d & 10e & \Delta f \\ g & 2h & i \end{vmatrix} = \Delta \begin{vmatrix} a & 2b & c \\ d & 5e & f \\ g & 2h & i \end{vmatrix} = 20 \xrightarrow{\div 5} \begin{vmatrix} a & 2b & c \\ d & 2e & f \\ g & 2h & i \end{vmatrix} = 4$$

$$\Rightarrow 2 \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 4 \xrightarrow{\div 2} \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 2$$

حالا این دترمینان را در 4×3 ضرب می‌کنیم و ضرب 3 را به سطر دوم و ضرب 4 را به ستون سوم می‌دهیم:

$$\xrightarrow{\times 12} 4 \times 3 \times \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 4 \times 3 \times 2 = 24 \Rightarrow 4 \begin{vmatrix} a & b & c \\ 3d & 3e & 3f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 24 \Rightarrow \begin{vmatrix} a & b & 4c \\ 3d & 3e & 12f \\ g & h & 4i \end{vmatrix} = 24$$

تست ۲ برای ماتریس A مربعی مرتبه 3 رابطه روبرو برقرار است. دترمینان ماتریس A^2 کدام است؟

۳۲ (۱) ۶۴ (۲) ۱۶ (۳) ۸ (۴)

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 7 & -4 & 0 \\ 5 & 6 & 1 \end{vmatrix} A \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ -1 & 6 & 5 \end{vmatrix} = 4I$$

پاسخ ۲ از دو طرف حاصل ضرب، دترمینان می‌گیریم و ماتریس سمت چپ، پایین‌مثلثی و برای ماتریس سمت راست هم دترمینان، منفی حاصل ضرب قطر فرعی است:

$$\Rightarrow (1 \times (-4) \times 1) \times |A| \times (-1 \times 6 \times 5) = 4|I| = 4^3 |I| = 64 \Rightarrow |A| = -8 \Rightarrow |A^2| = 64$$

دترمینان ماتریس وارون

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$$

با توجه به رابطه $A \times A^{-1} = I$ ، اگر از دو طرف، دترمینان بگیریم به رابطه بسیار مهم زیر می‌رسیم:

مثلاً اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ، با توجه به این که $\det(A) = 1 \times 4 - 2 \times 3 = -2$ است، پس بدون محاسبه A^{-1} می‌توانیم متوجه شویم که دترمینان A^{-1} برابر $\frac{1}{|A|}$ یا همان $-\frac{1}{2}$ است:

$$\Rightarrow |A^{-1}| = \frac{1}{|A|} = \frac{1}{-2}$$

تست ۳ اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ باشد، آن‌گاه دترمینان ماتریس $B^4 A^{-1} B^{-2} A^2$ کدام است؟

۳۶ (۴) ۱۸ (۳) ۹ (۲) ۴ (۱)

پاسخ ۳ در ابتدا دقت کنید که $|A| = 2$ و $|B| = -3$ است. حالا دترمینان ماتریس $B^4 A^{-1} B^{-2} A^2$ را به صورت ضرب دترمینان‌ها می‌نویسیم:

$$\Rightarrow |B^4 A^{-1} B^{-2} A^2| = |B|^4 \times |A^{-1}| \times |B|^{-2} \times |A|^2 = |B|^4 \times \frac{1}{|A|} \times \frac{1}{|B|^2} \times |A|^2 = |B|^2 \times |A| = (-3)^2 \times 2 = 18$$

تست ۴ اگر A ماتریسی وارون‌پذیر و $|A| = -3$ و $|I + A| = 15$ باشد، حاصل $|A^{-1} + I|$ کدام است؟

۱۵ (۳) ۵ (۱) -۵ (۲) -۱۵ (۴)

پاسخ ۴ در ابتدا دقت کنید که $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} = -\frac{1}{3}$ است. حالا دو طرف عبارت $|I + A| = 15$ را در $|A^{-1}|$ ضرب می‌کنیم:

$$\Rightarrow |A^{-1}| \times |I + A| = 15 |A^{-1}| \Rightarrow |A^{-1}(I + A)| = 15 \left(-\frac{1}{3}\right) = -5$$

$$\Rightarrow |A^{-1}I + \underbrace{A^{-1}A}_I| = -5 \Rightarrow |A^{-1} + I| = -5$$

روش عددگذاری در دترمینان

یک سری از تست‌های دترمینان از بقایای تست‌های مرسوم نظام قدیم هستند. در این جور مسائل با دترمینان‌هایی سروکار داریم که درایه‌های ماتریس را پارامترها تشکیل می‌دهند. در نظام قدیم بچه‌ها برای حل این تیپ سؤال‌ها یک سری قوانین در کتاب درسی داشتند که اتفاقاً دست و پا گیر بودند و استفاده از آن‌ها خیلی هم راحت نبود. ما در حل این تیپ سؤال‌ها که در ادامه می‌بینید از عددگذاری استفاده می‌کنیم یعنی به جای پارامترها عددهای ۰، ۱، -۱ و ۲ و کلاً اعداد کوچک را چک می‌کنیم که در بین این‌ها صفر از همه بهتر است. البته باید نیم نگاهی به گزینه‌ها هم داشته باشیم که با جای گذاری مثلاً ۰ یا ۱، گزینه‌ها یکسان نشوند. اگر چندتا متغیر هم داشتیم بهتر است تا حد ممکن همه آن‌ها را یکسان قرار دهیم.

مثلاً اگر $a + b + c = 1$ باشد و بخواهیم دترمینان روبه‌رو را حساب کنیم:

$$D = \begin{vmatrix} 2+a & b & c \\ a & 2+b & c \\ a & b & c+2 \end{vmatrix}$$

و گزینه‌ها هم همگی عدد باشند و ربطی به a ، b و c نداشته باشند، کافی است $a = 1$ و $b = c = 0$ قرار دهیم تا هم شرط مسئله ($a + b + c = 1$) برقرار باشد و هم محاسبه دترمینان به دلیل وجود صفرها راحت‌تر شود:

$$\xrightarrow[\substack{a=1 \\ b=c=0}]{} D = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{پایین مثلثی} \\ \text{حاصل ضرب روی} \\ \text{قطر اصلی}}} 3(2)(2) = 12$$

تست ۱ مقدار دترمینان $\begin{vmatrix} b+c & a+c & b+a \\ a & b & c \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix}$ کدام است؟

صفر (۱) $a + b + c$ (۲) $2(a + b + c)$ (۳) $3(a + b + c)$ (۴) $3(a + b + c)$

پاسخ ۱ در ابتدا به گزینه‌ها نگاه می‌کنیم. اگر هر سه‌تای a ، b و c را صفر بگذاریم، گزینه‌ها یکی می‌شوند، پس این عددگذاری مناسب نیست. حالا اگر $a = 1$ و $b = c = 0$ بگذاریم، گزینه‌ها با هم فرق می‌کنند، پس جای گذاری می‌کنیم:

$$D = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{بسط دترمینان} \\ \text{برحسب سطر دوم}}} -1 \times \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

حالا در گزینه‌ها با جای گذاری $a = 1$ و $b = c = 0$ ، تنها (۱) است که صفر می‌شود و جواب مسئله است.

تست ۲ حاصل دترمینان $\begin{vmatrix} a & b & c \\ 2a & 2b+1 & 2c+2 \\ 3a & 3b+2 & 3c+3 \end{vmatrix}$ کدام است؟

$3a$ (۱) $-a$ (۲) a (۳) abc (۴)

پاسخ ۲ باز هم گزینه‌ها را نگاه می‌کنیم و $a = 0$ انتخاب خوبی نیست (چون هر ۴ گزینه یکسان می‌شوند)، پس به جای a ، ۱ می‌گذاریم ولی برای راحتی کار b و c را صفر در نظر می‌گیریم:

$$\xrightarrow[\substack{a=1 \\ b=c=0}]{} D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{بسط دترمینان} \\ \text{برحسب سطر اول}}} 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 0 = 1 \times (3 - 4) = -1$$

حالا باید ببینیم کدام گزینه با جای گذاری $a = 1$ و $b = c = 0$ عدد -۱ را می‌دهد، که جواب $-a$ و (۲) است.

تست ۳ اگر دترمینان $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ a & b & 1 \\ 2 & 5 & 1 \end{vmatrix}$ باشد، آن‌گاه دترمینان $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 1 \\ a & b & -1 \end{vmatrix}$ کدام است؟

$-D - 2$ (۱) $-D - 1$ (۲) $-D$ (۳) $-D + 1$ (۴)

پاسخ ۱۱ | باز هم عددگذاری می‌کنیم، مثلاً $a = b = 0$ را در نظر می‌گیریم و D را حساب می‌کنیم:

$$\Rightarrow D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{برحسب سطر دوم}]{\text{بسط دترمینان}} -1 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} + 0 = -1 \times (5 - 4) = -1$$

و دترمینان دوم را هم با جای گذاری $a = b = 0$ حساب می‌کنیم:

$$\Rightarrow D' = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{برحسب سطر سوم}]{\text{بسط دترمینان}} -1 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = -1$$

حالا باید ببینیم که در کدام گزینه اگر به جای D مقدار -1 بگذاریم به جواب $D' = -1$ می‌رسیم، که جواب $-D - 2$ و **۱** است.

$$-D - 2 = -(-1) - 2 = -1$$

تست ۱۱ | اگر داشته باشیم $24 = \begin{vmatrix} a+b+3c & a & b \\ c & 3a+b+c & b \\ c & a & a+3b+c \end{vmatrix}$ ، مقدار $(a+b+c)$ کدام است؟

۴ (۴)
۳ (۳)
۲ (۲)
۱ (۱)

پاسخ ۱۲ | در این مسئله نمی‌توانیم هر سه مقدار a ، b و c را عدد بدهیم چون باید جواب دترمینان حتماً 24 شود. پس c و b را صفر قرار می‌دهیم و مقدار دترمینان را برحسب a به دست می‌آوریم و مساوی 24 قرار می‌دهیم تا a به دست آید و سپس حاصل $(a+b+c)$ مشخص شود:

$$\xrightarrow{b=c=0} \begin{vmatrix} a & a & 0 \\ 0 & 3a & 0 \\ 0 & a & a \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{برحسب ستون اول}]{\text{بسط دترمینان}} a \times \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ a & a \end{vmatrix} + 0 = a(3a^2) = 3a^3 \Rightarrow 3a^3 = 24 \Rightarrow a^3 = 8 \Rightarrow a = 2$$

و در نتیجه:

$$a + b + c = 2 + 0 + 0 = 2$$

(حواستون باشد در مسئله فرقی نمی‌کرد که c و b را صفر قرار دهیم و a را به دست آوریم و یا مثلاً c و a را صفر قرار دهیم و b را به دست آوریم، در هر حالت جواب $a + b + c = 2$ به دست می‌آید.)



دترمینان ماتریس 3×3

۲۱۴- مقدار $\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$ کدام است؟

- ۱-۱ (۱) ۲-۱ (۲) ۳-۲۰ (۳) ۴-۲۰ (۴)

۲۱۵- اگر $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -4 \\ 3 & 0 & -4 \\ 3 & -1 & -3 \end{bmatrix}$ ، مقدار دترمینان A کدام است؟

- ۱-۲ (۱) ۲-۱ (۲) ۳-۲ (۳) ۴-۱ (۴)

۲۱۶- دترمینان ماتریس $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 3 & 0 & 5 \\ -2 & 6 & 1 \end{bmatrix}$ کدام است؟

- ۱-۱۲ (۱) ۲-۱۵ (۲) ۳-۲۲ (۳) ۴-۲۵ (۴)

۲۱۷- اگر $A = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 5 & -11 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ باشد، دترمینان $A \times B$ کدام است؟

- ۱-۳ (۱) ۲-۲ (۲) ۳-۱ (۳) ۴-صفر (۴)

۲۱۸- ماتریس $A = [a_{ij}]_{3 \times 3}$ به صورت $A = \begin{cases} 2 & i < j \\ 0 & i = j \\ -1 & i > j \end{cases}$ مفروض است. $|A|$ کدام است؟

- ۱-۱ (۱) ۲-۱ (۲) ۳-۲ (۳) ۴-۲ (۴)

۲۱۹- اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & -a & -2 \\ 1 & a & 1 \end{bmatrix}$ و $|A| = 4$ باشد، مقدار a کدام است؟

- ۱-۱ (۱) ۲-۲ (۲) ۳-۳ (۳) ۴-۴ (۴)

۲۲۰- اگر $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 8 \end{bmatrix}$ ، حاصل $|A|^3 \times |B|^2$ کدام است؟

- ۱-۸ (۱) ۲-۸ (۲) ۳-۴ (۳) ۴-۴ (۴)

۲۲۱- اگر حاصل دترمینان مقابل a باشد، a کدام است؟

- ۱-۳ (۱) ۲-۲ (۲) ۳-۳ (۳) ۴-۲ (۴)

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & a \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -a \end{vmatrix}$$

(خارج ۹۸)

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 4 & a & 2 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix}$$

۲۲۲- به ازای کدام مقدار a ، حاصل دترمینان روبه‌رو برابر ۲ است؟

- ۲۶ (۲) ۲۵ (۱)
۲۸ (۴) ۲۷ (۳)

۲۲۳- حاصل دترمینان $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ x & y & 1 \end{vmatrix}$ کدام است؟

- ۳x + y - 2 (۴) ۳y + x - 2 (۳) ۳x - y - 2 (۲) ۳y - x - 2 (۱)

۲۲۴- مجموع دترمینان $\begin{vmatrix} 0 & x & 0 \\ y & 0 & z \\ 0 & t & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & 0 & x \\ 0 & y & 0 \\ z & 0 & t \end{vmatrix}$ برابر است با:

- ۲xyzt (۴) صفر (۳) xy(t-z) (۲) xy(z-t) (۱)

۲۲۵- اگر $\begin{vmatrix} x & y & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 2$ باشد، کدام رابطه بین x و y برقرار است؟

- y = 2x + 2 (۴) y = -2x - 2 (۳) y = -2x + 2 (۲) y = 2x - 2 (۱)

۲۲۶- اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & 12 & 1 \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 9 & 2 \\ 4 & 1 & 7 & 0 \end{bmatrix}$ و $C = \begin{bmatrix} A \\ \dots \\ B \end{bmatrix}$ باشد، دترمینان حاصل از حذف سطر چهارم و ستون سوم ماتریس C کدام است؟

- ۱۲ (۴) ۱۱ (۳) ۱۰ (۲) ۹ (۱)

۲۲۷- اگر ماتریس $A = \begin{bmatrix} 1 & a \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$ وارون‌پذیر نباشد، دترمینان ماتریس $B = \begin{bmatrix} A & 3 \\ \dots & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ کدام است؟

- ۱۲ (۴) ۱۰ (۳) ۸ (۲) ۶ (۱)

۲۲۸- اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ ، $B = 3A - 2I$ و $C = \begin{bmatrix} B & A \\ A & B \end{bmatrix}$ ، دترمینان حاصل از حذف سطر دوم و ستون سوم ماتریس C کدام است؟

- ۱ (۴) صفر (۳) ۱ (۲) ۲ (۱)

۲۲۹- اگر $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} A^T + I & 1 \\ \dots & 2 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$ باشد، حاصل دترمینان B کدام است؟

- ۳۹ (۴) -۳۷ (۳) -۳۵ (۲) -۳۳ (۱)

۲۳۰- اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ باشد، دترمینان ماتریس $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \dots & -1 & 0 \\ 2A & 0 & 0 \end{bmatrix}$ کدام است؟

- ۴ (۴) -۳ (۳) -۲ (۲) -۱ (۱)

۲۳۱- به ازای کدام مقدار k ، معادله دترمینان $\begin{vmatrix} x & 0 & k \\ 1 & x+1 & 0 \\ 2 & 0 & x+2 \end{vmatrix} = 0$ فقط یک ریشه دارد؟

- k = 2 (۴) k = 0 (۳) k = -1 (۲) k = 1 (۱)

۲۳۲- معادله $\begin{vmatrix} 1 & 2x & -1 \\ 1 & -2x & 1 \\ 1 & -4x & 2 \end{vmatrix} = 0$ چند ریشه دارد؟

- صفر (۴) ۱ (۳) بی‌شمار (۲) ۳ (۱)

(سراسری ۹۹)

۲۳۳- جواب‌های معادله $\begin{vmatrix} -4 & 1 & 1 \\ 1 & 2-x & 1 \\ 3 & 2 & 3-x \end{vmatrix} = 0$ کدام است؟

- ۲ و ۵ (۴) ۱ و ۵ (۳) ۱ و ۴ (۲) ۱ و -۴ (۱)

(خارج ۹۹)

۲۳۴- جواب‌های معادله $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 4 & x+5 \\ x-1 & 6 & -1 \end{vmatrix} = 0$ کدام است؟

- ۳ و ۸ (۴) -۴ و ۹ (۳) ۳ و -۸ (۲) ۴ و -۹ (۱)

۲۳۵- معادله دترمینانی $\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & x^2 & x^2 \\ 1 & x^2 & x \end{vmatrix} = 0$ چند ریشه دارد؟

- (۱) ۳ (۲) صفر (۳) ۱ (۴) بی‌شمار

۲۳۶- اگر $A = \begin{bmatrix} x & 2 \\ -x & 3 \\ 2x-1 & -5 \end{bmatrix}$ باشد، آن‌گاه به ازای چند مقدار حقیقی x داریم: $|A| = 5$

- (۱) هیچ مقدار (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) بی‌شمار

۲۳۷- اگر $A = [i^2 + 2j]_{3 \times 2}$ و $B = \begin{bmatrix} m & 0 & -1 \\ 3 & -2 & 4 \end{bmatrix}$ باشد، به ازای کدام مقدار m رابطه $|AB| = 2$ برقرار است؟

- (۱) هیچ مقدار (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

بسط دترمینان براساس سطر یا ستونی خاص

۲۳۸- حاصل دترمینان $D = \begin{vmatrix} a & a & a \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & a \end{vmatrix}$ کدام است؟

- (۱) صفر (۲) a^2 (۳) a (۴) $5a^2$

۲۳۹- اگر $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 2 & -2 & 4 \\ x & 1 & 2 \end{vmatrix} = A + x \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ -2 & 4 \end{vmatrix}$ باشد، مقدار A کدام است؟

- (۱) -۳ (۲) -۴ (۳) -۵ (۴) -۶

۲۴۰- اگر $\begin{vmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \\ 2 & x & 5 \end{vmatrix} = A - x \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 0 & 3 \end{vmatrix}$ ، مقدار A کدام است؟

- (۱) -۲۰ (۲) -۱۵ (۳) -۱۰ (۴) -۵

۲۴۱- اگر $\begin{vmatrix} a & b \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 4$ باشد، دترمینان $\begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ a & 4 & b \\ 2 & 15 & 1 \end{vmatrix}$ کدام است؟

- (۱) ۲ (۲) -۲ (۳) ۴ (۴) -۴

۲۴۲- اگر $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ و $|A| = -2$ باشد، دترمینان $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ A & -1 & 4 \end{bmatrix}$ کدام است؟

- (۱) -۲ (۲) ۳ (۳) -۶ (۴) ۱۲

۲۴۳- در ماتریس $A = \begin{bmatrix} 4 & -3 & 12 \\ a & 2b & 5 \\ 6 & c^2 & 2 \end{bmatrix}$ ، اگر با اضافه کردن a واحد به عدد ۳- دترمینان تغییر نکند، مقدار a کدام است؟

- (۱) ۵ (۲) ۱۰ (۳) ۱۵ (۴) ۲۰

۲۴۴- به کدام درایه از ماتریس مقابل می‌توان ۴ واحد اضافه کرد بدون آن‌که دترمینان تغییر کند؟

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \\ 2 & -1 & 6 \end{bmatrix}$$

- (۱) a_{11} (۲) a_{22} (۳) a_{23} (۴) a_{32}

۲۴۵- اگر از هر درایه واقع در سطر دوم دترمینان زیر، ۲ برابر شمارهٔ ستون آن کم شود، به مقدار دترمینان اولیه، چه قدر افزوده می‌شود؟ (سراسری ۹۷)

- (۱) ۱۳۲ (۲) ۱۴۴ (۳) ۱۴۸ (۴) ۱۵۶

۲۴۶- اگر به تمام درایه‌های ستون دوم ماتریس $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & 0 & 7 \\ 3 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ یک واحد اضافه شود، به مقدار دترمینان اولیه کدام عدد اضافه می‌شود؟

- (۱) -۳ (۲) -۲ (۳) ۳ (۴) ۶ (سراسری ۹۶)

۲۴۷- در دترمینان $\begin{vmatrix} 2 & 4 & 3 \\ -3 & a & 1 \\ 4 & 4 & -2 \end{vmatrix}$ اگر به عنصر واقع در سطر سوم و ستون سوم ۵ واحد اضافه شود و مقدار دترمینان تغییر نکند، a کدام است؟

(۱) -۶ (۲) -۵ (۳) -۴ (۴) -۳

۲۴۸- اگر با اضافه کردن ۴ واحد به درایه‌های ماتریس $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & a \end{bmatrix}$ دترمینان آن تغییری نکند، آن‌گاه دترمینان ماتریس زیر کدام است؟

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -11 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & a \end{bmatrix}$$

(۱) -۶ (۲) -۷ (۳) -۸ (۴) -۹

۲۴۹- چه قدر به درایه سطر دوم و ستوم سوم ماتریس $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ -3 & -5 & 2 \\ 2 & 5 & 13 \end{bmatrix}$ اضافه کنیم تا مقدار دترمینان آن ۱۰ واحد کاهش یابد؟

(۱) -۵ (۲) ۵ (۳) -۱۰ (۴) ۱۰

۲۵۰- در دترمینان $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 \\ -2 & 0 & 1 \\ 7 & 4 & a \end{vmatrix}$ اگر به جای عدد ۲- مقدار ۱۵ را بگذاریم، دترمینان تغییری نمی‌کند. مقدار a کدام است؟

(۱) ۲۰ (۲) ۱۰ (۳) ۵ (۴) ۱

دترمینان ماتریس‌های خاص را می‌توان به کمک جدولی در درس‌نامه به راحتی محاسبه کرد.

۲۵۱- اگر دترمینان ماتریس $A = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 3 & a+1 & 0 \\ -1 & 0 & a-1 \end{bmatrix}$ برابر $a^3 + a + 2$ باشد، مقدار a کدام است؟

(۱) -۱ (۲) -۲ (۳) -۳ (۴) -۴

۲۵۲- اگر $k_1 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & a \\ 0 & b & 0 \\ c & 0 & 0 \end{vmatrix}$ و $k_2 = \begin{vmatrix} a+1 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{vmatrix}$ کدام رابطه درست است؟

(۱) $k_2 - k_1 = bc$ (۲) $k_1 - k_2 = bc$ (۳) $k_1 + k_2 = bc$ (۴) $k_1 + k_2 = -bc$

۲۵۳- اگر $A = [a_{ij}]_{3 \times 3}$ و $a_{ij} = \begin{cases} 2|A|^2 & i < j \\ |A| & i = j \\ 0 & i > j \end{cases}$ در این صورت مقدار مثبت $|A|$ کدام است؟

(۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

۲۵۴- اگر A ماتریس مربعی باشد که در رابطه $A \begin{bmatrix} 0 & 0 & 5 \\ -1 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 7 \end{bmatrix} = 10I_3$ صدق کند، دترمینان ماتریس A کدام است؟

(۱) ۱۰۰۰ (۲) ۱۰۰ (۳) ۱۰ (۴) ۱

۲۵۵- اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & m \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ ، $B = \begin{bmatrix} |A| & 0 & 0 \\ |A| & 2|A| & 0 \\ 0 & 0 & |A| \end{bmatrix}$ و $|B| = 54$ باشد، مقدار m کدام است؟

(۱) -۱ (۲) -۲ (۳) -۳ (۴) -۴

۲۵۶- اگر دترمینان ماتریس اسکالر $A_{3 \times 3}$ برابر ۲۷ باشد، مجموع درایه‌های ستون اول ماتریس $2A$ کدام است؟

(۱) ۳ (۲) ۶ (۳) ۹ (۴) ۱۲

۲۵۷- اگر A یک ماتریس اسکالر مرتبه ۳ داشته باشیم $|A + 2I| = 1$ دترمینان ماتریس $A^2 + I$ کدام است؟

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۴ (۴) ۸

۲۵۸- اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ و $B = [b_{ij}]_{2 \times 2}$ و $b_{ij} = -a_{ji}$ باشد، دترمینان ماتریس $B + 2I$ کدام است؟

(۱) -۴ (۲) -۳ (۳) -۲ (۴) -۱

قوانین دترمینان

۲۵۹- اگر A ماتریس 3×3 و $|A| = 4$ باشد، آن‌گاه دترمینان ماتریس $|A|A$ کدام است؟

(۱) ۶۴ (۲) ۹۶ (۳) ۱۲۸ (۴) ۲۵۶

۲۶۰- اگر $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ باشد، حاصل $||-3A||2A^2||$ کدام است؟

- (۱) ۷۲ (۲) ۱۴۴ (۳) -۳۶ (۴) -۱۸

۲۶۱- اگر $A = \begin{bmatrix} -3 & 5 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ باشد، مقدار دترمینان ماتریس $A^2 | A^3 | A^2$ کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) ۳ (۳) -۱ (۴) -۳

۲۶۲- اگر $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -7 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ باشد حاصل $|A^2|$ کدام است؟

- (۱) -۱ (۲) ۸ (۳) ۱ (۴) -۸

۲۶۳- اگر $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & x^2 \end{bmatrix}$ باشد، دترمینان ماتریس A^2 کدام است؟

- (۱) ۱۶ (۲) ۸ (۳) ۴ (۴) ۲

۲۶۴- اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a^2 & -a & -2 \\ 3 & a & 1 \end{bmatrix}$ و $|A^4| = 25$ باشد، مقدار a کدام است؟

- (۱) $\sqrt{5}$ (۲) $-\sqrt{5}$ و $\sqrt{5}$ (۳) $-\sqrt{5}$ (۴) صفر

۲۶۵- اگر $\begin{vmatrix} x & y & z \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 3$ باشد، حاصل $\begin{vmatrix} 2x & 2y & 2z \\ 2 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix}$ کدام است؟

- (۱) ۱۲ (۲) ۶ (۳) ۳ (۴) -۳

۲۶۶- اگر $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = -2$ باشد، حاصل $\begin{vmatrix} a_1 & 3b_1 & c_1 \\ -2a_2 & 6b_2 & -2c_2 \\ a_3 & -3b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ کدام است؟

- (۱) -۱۲ (۲) -۶ (۳) ۶ (۴) ۱۲

۲۶۷- دو سطر یک ماتریس 4×4 را در عدد ۲ و سه ستون آن را در ۳- ضرب کرده‌ایم. دترمینان حاصل چند برابر شده است؟

- (۱) -۶ (۲) -۳۶ (۳) -۵۴ (۴) -۱۰۸

۲۶۸- دترمینان ماتریس $A_{3 \times 3}$ برابر ۳ است. اگر همهٔ درایه‌های ماتریس به غیر از a_{11} و a_{22} و a_{33} را در ۲ ضرب کنیم، دترمینان ماتریس جدید کدام است؟

- (۱) ۱۲ (۲) ۲۴ (۳) ۳۲ (۴) ۳۶

۲۶۹- برای ماتریس مربعی A از مرتبهٔ ۳ رابطهٔ روبه‌رو برقرار است. مقدار $|A|$ کدام است؟

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ -3 & 0 & 5 \end{bmatrix} = 2I$$

- (۱) $-\frac{1}{3}$ (۲) $\frac{1}{3}$

- (۳) $-\frac{2}{3}$ (۴) $\frac{2}{3}$

۲۷۰- اگر $A^2 = \begin{bmatrix} 27 & 0 \\ |A| & -1 \end{bmatrix}$ باشد، دترمینان ماتریس $\frac{|A|A^2}{3}$ کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) ۳ (۳) ۹ (۴) ۲۷

۲۷۱- اگر A یک ماتریس مربعی مرتبهٔ ۲ و $4 = |A| + \left| \frac{2}{|A|} A^{-1} \right|$ باشد، آن‌گاه $|(A^2)^{-1}|$ کدام است؟

- (۱) ۴ (۲) ۲ (۳) ۱ (۴) $\frac{1}{2}$

۲۷۲- اگر $A = [a_{ij}]_{3 \times 3}$ و $a_{ij} = \begin{cases} -1 & i < j \\ 0 & i = j \\ 2 & i > j \end{cases}$ باشد، حاصل $|2|A|A^2|$ کدام است؟

- (۱) -۲۵۶ (۲) -۱۲۸ (۳) ۱۲۸ (۴) ۲۵۶

۲۷۳- ماتریس‌های A و B مربعی از مرتبهٔ 3×3 هستند. اگر $|A| = 3$ و $|A|B| = -54$ باشد، حاصل $||B|^T A|$ کدام است؟

- (۱) ۱۲۸ (۲) ۱۹۲ (۳) -۱۲۸ (۴) -۱۹۲

۲۷۴- ماتریس A مربعی از مرتبهٔ ۴ است. اگر دترمینان آن برابر ۲ باشد، دترمینان ماتریس $|A^2| |A|$ کدام است؟

- (۱) 2^{38} (۲) 2^{39} (۳) 2^{40} (۴) 2^{41}

- ۲۷۵- اگر $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ و $CA = 3B - C$ باشد، دترمینان ماتریس C کدام است؟
- ۱) ۲ ۲) ۱ ۳) -۱ ۴) -۲
- ۲۷۶- اگر $A_{3 \times 3}$ داشته باشیم $A^T + A + I = \bar{O}$ ، حاصل $|A^T|$ کدام است؟
- ۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴
- ۲۷۷- اگر A ماتریس 3×3 و $A^T = 2I + 4A$ باشد، دترمینان ماتریس $(2I - A)^T$ کدام است؟
- ۱) -۲۱۶ ۲) ۲۱۶ ۳) -۳۶ ۴) ۳۶
- ۲۷۸- اگر A یک ماتریس 2×2 داشته باشیم $(A - I)^T = A + 2I$ باشد، دترمینان ماتریس $A^T - 3A$ کدام است؟
- ۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۴ ۴) ۸
- ۲۷۹- اگر A مرتبه ۳ و $A^3 = -I$ باشد، آن گاه حاصل $\frac{|A+I|}{|A^2-I|}$ کدام است؟
- ۱) -۱ ۲) ۱ ۳) ۳ ۴) -۳
- ۲۸۰- اگر A ماتریس 3×3 و $|A^3| = 24$ و $||A|A^T| - \frac{2}{|A|}A^3| = 24$ باشد، حاصل $|3A - |A|A|$ کدام است؟
- ۱) -۴ ۲) -۲ ۳) ۲ ۴) ۴
- ۲۸۱- اگر $A^3 = \begin{bmatrix} -2 & x^2+1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$ باشد، حاصل $||A|A + A|$ کدام است؟
- ۱) -۱ ۲) -۲ ۳) -۴ ۴) -۸
- ۲۸۲- اگر $3A = \begin{bmatrix} 4 & |A| \\ -|A| & 2 \end{bmatrix}$ باشد، بیشترین مقدار $|\frac{1}{4}A|$ کدام است؟
- ۱) ۱ ۲) $\frac{1}{2}$ ۳) $\frac{1}{3}$ ۴) $\frac{1}{4}$
- ۲۸۳- اگر $2A^2 = \begin{bmatrix} |2A| & |A| \\ |A^{-1}| & 1 \end{bmatrix}$ ، در این صورت حاصل $|2A| + 1$ کدام است؟
- ۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴
- ۲۸۴- اگر $A = \begin{bmatrix} |A| & 0 & 3|A| \\ 0 & |A| & 0 \\ -|A| & 0 & -2|A| \end{bmatrix}$ و A وارون پذیر باشد، مقدار دترمینان $|A|^2 \times A^4$ کدام است؟
- ۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴
- ۲۸۵- اگر $A_{2 \times 2}$ و $A^T = \bar{O}$ و $|A+I| = 3$ باشد، دترمینان ماتریس $A - I$ کدام است؟
- ۱) $\frac{1}{3}$ ۲) ۳ ۳) $-\frac{1}{3}$ ۴) -۳
- ۲۸۶- اگر A ماتریس 3×3 و $A^T = \bar{O}$ و $|A - 2I| = 32$ باشد، دترمینان ماتریس $(A + 2I)$ کدام است؟
- ۱) -۱ ۲) -۲ ۳) -۴ ۴) -۸
- ۲۸۷- اگر A ماتریس مربعی مرتبه ۳ و $A^3 = 3I$ و $|A^T + A + I| = 4$ باشد، دترمینان ماتریس $(A - I)$ کدام است؟
- ۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۴ ۴) ۸

دترمینان ماتریس وارون

- ۲۸۸- اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ باشد، دترمینان A^{-1} کدام است؟
- ۱) ۱ ۲) $\frac{1}{2}$ ۳) $\frac{1}{3}$ ۴) $\frac{1}{4}$
- ۲۸۹- اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ باشد، دترمینان $(A^3)^{-1}$ کدام است؟
- ۱) $\frac{1}{5}$ ۲) $\frac{1}{25}$ ۳) $\frac{1}{125}$ ۴) $\frac{1}{625}$
- ۲۹۰- اگر $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ باشد، حاصل $||A^{-1}|A|$ کدام است؟
- ۱) -۱ ۲) -۲ ۳) -۴ ۴) -۸

۲۹۱- اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ، دترمینان ماتریس $(2A^{-1})(\Delta A)$ چند برابر دترمینان A^{-1} است؟

- ۱۰ (۱) ۱۰^۲ (۲) ۱۰^۳ (۳) ۱۰^۴ (۴)

۲۹۲- اگر A ماتریس 2×2 و وارون پذیر و $A^3 = A \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \times A^3$ باشد، دترمینان ماتریس $(A^2)^{-1}$ کدام است؟

- $\frac{1}{4}$ (۱) $\frac{1}{16}$ (۲) $\frac{1}{9}$ (۳) $\frac{1}{27}$ (۴)

۲۹۳- اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ باشد، آن گاه حاصل دترمینان ماتریس $A^T B^{-1} B^T A^{-1}$ کدام است؟

- ۱۸ (۱) ۱۲ (۲) ۹ (۳) ۶ (۴)

۲۹۴- اگر A ماتریس مربعی 2×2 و وارون پذیر و k یک عدد حقیقی و داشته باشیم $\det((kA)^{-1}) = \frac{\Delta}{k^2 \det(A)}$ ، مقدار k کدام است؟ ($k \neq 0$)

- ۱ (۱) ۲ (۲) ۴ (۳) ۸ (۴)

۲۹۵- اگر A یک ماتریس مربعی 2×2 و معکوس پذیر و داشته باشیم $A^2 = 4A + 2I$ ، دترمینان A^{-1} کدام است؟

- $-\frac{1}{4}$ (۱) $-\frac{1}{2}$ (۲) -2 (۳) -4 (۴)

۲۹۶- اگر ماتریس های مربعی 2×2 و وارون پذیر A و B در رابطه $(A^{-1}BA)^5 = \begin{bmatrix} -64 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ ، آن گاه دترمینان ماتریس B کدام است؟

- -1 (۱) -2 (۲) -4 (۳) -16 (۴)

۲۹۷- اگر $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$ و $P = 2 \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -5 \end{bmatrix}$ باشد، دترمینان ماتریس $(P^{-1}AP)^6$ کدام است؟

- ۱ (۱) ۲ (۲) ۴ (۳) ۶ (۴)

۲۹۸- اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$ و B ماتریس مربعی مرتبه ۲ باشد و داشته باشیم $(A^{-1}BA)^T = A + 2I$ ، دترمینان ماتریس $(B^T)^{-1}$ کدام است؟

- ۳ (۱) ۱ (۲) $\frac{1}{3}$ (۳) $\frac{1}{9}$ (۴)

۲۹۹- اگر ماتریس $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ باشد، دترمینان ماتریس $-\frac{1}{3}A^4 A^{-1}$ کدام است؟

- ۴ (۱) ۹ (۲) -8 (۳) -27 (۴)

۳۰۰- اگر $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ باشد، حاصل عبارت $|A| \times |2A^{-1} + 2B^{-1}| \times |B|$ کدام است؟

- ۶ (۱) ۷ (۲) ۸ (۳) ۹ (۴)

۳۰۱- اگر دترمینان ماتریس مربعی $A + B$ برابر ۵ باشد، دترمینان ماتریس $A(A^{-1} + B^{-1})B$ کدام است؟

- $\frac{1}{5}$ (۱) ۱ (۲) ۵ (۳) ۲۵ (۴)

۳۰۲- اگر A ماتریس مربعی و وارون پذیر مرتبه ۲ باشد و $A^T = \bar{O}$ و $|A + I| = 4$ باشد، $|A - I|$ کدام است؟

- ۱ (۱) $0/75$ (۲) $0/5$ (۳) $0/25$ (۴)

۳۰۳- اگر A ماتریس مربعی و وارون پذیر باشد، حاصل $|I + 2A^{-1}|$ با کدام گزینه برابر است؟

- (۱) $\frac{|2I - A|}{|A|}$ (۲) $\frac{|2I + A|}{|A|}$ (۳) $\frac{|A|}{|2I - A|}$ (۴) $\frac{|A|}{|2I + A|}$

۳۰۴- اگر A و B ماتریس مربعی و وارون پذیر و $|I + ABA^{-1}| = 4$ باشد، دترمینان ماتریس $(B + I)^T$ کدام است؟

- $\frac{1}{4}$ (۱) ۲ (۲) ۴ (۳) ۱۶ (۴)

۳۰۵- اگر A و B دو ماتریس 3×3 و $|2A + 2B| = 3$ و $|A^{-1}| = \frac{1}{3}$ باشد، دترمینان $2A^{-1}B + 2I$ کدام است؟

- ۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

۳۰۶- اگر A وارون پذیر و $A(A - I) = \bar{O}$ باشد، دترمینان ماتریس $(2A^T + 3A)^{-1}$ کدام است؟

- $\frac{1}{25}$ (۱) $\frac{1}{5}$ (۲) ۵ (۳) ۲۵ (۴)

۳۰۷- اگر A و B دو ماتریس مربعی و $|A + B| = 10$ و $|B| = 2$ باشد، دترمینان $I + AB^{-1}$ کدام است؟

- ۲۰ (۱) ۱۰ (۲) ۵ (۳) ۲ (۴)

(خارج ۹۱)

روش عددگذاری در دترمینان

(خارج ۸۸)

۳۰۸- حاصل $D = \begin{vmatrix} a & a+1 & a+2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$ کدام است؟

(۱) a (۲) fa (۳) صفر (۴) ۱

(سراسری ۹۳)

۳۰۹- اگر دترمینان $D = \begin{vmatrix} 6 & 3x & 2x \\ 3x & 2x & 6 \\ 2x & 6 & 3x \end{vmatrix}$ باشد، حاصل دترمینان $D' = \begin{vmatrix} x^2 & x^2 & 6 \\ 9 & 2x & 9 \\ 3x & 4 & 4 \end{vmatrix}$ کدام است؟

(۱) $-2D$ (۲) $-D$ (۳) $\frac{1}{2}D$ (۴) D

۳۱۰- حاصل دترمینان $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-a & 1 \\ 1 & 1 & 1-a \end{vmatrix}$ کدام است؟

(۱) $-a^2$ (۲) a^2 (۳) $1-a$ (۴) $1+a$

(سراسری ۹۳)

۳۱۱- اگر $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ bc & ac & ab \\ ac & ab & bc \end{vmatrix}$ باشد، حاصل دترمینان $\begin{vmatrix} a+b & b & ab \\ b+c & c & bc \\ a+c & a & ac \end{vmatrix}$ کدام است؟

(۱) $-D$ (۲) D (۳) $(a+b+c)D$ (۴) $abcD$

(خارج ۸۹)

۳۱۲- اگر a, b, c سه عدد متمایز باشند، حاصل دترمینان $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4(a+b) \\ 1 & a+1 & a^2(b+2) \\ 1 & b+1 & b^2(a+2) \end{vmatrix}$ کدام است؟

(۱) صفر (۲) $4ab$ (۳) $(a-2)(b-2)(c-2)$ (۴) $2(a-2)(b-2)(c-2)$

(خارج ۸۶)

۳۱۳- اگر a, b, c سه عدد حقیقی متمایز باشند، حاصل دترمینان $\begin{vmatrix} 1 & a & bc-a^2 \\ 1 & b & ac-b^2 \\ 1 & c & ab-c^2 \end{vmatrix}$ کدام است؟

(۱) صفر (۲) abc (۳) $a+b+c$ (۴) $(a-b)(b-c)(c-a)$

(سراسری ۸۸)

۳۱۴- حاصل دترمینان $\begin{vmatrix} 1+x & x & y+z \\ 1 & y & x+z \\ 1 & z & x+y \end{vmatrix}$ با شرط $y = x+z$ کدام است؟

(۱) $2x(x+z)$ (۲) $x(x+z)$ (۳) $x^2(x+z)$ (۴) $2x^2(x+z)$

۳۱۵- مقدار دترمینان $\begin{vmatrix} b+c & a+c & b+a \\ a & b & c \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix}$ کدام است؟

(۱) $a+b+c$ (۲) صفر (۳) ۲ (۴) $2(a+b+c)$

۳۱۶- حاصل دترمینان $\begin{vmatrix} a & b & c \\ 2a & 2b+1 & 2c+2 \\ 3a & 3b+2 & 3c+3 \end{vmatrix}$ کدام است؟

(۱) $3a$ (۲) $2a$ (۳) $-2a$ (۴) $-a$

۳۱۷- اگر $k = \begin{vmatrix} a & b & 2 \\ 3 & 1 & a \\ 1 & b & 2 \end{vmatrix}$ باشد، حاصل $\begin{vmatrix} 2a-2 & 0 & 0 \\ 1 & b & 2 \\ 3 & 1 & a \end{vmatrix}$ کدام است؟

(۱) $2k$ (۲) $-2k$ (۳) $-k$ (۴) k

۳۱۸- اگر $k = \begin{vmatrix} a+b & 1 & 2 \\ a & b & 1 \\ 2a & 1 & -1 \end{vmatrix}$ باشد، حاصل $\begin{vmatrix} a+b & 1 & 2 \\ a-b & 0 & -3 \\ 2a & 2b & 2 \end{vmatrix}$ کدام است؟

(۱) $2k$ (۲) $-2k$ (۳) $\frac{k}{2}$ (۴) $-\frac{k}{2}$

$$\text{کدام است؟} \begin{vmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 2a & 1 & 5 \\ 3 & 4 & 1 \end{vmatrix} \text{ باشد، حاصل دترمینان} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ a & 1 & 5 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} = k \text{ اگر } k = 319 \text{ (**)}$$

$$2k + 15 \text{ (۴)} \quad 2k + 14 \text{ (۳)} \quad 2k + 1 \text{ (۲)} \quad 2k \text{ (۱)}$$

$$\text{کدام است؟} \begin{vmatrix} 6 & 4 & -2 \\ 2a+1 & 2b & 2c \\ 4 & 2 & 2 \end{vmatrix} \text{ باشد، حاصل} \begin{vmatrix} a & b & c \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} = k \text{ اگر } k = 320 \text{ (**)}$$

$$-8k - 12 \text{ (۴)} \quad -8k + 12 \text{ (۳)} \quad 8k - 12 \text{ (۲)} \quad 8k + 12 \text{ (۱)}$$

$$\text{کدام است؟} \begin{vmatrix} 6 & 4 & a+1 \\ 2 & 8 & 2 \\ 4 & -2 & 3 \end{vmatrix} \text{ باشد، حاصل دترمینان} \begin{vmatrix} 2 & 3 & a \\ 4 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = k \text{ اگر } k = 321 \text{ (**)}$$

$$4k + 36 \text{ (۴)} \quad 4k - 36 \text{ (۳)} \quad -4k - 36 \text{ (۲)} \quad -4k + 36 \text{ (۱)}$$

$$\text{کدام گزینه صحیح است؟} k_p = \begin{vmatrix} 3 & 3a & a \\ 4 & 4a & a \\ 5 & 2a & a \end{vmatrix} \text{ و } k_q = \begin{vmatrix} 2 & a & 3a \\ 2 & 2a & 4a \\ 2 & 0 & 5a \end{vmatrix} = k_1 \text{ اگر } k_1 = 322 \text{ (**)}$$

$$k_1 = k_p \text{ (۴)} \quad k_1 = -k_p \text{ (۳)} \quad k_1 = 2k_p \text{ (۲)} \quad k_1 = -2k_p \text{ (۱)}$$

$$\text{کدام است؟} \begin{vmatrix} a-2 & b+2 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & -3 \end{vmatrix} \text{ باشد، حاصل} \begin{vmatrix} a & b & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = k \text{ اگر } k = 323 \text{ (**)}$$

$$k + 3 \text{ (۴)} \quad -k - 3 \text{ (۳)} \quad -k - 5 \text{ (۲)} \quad k + 5 \text{ (۱)}$$

$$\text{کدام است؟} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 4 & 10 & 2 \\ a & b & -1 \end{vmatrix} \text{ ، } D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ a & b & 1 \\ 2 & 5 & 1 \end{vmatrix} \text{ آن‌گاه دترمینان} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 4 & 10 & 2 \\ a & b & -1 \end{vmatrix} = k \text{ اگر } k = 324 \text{ (**)}$$

$$2D + 1 \text{ (۴)} \quad 2D - 1 \text{ (۳)} \quad -2D + 2 \text{ (۲)} \quad -2D - 4 \text{ (۱)}$$

$$\text{چیست؟} \begin{vmatrix} b-a & 1 & 0 \\ -b-1 & -1 & 2a \\ a-b & -1 & 2b \end{vmatrix} \text{ ، مقدار } A = \begin{vmatrix} -a & b & 0 \\ -1 & -b & a \\ a & -b & b \end{vmatrix} \text{ اگر } k = 325 \text{ (**)}$$

$$\frac{2}{b} A \text{ (۴)} \quad 2bA \text{ (۳)} \quad -2bA \text{ (۲)} \quad -\frac{2}{b} A \text{ (۱)}$$

(خارج ۹۲)

$$\text{کدام است؟} A = \begin{bmatrix} 5+a & b & c \\ a & 5+b & c \\ a & b & 5+c \end{bmatrix} \text{ باشد و } a+b+c=7 \text{ ، دترمینان ماتریس } (\Delta A^{-1}) \text{ کدام است؟} \text{ (**)}$$

$$\frac{25}{7} \text{ (۴)} \quad \frac{25}{12} \text{ (۳)} \quad \frac{5}{7} \text{ (۲)} \quad \frac{5}{12} \text{ (۱)}$$

$$\text{کدام است؟} A = \begin{bmatrix} a+x & a & a \\ b & b+x & b \\ c & c & c+x \end{bmatrix} \text{ در ماتریس } \text{ (**)}$$

$$\pm 3 \text{ (۴)} \quad \pm 2 \text{ (۳)} \quad \pm 1 \text{ (۲)} \quad \text{صفر (۱)}$$

آزمون

$$\text{کدام است؟} A = [i+j-1]_{n \times n} \text{ درایه سطر اول و ستون آخر، ۲ برابر درایه سطر دوم و ستون سوم است. در این ماتریس } a_{np} \text{ کدام است؟} \text{ (**)}$$

$$12 \text{ (۴)} \quad 11 \text{ (۳)} \quad 10 \text{ (۲)} \quad 9 \text{ (۱)}$$

$$\text{کدام است؟} \begin{bmatrix} 1 & 3a \\ 4 & 2 \\ 0 & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & a \\ 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = I \text{ اگر } a+b \text{ حاصل،} \text{ (**)}$$

$$-1 \text{ (۴)} \quad 2 \text{ (۳)} \quad 1 \text{ (۲)} \quad -2 \text{ (۱)}$$

(خارج ۹۴)

۳۳۰- در ماتریس $A = [a_{ij}]_{3 \times 3}$ ، اگر $a_{ij} = \begin{cases} 2 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases}$ باشد، ماتریس $A^2 - 4A$ برابر کدام است؟

۱) $2I$ ۲) $4I$ ۳) $3I$ ۴) $5I$

۳۳۱- مجموع درایه‌های سطر سوم ماتریس اسکالر A از مرتبه ۳، برابر ۳ است. مجموع درایه‌های ستون دوم ماتریس A^2 کدام است؟

۱) ۹ ۲) ۱۸ ۳) ۲۷ ۴) ۳۶

۳۳۲- اگر A ماتریس وارون پذیر و $A^2 - 2A + 2I = \bar{O}$ باشد، حاصل $(A - I)^{-1}$ کدام است؟

۱) I ۲) $2I$ ۳) $-I$ ۴) $-2I$

۳۳۳- اگر $A + 2B = 3AB$ و A و B وارون پذیر باشند، حاصل $2A^{-1} + B^{-1}$ کدام است؟

۱) $2A^{-1}B^{-1}$ ۲) $3I$ ۳) $3B^{-1}A^{-1}$ ۴) $3AB$

۳۳۴- اگر $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & x & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ باشد، مقدار $x + y$ کدام است؟

۱) -5 ۲) -4 ۳) 4 ۴) 5

۳۳۵- اگر A و B ماتریس‌های مربعی و $AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ و $BA = \begin{bmatrix} x & 3 \\ 1 & y \end{bmatrix}$ باشد، $x + y$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۳۳۶- ماتریس A از مرتبه ۳ است. اگر مقدار دترمینان A برابر ۳ باشد، دترمینان ماتریس $A \frac{3}{|A^{-1}|}$ کدام است؟

۱) 3^6 ۲) 3^7 ۳) 3^8 ۴) 3^9

۳۳۷- یک ماتریس وارون پذیر از مرتبه ۲ و $B = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ -4 & |A| \end{bmatrix}$ و $A^{-1}B = 2I$ باشد، $|A^2|$ کدام است؟

۱) -1 ۲) ۱ ۳) -2 ۴) ۲

۳۳۸- اگر $K = \begin{vmatrix} a+b & 1 & 2 \\ a & b & 1 \\ 2a & 1 & -1 \end{vmatrix}$ باشد، حاصل $K = \begin{vmatrix} a+b & 1 & 2 \\ a-b & 0 & -3 \\ 2a & 2b & 2 \end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) $2k$ ۲) $-2k$ ۳) $\frac{k}{2}$ ۴) $-\frac{k}{2}$



حال بر حسب سطر اول بسط می‌دهیم:

$$|AB| = -3 \begin{vmatrix} 5 & -23 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 11 & -23 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} + 5 \begin{vmatrix} 11 & 5 \\ -2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= -3(20 - 23) + 2(44 - 46) + 5(-11 + 10) = 9 - 4 - 5 = 0$$

۲۱۸. گزینه ۴ مطابق تعریف ماتریس A را می‌نویسیم:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{بر حسب سطر اول}} |A| = 0 \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= -2(0 + 2) + 2(1 - 0) = -4 + 2 = -2$$

۲۱۹. گزینه ۴ بسط دترمینان بر حسب سطر اول را می‌نویسیم:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & -a & -2 \\ 1 & a & 1 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} -a & -2 \\ a & 1 \end{vmatrix} + 0 = (-a + 2a) = a$$

حالا داریم: $|A| = 4 \Rightarrow a = 4$

۲۲۰. گزینه ۲ در گام اول، دترمینان A را بر حسب ستون دوم می‌نویسیم:

$$|A| = -1 \times \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -1 \times (4 - 6) = 2$$

و در گام دوم، دترمینان B را هم بر حسب ستون دوم می‌نویسیم:

$$|B| = 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 8 \end{vmatrix} = 1 \times (8 - 9) = -1$$

$$\Rightarrow |A|^2 |B|^2 = 2^2 \times (-1)^2 = 4$$

۲۲۱. گزینه ۲ بر حسب ستون سوم بسط می‌دهیم:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & a \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -a \end{vmatrix} = a \times \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 0 + (-a) \times \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= a(-1 - 1) - 0 + (-a)(1 - 0) = -2a - a = -3a = 6 \Rightarrow a = -2$$

۲۲۲. گزینه ۲ بسط دترمینان را بر حسب ستون دوم می‌نویسیم:

$$\Rightarrow D = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 4 & a & 2 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix} = -0 + a \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= a(0 + 1) - 3(4 - 4) = a - 24 = 2 \Rightarrow a = 26$$

۲۲۳. گزینه ۱ دترمینان را بر حسب سطر اول بسط می‌دهیم:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ x & y & 1 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ y & 1 \end{vmatrix} - 1 \times \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ x & 1 \end{vmatrix} + 1 \times \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ x & y \end{vmatrix}$$

$$= (0 + y) - 1 \times (2 + x) + (2y + 0) = 3y - x - 2$$

۲۲۴. گزینه ۲ هر کدام از دترمینان‌ها را جداگانه حساب می‌کنیم:

$$D_1 = \begin{vmatrix} 0 & x & 0 \\ y & 0 & z \\ 0 & t & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{بسط بر حسب سطر اول}} -x \begin{vmatrix} y & z \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = -x(0) = 0$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} x & 0 & x \\ 0 & y & 0 \\ z & 0 & t \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{بسط بر حسب سطر دوم}} y \times \begin{vmatrix} x & x \\ z & t \end{vmatrix} = y \times (xt - xz)$$

فاکتور از $xy(t - z)$

$$D_1 + D_2 = 0 + xy(t - z) = xy(t - z)$$

و در نهایت:

۲۱۴. گزینه ۳

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{بسط دترمینان بر حسب سطر اول}} 3 \times \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} - 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 3 \times (9 - 1) - 1 \times (3 - 1) + 1 \times (1 - 3) = 24 - 2 - 2 = 20$$

۲۱۵. گزینه ۲

$$\xrightarrow{\text{بسط بر حسب ستون دوم}} |A| = \begin{vmatrix} 4 & -1 & -4 \\ 3 & 0 & -4 \\ 3 & -1 & -3 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \times \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} + 0 + 1 \times \begin{vmatrix} 4 & -4 \\ 3 & -4 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \times (-9 + 12) + (-16 + 12) = -1$$

۲۱۶. گزینه ۴ بسط دترمینان را بر حسب سطر دوم که یک درایه صفر دارد، می‌نویسیم:

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 3 & 0 & 5 \\ -2 & 6 & 1 \end{vmatrix} = -3 \times \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 6 & 1 \end{vmatrix} + 0 - 5 \times \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= -3(-1 - 24) - 5(12 - 2) = 75 - 50 = 25$$

۲۱۷. گزینه ۴ راه I ماتریس $A \times B$ را تشکیل می‌دهیم و

دترمینان می‌گیریم:

$$AB = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 5 & -11 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & -2 & 5 \\ 11 & 5 & -23 \\ -2 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$



۲۲۵. گزینه ۲ | دترمینان را برحسب سطر اول بسط می‌دهیم:

$$\begin{vmatrix} x & y & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = x \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} - y \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 0$$

$$= x(1+1) - y(1-2) = 2x + y \Rightarrow 2x + y = 2 \Rightarrow y = -2x + 2$$

۲۲۶. گزینه ۱ | ماتریس C را تشکیل می‌دهیم:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & 12 & 1 \\ 0 & -1 & 9 & 2 \\ 4 & 1 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

سطر چهارم و ستون سوم را حذف می‌کنیم و دترمینان می‌گیریم:

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} - (-1) \times \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} + 0$$

$$= (0+1) + (4+4) = 9$$

۲۲۷. گزینه ۲ | اگر A وارون پذیر نباشد، باید $|A| = 0$ باشد:

$$|A| = 4 \times 1 - (-2)a = 0 \Rightarrow a = -2$$

حالا دترمینان B را تشکیل می‌دهیم:

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -2 & 4 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + 2 \times \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + 0$$

$$= (6+2) + 2(-2+3) = 6+2 = 8$$

۲۲۸. گزینه ۳ | در گام اول، ماتریس B را تشکیل می‌دهیم:

$$B = 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$$

در گام دوم، ماتریس C را تشکیل می‌دهیم:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & 4 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -3 & 4 \end{bmatrix}$$

و در گام آخر، سطر دوم و ستون سوم را حذف می‌کنیم و دترمینان را برحسب

سطر اول می‌نویسیم:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

۲۲۹. گزینه ۳ | در گام اول، ماتریس $A^T + I$ را تشکیل می‌دهیم:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow A^T + I = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A^T + I = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

در گام دوم، ماتریس B را می‌نویسیم و دترمینان می‌گیریم:

$$B = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 1 \\ -3 & 2 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} - 0 + 1 \times \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 5(0-6) - 0 + 1 \times (-9+2) = -30 - 7 = -37$$

۲۳۰. گزینه ۴ | راه ۱ | در گام اول A^{-1} را حساب می‌کنیم:

$$A^{-1} = \frac{1}{\begin{vmatrix} 5 & -2 \\ -3 & 1 \end{vmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & +2 \\ +3 & -1 \end{bmatrix}$$

در گام دوم دترمینان B را تشکیل می‌دهیم:

$$|B| = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 4 \\ 6 & -2 & 0 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} -1 & 0 & 4 \\ 6 & -2 & 0 \end{vmatrix} + 0$$

$$= 20 - 24 = -4$$

راه ۲ | در ماتریس B برحسب ستون سوم می‌نویسیم:

$$|B| = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2A^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 1 \times |2A^{-1}| = 2^2 \times |A^{-1}| = \frac{2^2}{|A|} = \frac{4}{-1} = -4$$

۲۳۱. گزینه ۲ | بسط دترمینان را برحسب ستون دوم که تا صفر دارد

می‌نویسیم:

$$\begin{vmatrix} x & 0 & k \\ 1 & x+1 & 0 \\ 2 & 0 & x+2 \end{vmatrix} = (x+1) \begin{vmatrix} x & k \\ 2 & x+2 \end{vmatrix}$$

$$= (x+1)(x^2 + 2x - 2k) = 0$$

معادله دارای ریشه $x = -1$ هست، پس معادله درجه دوم $x^2 + 2x - 2k = 0$

یا نباید ریشه داشته باشد یا ریشه آن فقط $x = -1$ باشد:

$$\begin{cases} \Delta < 0 \Rightarrow 4 + 8k < 0 \Rightarrow k < -\frac{1}{2} \\ \text{یا} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 + 2x - 2k = (x+1)^2 = x^2 + 2x + 1 \Rightarrow k = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

پس مجموعه جواب $k \leq -\frac{1}{2}$ است که در گزینه‌ها فقط $k = -1$ در این شرط

صدق می‌کند.

۲۳۲. گزینه ۲ | بسط دترمینان را برحسب ستون اول می‌نویسیم:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2x & -1 \\ 1 & -2x & 1 \\ 1 & -4x & 2 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} -2x & 1 \\ -4x & 2 \end{vmatrix} - 1 \times \begin{vmatrix} 2x & -1 \\ -4x & 2 \end{vmatrix} + 1 \times \begin{vmatrix} 2x & -1 \\ -2x & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \times (-4x+4x) - 1 \times (4x-4x) + 1 \times (2x-2x) = 0$$

و مستقل از تعداد x، دترمینان همیشه صفر است، پس x هر عدد حقیقی

می‌تواند باشد و معادله بی‌شمار جواب دارد.

۲۳۳. گزینه ۳ | بسط دترمینان برحسب سطر اول را می‌نویسیم:

$$\begin{vmatrix} -4 & 1 & 1 \\ 1 & 2-x & 1 \\ 3 & 2 & 3-x \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow -4 \times \begin{vmatrix} 2-x & 1 \\ 2 & 3-x \end{vmatrix} - 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3-x \end{vmatrix} + 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 2-x \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow -4(6+x^2-5x-2) - (3-x-3) + (2-6+3x) = 0$$

$$\Rightarrow -16 - 4x^2 + 20x + x - 4 + 3x = 0$$

$$\Rightarrow -4x^2 + 24x - 20 = 0 \xrightarrow{\text{تقسیم بر } (-4)} x^2 - 6x + 5 = 0$$

$$\Rightarrow (x-1)(x-5) = 0$$

$$\Rightarrow x = 1 \text{ یا } 5$$



۲۳۴. گزینه ۳ | دترمینان را برحسب سطر اول می نویسیم:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 4 & x+5 \\ x-1 & 6 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow 1 \times \begin{vmatrix} 4 & x+5 \\ 6 & -1 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} -2 & x+5 \\ x-1 & -1 \end{vmatrix} + 3 \times \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ x-1 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (-4 - 6x - 30) + (-2)(2 - x^2 - 4x + 5) + 3(-12 - 4x + 4) = 0$$

$$\Rightarrow -6x - 34 + 2x^2 + 8x - 14 - 24 - 12x = 0$$

$$\Rightarrow 2x^2 - 10x - 72 = 0 \xrightarrow{\div 2} x^2 - 5x - 36 = 0$$

$$\Rightarrow (x-9)(x+4) = 0 \Rightarrow x = 9, x = -4$$

۲۳۵. گزینه ۱ | بسط دترمینان را برحسب ستون اول می نویسیم:

$$\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & x^2 & x^2 \\ 1 & x^3 & x \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} x^2 & x^2 \\ x^3 & x \end{vmatrix} - 1 \times \begin{vmatrix} x & x^2 \\ x^3 & x \end{vmatrix} + 1 \times \begin{vmatrix} x & x^2 \\ x^2 & x^2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (x^2 - x^5) - (x^2 - x^6) + (x^2 - x^5) = 0$$

$$\xrightarrow{\text{از } x^2 \text{ فاکتور می گیریم}} x^2(x - x^3 - 1 + x^4 + x - x^3) = 0$$

$$\Rightarrow x^2(x^4 - 2x^3 + 2x - 1) = 0$$

حالا عبارت داخل پرانتز را تجزیه می کنیم:

$$\Rightarrow x^2[(x^4 - 1) - 2x(x^2 - 1)] = 0$$

$$\Rightarrow x^2[(x^2 - 1)(x^2 + 1) - 2x(x^2 - 1)] = 0$$

$$\Rightarrow x^2(x^2 - 1)(\cancel{x^2 + 1} - 2x) = 0 \Rightarrow x = 0, 1, -1$$

۲۳۶. گزینه ۱ | می دانیم اگر $A_{3 \times 2} = B_{3 \times 2} \times C_{2 \times 2}$ باشد، همواره

دترمینان A برابر صفر است و هیچ گاه رابطه $|A| = 5$ برقرار نیست.

۲۳۷. گزینه ۱ | می دانیم که اگر $C_{3 \times 2} = A_{3 \times 2} \times B_{2 \times 2}$ باشد، دترمینان

C همواره برابر صفر است و به ازای هیچ مقداری از m مقدار دترمینان ۲ نمی شود.

۲۳۸. گزینه ۲ | چون در سطر سوم تا ۲ صفر داریم، پس بسط دترمینان

برحسب سطر سوم را می نویسیم:

$$D = a \begin{vmatrix} a & a \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 0 = a(3a - 2a) = a^2$$

۲۳۹. گزینه ۴ | با توجه به صورت تست متوجه می شویم که باید دترمینان

را برحسب ستون اول یا سطر سوم بنویسیم. (و فرقی هم نمی کند) که ما این جا

برحسب ستون اول می نویسیم:

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 2 & -2 & 4 \\ x & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \times \underbrace{\begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}}_A + x \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ -2 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow A = \frac{-4 - 4}{-1} - 2 \frac{6 - 7}{2} = -8 + 2 = -6$$

۲۴۰. گزینه ۲ | بسط دترمینان را برحسب سطر سوم می نویسیم:

$$\begin{vmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \\ 2 & x & 5 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} - x \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} + 5 \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= \underbrace{2(3+2) + 5(-5-0)}_A - x \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} \Rightarrow A = 10 - 25 = -15$$

۲۴۱. گزینه ۳ | بسط دترمینان را برحسب سطر اول می نویسیم:

$$0 + 1 \times \begin{vmatrix} a & b \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 0 = 1 \times 4 = 4$$

۲۴۲. گزینه ۳ | بسط دترمینان را برحسب سطر اول می نویسیم:

$$|B| = 0 - 0 + 3|A| = 3(-2) = -6$$

۲۴۳. گزینه ۳ | می دانیم که باید با حذف سطر و ستون مربوط به

$a_{12} = -3$ ، دترمینان ماتریس باقی مانده صفر شود.

$$\begin{vmatrix} 4 & -3 & 12 \\ a & 2b & 5 \\ 6 & c^2 & 2 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} a & 5 \\ 6 & 2 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow 2a - 30 = 0 \Rightarrow a = 15$$

۲۴۴. گزینه ۴ | باید درایه ای را انتخاب کنیم که با حذف سطر و ستون

آن، دترمینان باقی مانده صفر شود. تمام گزینه ها را امتحان می کنیم. با انتخاب

۴ داریم:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \\ 2 & -1 & 6 \end{vmatrix} \xrightarrow{a_{22}} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = 1 \times (6) - 2(3) = 0$$

۲۴۵. گزینه ۴ | ابتدا دترمینان اولیه را حساب می کنیم:

$$D_1 = \begin{vmatrix} 5 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 5 & -4 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{بسط برحسب ستون اول}} 5 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 5 & -4 \end{vmatrix} - 0 + 2 \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= 5(-4+5) + 2(-4+3) = 3$$

و سپس دترمینان دوم:

$$D_2 = \begin{vmatrix} 5 & 4 & -3 \\ 0 & -2 \times 1 & 1 - 2 \times 2 \\ 2 & 5 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 4 & -3 \\ -2 & -3 & -7 \\ 2 & 5 & -4 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{بسط برحسب سطر اول}} 5 \begin{vmatrix} -3 & -7 \\ 5 & -4 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} -2 & -7 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} -2 & -3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= 5(47) - 4(22) - 3(-4) = 159$$

$$D_2 - D_1 = 159 - 3 = 156$$

و بنابراین داریم:

۲۴۶. گزینه ۱ | ابتدا $|A|$ را حساب می کنیم:

$$|A| \xrightarrow{\text{بسط برحسب ستون دوم}} -3 \times \begin{vmatrix} 5 & 7 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} + 0 = -3(30 - 21) = -27$$

و حالا یک واحد به درایه های ستون دوم اضافه می کنیم و دوباره دترمینان می گیریم:

$$|B| = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 4 \\ 5 & 1 & 7 \\ 3 & 1 & 6 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{ساروس}} \begin{vmatrix} 2 & 4 & 4 & 2 & 4 \\ 5 & 1 & 7 & 5 & 1 \\ 3 & 1 & 6 & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= (12 + 84 + 80) - (12 + 14 + 120) = -30$$

$$\xrightarrow{|B| - |A|} -30 - (-27) = -3$$

۲۴۷. گزینه ۱ | یعنی اگر $a_{33} = -2 + 5 = 3$ به $a_{33} = -2$ تغییر کند،

دترمینان ثابت می ماند. پس باید دترمینان 2×2 ای که از حذف طرف سطر سوم

و ستون سوم باقی می ماند، صفر باشد:

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -3 & a \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow 2a + 12 = 0 \Rightarrow a = -6$$

۲۴۸. گزینه ۴

نکته می‌دانیم که در ماتریس $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ اگر به تمامی درایه‌ها k واحد اضافه کنیم و دترمینان تغییر نکند، باید $a+d = b+c$ باشد.

$$\Rightarrow 2+a = 3+5 \Rightarrow a=6$$

حالا بسط دترمینان A را برحسب سطر اول که دو تا صفر دارد می‌نویسیم:

$$\xrightarrow{a=6} |A| = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -11 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} = 3 \times \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} - 0 + 0 = 3(12-15) = -9$$

۲۴۹. گزینه ۳ بسط دترمینان را برحسب سطر دوم در دو حالت می‌نویسیم:

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ -3 & -5 & 2 \\ 2 & 5 & 13 \end{vmatrix} = 3 \times \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 13 \end{vmatrix} - 5 \times \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 13 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$$

و در حالت دوم $a_{23} = 2+x$ در نظر می‌گیریم:

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ -3 & -5 & 2+x \\ 2 & 5 & 13 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{بسط برحسب سطر دوم}} 3 \times \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 13 \end{vmatrix} - 5 \times \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 13 \end{vmatrix} - (x+2) \times \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$$

که دو عبارت اول در بسط D_1 و D_2 یکسان است، پس داریم:

$$D_1 - D_2 = -2 \times \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} + (x+2) \times \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= 2-x-2 = -x = 10 \Rightarrow x = -10$$

۲۵۰. گزینه ۲ می‌دانیم که باید دترمینان 2×2 ای که با حذف سطر دوم

و ستون اول باقی می‌ماند صفر باشد:

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 4 & a \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow 2a - 20 = 0 \Rightarrow a = 10$$

۲۵۱. گزینه ۱ چون ماتریس پایین‌مثلثی است، پس دترمینان آن برابر

حاصل ضرب قطر اصلی است:

$$\Rightarrow |A| = a(a+1)(a-1) = a(a^2-1) = a^3 - a = a^3 + a + 2$$

$$\Rightarrow 2a = -2 \Rightarrow a = -1$$

۲۵۲. گزینه ۳ می‌دانیم k_1 برابر منفی حاصل ضرب قطر فرعی و k_2 برابر

با حاصل ضرب قطر اصلی است:

$$\begin{cases} k_1 = -abc \\ k_2 = (a+1)bc = abc + bc \end{cases} \xrightarrow{(+)} k_1 + k_2 = bc$$

۲۵۳. گزینه ۲ ماتریس A را می‌نویسیم:

$$A = \begin{bmatrix} |A| & 2|A|^2 & 2|A|^3 \\ 0 & |A| & 2|A|^2 \\ 0 & 0 & |A| \end{bmatrix}$$

و چون ماتریس A بالامتثلی است، پس داریم:

$$|A| = |A| \times |A| \times |A| = |A|^3 \Rightarrow |A|^3 - |A| = 0$$

$$\Rightarrow |A|(|A|^2 - 1) = 0 \Rightarrow |A| = 0, 1, -1$$

که مقدار مثبت دترمینان A برابر ۱ است.

۲۵۴. گزینه ۲

$$|ABC| = |A||B||C|$$

نکته

و دترمینان سمت چپ A حاصل ضرب قطر اصلی و دترمینان ماتریس راست A برابر منفی حاصل ضرب قطر فرعی است.

$$\Rightarrow (-2) \times |A| \times (-5) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1000 \Rightarrow |A| = 100$$

۲۵۵. گزینه ۲ دترمینان B برابر حاصل ضرب قطر اصلی می‌شود:

$$\Rightarrow |B| = 2|A|^3 = 54 \Rightarrow |A|^3 = 27 \Rightarrow |A| = 3$$

و از طرفی داریم: $|A| = 1(-1) - 2m = -1 - 2m = 3 \Rightarrow m = -2$

۲۵۶. گزینه ۲ ماتریس A را به صورت زیر در نظر می‌گیریم:

$$A = \begin{bmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & k \end{bmatrix} \Rightarrow |A| = k^3 = 27 \Rightarrow k = 3$$

$$\Rightarrow 2A = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

و جمع درایه‌های ستون اول ماتریس $2A$ برابر ۶ است.

۲۵۷. گزینه ۴ ماتریس A را به صورت زیر در نظر می‌گیریم:

$$A = \begin{bmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & k \end{bmatrix}$$

و $A+2I$ را می‌سازیم:

$$\Rightarrow A+2I = \begin{bmatrix} k+2 & 0 & 0 \\ 0 & k+2 & 0 \\ 0 & 0 & k+2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow |A+2I| = (k+2)^3 = 1 \Rightarrow k+2 = 1 \Rightarrow k = -1$$

$$\Rightarrow A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow A^2 + I = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

و دترمینان $A^2 + I$ برابر $8 = 2^3$ است.

۲۵۸. گزینه ۳ ابتدا ماتریس $B+2I$ را تشکیل می‌دهیم.

در ماتریس B همه درایه‌های A منفی می‌شوند و بالامتثلی تبدیل به پایین‌مثلثی

می‌شود (مثلاً $b_{33} = -a_{33}$):

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \\ -3 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

و حالا $B+2I$ را می‌نویسیم:

$$B+2I = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \\ -3 & 0 & -4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

و بنابراین: $|B+2I| = 1(1)(-2) = -2$

۲۵۹. گزینه ۴ می‌دانیم: $|kA_{3 \times 3}| = k^3 |A|$

$$|A| = 4^3 |A| = 4^3 \times 4 = 4^4 = 256$$



۲۶۰. گزینه ۲ | در ابتدا $|A|$ را حساب می‌کنیم:

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2(3) - (1)(5) = 1$$

$$|kA_{2 \times 2}| = k^2 |A|$$

$$|2A^2| = 2^2 \times |A|^2 = 4 |A|^2 = 4$$

$$\xrightarrow{\text{جای‌گذاری}} |-3A| |2A^2| = |-3A \times 4| = |-12A|$$

$$= (-12)^2 |A| = 144 \times 1 = 144$$

۲۶۱. گزینه ۱ | در گام اول $|A|$ را حساب می‌کنیم:

$$|A| = \begin{vmatrix} -3 & 5 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = (-3)(-2) - (1)(5) = 1$$

و در گام دوم از رابطه $|A^n| = |A|^n$ استفاده می‌کنیم:

$$\Rightarrow |A^3| = |A|^3 = 1^3 = 1$$

$$|A^n| = |A|^n$$

۲۶۲. گزینه ۴ | یادآوری

$$\Rightarrow |A| = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -7 \\ 4 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{بسط بر حسب} \\ \text{ستون دوم}}} 1 \times \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} + 0 = 2 - 4 = -2$$

$$|A^2| = |A|^2 = (-2)^2 = 4$$

و در نتیجه:

۲۶۳. گزینه ۱ | در گام اول دترمینان A را حساب می‌کنیم:

$$|A| = \begin{vmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & x^2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{بسط بر حسب} \\ \text{سطر دوم}}} -2 \times \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 0 = -2(4 - 2) = -4$$

$$|A^2| = |A|^2 = (-4)^2 = 16$$

و در نهایت:

۲۶۴. گزینه ۲ | در گام اول دترمینان A را حساب می‌کنیم:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a^2 & -a & -2 \\ 3 & a & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{بسط بر حسب} \\ \text{سطر اول}}} 1 \times \begin{vmatrix} -a & -2 \\ a & 1 \end{vmatrix} + 0 =$$

$$= (-a + 2a) = a$$

$$|A^4| = |A|^4 = a^4 = 25 \Rightarrow a = \pm\sqrt{5}$$

و در نتیجه:

۲۶۵. گزینه ۱

یادآوری

$$k \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ x & y & z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ka & kb & kc \\ d & e & f \\ x & y & z \end{vmatrix}$$

اگر در یک ماتریس یک سطر یا یک ستون ماتریس را k برابر کنیم، دترمینان k برابر می‌شود.

در گام اول، سطر اول ماتریس را در ۲ ضرب می‌کنیم:

$$2 \times \begin{vmatrix} x & y & z \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 2 \times 3 \xrightarrow{\text{ضرب در سطر اول}} \begin{vmatrix} 2x & 2y & 2z \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 6$$

و در گام دوم، سطر دوم را در ۲ ضرب می‌کنیم:

$$\rightarrow 2 \times \begin{vmatrix} 2x & 2y & 2z \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 2 \times 6$$

$$\xrightarrow{\text{ضرب در سطر دوم}} \begin{vmatrix} 2x & 2y & 2z \\ 2 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 12$$

۲۶۶. گزینه ۱ | در دترمینان مورد نظر از سطر دوم عدد (-2) و از ستون

دوم عدد (-3) فاکتور می‌گیریم:

$$\begin{vmatrix} a_1 & -2b_1 & c_1 \\ -2a_2 & 6b_2 & -2c_2 \\ a_3 & -2b_3 & c_3 \end{vmatrix} = (-2)(-3) \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$= (-2)(-3)(-2) = -12$$

۲۶۷. گزینه ۴ | می‌دانیم که اگر هر سطر یا هر ستون ماتریس را در k

ضرب کنیم، دترمینان k برابر می‌شود، پس در این جا داریم:

$$\frac{D'}{D} = \underbrace{(2)}_{\text{سطر ۲}} \underbrace{(-3)}_{\text{ستون ۲}} \underbrace{(-2)}_{\text{ستون ۳}} = -108$$

۲۶۸. گزینه ۱ | مطابق شکل زیر یعنی فقط ستون دوم ضرب نشده است و

ستون اول و دوم در ۲ ضرب شده و در نتیجه دترمینان $2 \times 2 = 4$ برابر شده است.

$$\begin{vmatrix} 2a_{11} & a_{11} & 2a_{13} \\ 2a_{21} & a_{22} & 2a_{23} \\ 2a_{31} & a_{32} & 2a_{33} \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{دترمینان جدید} = 4 \times |A| = 4 \times 3 = 12$$

۲۶۹. گزینه ۳ | از دو طرف دترمینان می‌گیریم:

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} \times |A| \times \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ -3 & 0 & 5 \end{vmatrix} = |2I| = 2^3 |I| = 8$$

و در نتیجه:

$$\Rightarrow -2 |A| \times 6 = 8 \Rightarrow |A| = -\frac{2}{3}$$

۲۷۰. گزینه ۳ | در گام اول، دترمینان A^3 را حساب می‌کنیم:

$$|A^3| = \begin{vmatrix} 27 & 0 \\ |A| & -1 \end{vmatrix} = 27(-1) - 0 = -27 \Rightarrow |A|^3 = 27$$

$$\Rightarrow |A| = 3$$

در گام دوم، طبق رابطه $|kA_{2 \times 2}| = k^2 |A|$ داریم:

$$\left| \frac{|A|}{3} A^2 \right| = \left(\frac{|A|}{3} \right)^2 |A^2| = 1 \times |A|^2 = |A|^2 = 3^2 = 9$$

۲۷۱. گزینه ۴ | برای راحتی محاسبه $|A| = x$ در نظر می‌گیریم:

$$|xA| + \left| \frac{2}{x} A^{-1} \right| = x^2 |A| + \frac{4}{x^2} |A^{-1}| = x^2(x) + \frac{4}{x^2} \times \frac{1}{x}$$

$$= x^3 + \frac{4}{x^3} = 4 \xrightarrow{\times x^3} x^6 + 4 = 4x^3$$

$$\Rightarrow x^6 - 4x^3 + 4 = 0 \Rightarrow (x^3 - 2)^2 = 0 \Rightarrow x^3 = 2$$

$$\Rightarrow |A|^3 = 2$$

در گام نهایی طبق خواص دترمینان داریم:

$$|(A^3)^{-1}| = |(A^{-1})^3| = |A^{-1}|^3 = \left(\frac{1}{|A|} \right)^3 = \frac{1}{|A|^3} = \frac{1}{2}$$

۲۷۲. گزینه ۱

ماتریس A را می نویسیم:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{بسط بر حسب سطر اول}} |A| = 0 + 1 \times \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} - 1 \times \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= (0+2) - (4-0) = -2$$

حالا داریم:

$$\begin{aligned} |2A| &= |2A|^2 = |-4A^2| = (-4)^2 |A^2| = -64 |A|^2 \\ &= -64 (-2)^2 = -256 \end{aligned}$$

۲۷۳. گزینه ۲

$$|kA_{n \times n}| = k^n |A|$$

نشانه

$$\Rightarrow ||A|B| = |2B| = 2^n |B| = -54 \xrightarrow{\div 2^3} |B| = -2$$

$$\Rightarrow ||B|^2 A| = |4A| = 4^n |A| = 64 \times 3 = 192$$

۲۷۴. گزینه ۲ یادآوری

$$|kA_{n \times n}| = k^n |A|$$

$$|A| = 2 \Rightarrow ||A^2|A|A^2| = |4A|A^2|$$

$$= |4^4 \times |A|^4 A^2| = |2^8 A^2| = (2^8)^4 |A^2|$$

$$= 2^{36} \times 2^8 = 2^{44}$$

۲۷۵. گزینه ۳ در گام اول عبارت را ساده می کنیم:

$$CA = 2B - C \Rightarrow CA + C = 2B \Rightarrow C(A+I) = 2B \quad (*)$$

در گام دوم ماتریس A+I را حساب می کنیم:

$$A+I = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow |A+I| = 9$$

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 5 - 6 = -1$$

و در گام نهایی از دو طرف عبارت (*) دترمینان می گیریم:

$$|C(A+I)| = |2B_{2 \times 2}| \Rightarrow |C| \times |A+I| = 2^2 |B| \Rightarrow |C| = -1$$

۲۷۶. گزینه ۱ از چاق و لاغر کمک می گیریم:

$$A^2 + A + I = \bar{O} \xrightarrow{\times(A-I)} \frac{(A-I)(A^2 + A + I)}{A^2 - I^2} = \bar{O}$$

$$\Rightarrow A^2 = I \Rightarrow |A|^2 = |I| = 1 \Rightarrow |A| = 1$$

$$|A^2| = |A|^2 = 1^2 = 1$$

و در نهایت داریم:

۲۷۷. گزینه ۲ اتحاد $(2I - A)^2$ را باز می کنیم:

$$(2I - A)^2 = 4I + A^2 - 4A$$

حالا به جای A^2 طبق فرض مسئله $2I + 4A$ می گذاریم:

$$\Rightarrow (2I - A)^2 = 4I + (2I + 4A) - 4A = 6I$$

$$\Rightarrow |(2I - A)^2| = |6I| = 6^2 |I| = 216 \times 1 = 216$$

۲۷۸. گزینه ۳ در گام اول اتحاد را ساده می کنیم:

$$(A - I)^2 = A + 2I \Rightarrow A^2 - 2A + I = A + 2I$$

$$\Rightarrow A^2 - 2A = 2I = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow |A^2 - 2A| = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \times 2 = 4$$

۲۷۹. گزینه ۲ در ابتدا دترمینان A را حساب می کنیم:

$$A^2 = -I \Rightarrow |A^2| = |-I| = -1 \Rightarrow |A|^2 = -1 \Rightarrow |A| = -1$$

و در گام دوم به جای $-I$ در عبارت خواسته شده A^2 می گذاریم:

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{|A+I|}{|A^2 - I|} &= \frac{|A+I|}{|A^2 + A^2|} = \frac{|A+I|}{|A^2(A+I)|} = \frac{|A+I|}{|A^2| \times |A+I|} \\ &= \frac{1}{|A^2|} = \frac{1}{|A|^2} = \frac{1}{(-1)^2} = 1 \end{aligned}$$

۲۸۰. گزینه ۳ گفتیم که اگر A ماتریس 3×3 باشد، داریم:

$$|kA| = k^3 |A|$$

$$\Rightarrow ||A|A^2| - \frac{2}{|A|} |A^2| = |A|^2 \times |A^2| - \frac{8}{|A|^3} \times |A^2|$$

$$= |A|^2 \times |A|^2 - \frac{8}{|A|^3} \times |A|^2 = |A|^4 - 8 = 24$$

$$\Rightarrow |A|^4 = 32 \Rightarrow |A| = 2$$

حالا به جای |A| مقدار ۲ قرار می دهیم:

$$\Rightarrow |2A - \frac{2}{|A|} A| = |2A - 2A| = |A| = 2$$

۲۸۱. گزینه ۲ با حساب کردن دترمینان A^2 ، دترمینان A هم حساب می شود:

$$|A^2| = \begin{vmatrix} -2 & x^2 + 1 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = -8 - 0 = -8$$

$$\Rightarrow |A|^2 = -8 \Rightarrow |A| = -2$$

بنابراین داریم:

$$|\frac{2}{|A|} A + A| = |-2A + A| = |-A| = |A| = -2$$

۲۸۲. گزینه ۲ در گام اول دترمینان A را حساب می کنیم:

$$|2A| = \begin{vmatrix} 4 & |A| \\ -|A| & 2 \end{vmatrix} \Rightarrow 8 \times |A| = 4(2) + |A|^2$$

$$\Rightarrow |A|^2 - 9|A| + 8 = 0 \Rightarrow (|A| - 1)(|A| - 8) = 0$$

$$\rightarrow \begin{cases} |A| = 1 \\ |A| = 8 \end{cases}$$

در گام دوم $-\frac{1}{4}A$ را حساب می کنیم:

$$|-\frac{1}{4}A| = (-\frac{1}{4})^2 \times |A| = \frac{|A|}{16}$$

که بیشترین مقدار مربوط به $|A| = 8$ و جواب برابر $\frac{1}{2}$ است.

۲۸۳. گزینه ۳ از طرفین تساوی داده شده دترمینان می گیریم:

$$|2A^2| = \begin{vmatrix} |2A| & |A| \\ |A^{-1}| & 1 \end{vmatrix} \Rightarrow 4|A|^2 = \frac{|2A|}{4|A|} \times 1 - \frac{|A|}{1} \times |A^{-1}|$$

$$\Rightarrow 4|A|^2 - 4|A| + 1 = 0 \Rightarrow (2|A| - 1)^2 = 0$$

$$\Rightarrow 2|A| - 1 = 0 \Rightarrow |A| = \frac{1}{2}$$

$$|2A| + 1 = 2^2 \times |A| + 1 = 4(\frac{1}{2}) + 1 = 3$$

در نتیجه داریم:



۲۹۱. گزینه ۳) ماتریس $(\Delta A)(2A^{-1})$ را ساده می‌کنیم:

$$(\Delta A)(2A^{-1}) = 1 \cdot AA^{-1} = 1 \cdot I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \det((\Delta A)(2A^{-1})) = 1 \cdot 0 \cdot 0 = 1 \cdot 0^2$$

از طرفی داریم:

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} = \frac{1}{4(1) - (-2)(3)} = \frac{1}{10}$$

و در نتیجه:

$$\text{نسبت دترمینان‌ها: } \frac{1 \cdot 0^2}{\frac{1}{10}} = 1 \cdot 0^3$$

۲۹۲. گزینه ۳) از دو طرف تساوی، دترمینان می‌گیریم:

$$|A^{-1} \times \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \times A^3| = |A \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}|$$

$$\Rightarrow |A^{-1}| \times \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \times |A^3| = |A| \times \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 6 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{|A|} \times (2) \times |A|^3 = |A| \times 6 \Rightarrow |A| = 3$$

حالا داریم:

$$|(A^3)^{-1}| = \frac{1}{|A^3|} = \frac{1}{|A|^3} = \frac{1}{9}$$

۲۹۳. گزینه ۲) ابتدا دترمینان A و B را حساب می‌کنیم:

$$\begin{cases} |A| = 1(0) - (-1)(2) = 2 \\ |B| = 2(1) - 0(1) = 2 \end{cases}$$

و حالا داریم:

$$|A^3 B^{-1} B^2 A^{-1}| = |A|^3 \times |B^{-1}| \times |B|^2 \times |A^{-1}|$$

$$= |A|^3 \times \frac{1}{|B|} \times |B|^2 \times \frac{1}{|A|} = |A|^3 \times |B| = 4 \times 2 = 12$$

۲۹۴. گزینه ۴) می‌دانیم:

$$(kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1}$$

حالا از دو طرف، دترمینان می‌گیریم:

$$|(kA)^{-1}| = \left| \frac{1}{k} A^{-1} \right| = \frac{1}{k^2} |A^{-1}| = \frac{1}{k^2 |A|} = \frac{1}{k^2 \times |A|}$$

و با ساده کردن داریم:

$$\Rightarrow k = 8$$

۲۹۵. گزینه ۲) یادآوری

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

رابطه کیلی - همیلتون:

$$\Rightarrow A^T = (a+d)A - (ad-bc)I$$

طبق رابطه کیلی - همیلتون $|A| = -2$ است و بنابراین داریم:

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} = -\frac{1}{2}$$

۲۹۶. گزینه ۲) می‌دانیم:

$$(A^{-1}BA)^5 = A^{-1}B^5A$$

$$\Rightarrow |(A^{-1}BA)^5| = |A^{-1}| \times |B^5| \times |A| = \frac{1}{|A|} \times |B^5| \times |A|$$

$$= \frac{(-64) \times (\frac{1}{-2})}{-2} \Rightarrow |B|^5 = -32 \Rightarrow |B| = -2$$

۲۹۷. گزینه ۱) می‌دانیم:

$$(P^{-1}AP)^6 = P^{-1}A^6P$$

و باید دترمینان بگیریم:

$$\Rightarrow |(P^{-1}AP)^6| = |P^{-1}A^6P| = |P^{-1}| \times |A|^6$$

$$= \frac{1}{|P|^6} \times |A|^6 \times |P|^6 = |A|^6$$

۲۸۴. گزینه ۱) دترمینان A را برحسب ستون دوم که دوتا صفر دارد می‌نویسیم:

$$|A| = \begin{vmatrix} |A| & 0 & 3|A| \\ 0 & |A| & 0 \\ -|A| & 0 & -2|A| \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[\text{سطر دوم}]{\text{سطر برحسب}} |A| \times \begin{vmatrix} |A| & 3|A| \\ -|A| & -2|A| \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[\neq |A|]{\frac{|A|}{|A|}} 1 = \begin{vmatrix} |A| & 3|A| \\ -|A| & -2|A| \end{vmatrix}$$

$$= -2|A|^2 + 3|A|^2 = |A|^2 \Rightarrow |A|^2 = 1$$

در نتیجه:

$$| |A|^2 \times A^4 | = |A^4| = |A|^4 = (|A|^2)^2 = 1$$

۲۸۵. گزینه ۱) چون با A+I و A-I کار داریم، پس ضرب آن‌ها را انجام می‌دهیم که مزدوج است:

$$(A-I) \times (A+I) = A^2 - I = \bar{0} - I = -I$$

$$|(A-I)(A+I)| = |-I|$$

و در نتیجه:

$$\Rightarrow |A-I| \times |A+I| = 1 \Rightarrow |A-I| = \frac{1}{3}$$

۲۸۶. گزینه ۲) با توجه به $(A-2I)$ و $(A+2I)$ از ضرب آن‌ها و اتحاد مزدوج استفاده می‌کنیم:

$$(A-2I)(A+2I) = A^2 - 4I^2 = \bar{0} - 4I = -4I$$

$$\Rightarrow |(A-2I)(A+2I)| = |A-2I| \times |A+2I| = |-4I|$$

$$= \frac{-64}{-64} |I| \Rightarrow |A+2I| = \frac{-64}{32} = -2$$

۲۸۷. گزینه ۲) از رابطه $A^3 = 2I$ به رابطه $A^3 - I = 2I - I = I$ می‌رسیم و اتحاد چاق و لاغر می‌زنیم:

$$\Rightarrow A^3 - I = (A-I)(A^2 + A + I)$$

$$\Rightarrow |A^3 - I| = |(A-I)| \times |A^2 + A + I|$$

$$\Rightarrow 2^3 |I| = |A-I| \times 4 \Rightarrow |A-I| = \frac{8}{4} = 2$$

۲۸۸. گزینه ۳) می‌دانیم $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$ ، پس در ابتدا |A| را حساب می‌کنیم:

$$\xrightarrow{\text{ماتریس بالامثلثی}} |A| = 1 \times 3 \times 1 = 3 \Rightarrow |A^{-1}| = \frac{1}{3}$$

۲۸۹. گزینه ۳) ابتدا دترمینان A را با بسط، برحسب ستون سوم حساب می‌کنیم:

$$|A| = 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} + 0 = 1 \times (3+2) = 5$$

حالا داریم:

$$|(A^3)^{-1}| = |(A^{-1})^3| = |A^{-1}|^3 = \left(\frac{1}{5}\right)^3 = \frac{1}{125}$$

۲۹۰. گزینه ۲) داریم:

$$|A^{-1}| = 4(1) - 2(3) = -2 \Rightarrow |A| = \frac{1}{|A^{-1}|} = -\frac{1}{2}$$

از طرفی می‌دانیم $|kA_{3 \times 3}| = k^3 |A|$ ، پس:

$$||A^{-1}|A| = |-2A| = (-2)^2 |A| = 4|A| = 4\left(-\frac{1}{2}\right) = -2$$

و در نهایت $|A|$ را حساب می‌کنیم و به توان ۶ می‌رسانیم:

$$|A| = 2(-2) - (-1)(3) = -1 \Rightarrow |A|^6 = 1$$

رابطه $(A^{-1}BA)^2$ را ساده می‌کنیم و از دو طرف تساوی

$$A + 2I = (A^{-1}BA)^2 = A^{-1}B^2A$$

دترمینان می‌گیریم:

$$\Rightarrow |A + 2I| = |(A^{-1}BA)^2| = |A^{-1}B^2A| = \frac{|A^{-1}| |B^2| |A|}{|A|} = |B|^2$$

$$\Rightarrow |A + 2I| = |B|^2$$

حالا $A + 2I$ را حساب می‌کنیم:

$$A + 2I = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow |A + 2I| = 3 - (-6) = 9 = |B|^2$$

از طرفی مسئله دترمینان $(B^2)^{-1}$ را خواسته، که داریم:

$$|(B^2)^{-1}| = \frac{1}{|B^2|} = \frac{1}{|B|^2} = \frac{1}{9}$$

در گام اول با بسط دترمینان A برحسب ستون دوم داریم:

$$|A| = 3 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} + 0 = 3(4 - 2) = 6$$

در گام دوم داریم:

$$|-\frac{1}{3}A^6 A^{-1}| = (-\frac{1}{3})^6 |A|^6 \times \frac{|A^{-1}|}{|A|}$$

$$= -\frac{1}{27} \times |A|^6 = -\frac{1}{27} \times 6^6 = -8$$

۳۰۰. گزینه ۴ می‌دانیم:

$$|A| \times |3A^{-1} + 2B^{-1}| \times |B| = |A(3A^{-1} + 2B^{-1}) \times B|$$

حالا ماتریس را با پخش کردن ساده می‌کنیم:

$$\Rightarrow A(3A^{-1} + 2B^{-1})B = (3I + 2AB^{-1}) \times B$$

$$= (3B + 2A \underbrace{B^{-1}B}_I) = 3B + 2A$$

پس کافی است ماتریس $3B + 2A$ را حساب کرده و دترمینان بگیریم:

$$\Rightarrow 3B + 2A = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow |A(3A^{-1} + 2B^{-1}) \times B| = |3B + 2A| = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 7 \end{vmatrix}$$

$$= 3(7) - 2(6) = 9$$

۳۰۱. گزینه ۳ ابتدا عبارت $A(A^{-1} + B^{-1})B$ را با پخش کردن، ساده

می‌کنیم:

$$\Rightarrow A(A^{-1} + B^{-1})B = (\underbrace{AA^{-1}}_I + AB^{-1})B$$

$$= (I + AB^{-1})B = \underbrace{IB}_{IB} + \underbrace{A \underbrace{B^{-1}B}_I}$$

و در نتیجه داریم:

$$\Rightarrow |A(A^{-1} + B^{-1})B| = |A + B| = 5$$

۳۰۲. گزینه ۴ با توجه به صورت سؤال دو ماتریس $A + I$ و $A - I$ را

در هم ضرب می‌کنیم:

$$(A + I)(A - I) = \underbrace{A^2}_O - I = -I$$

حالا از دو طرف دترمینان می‌گیریم:

$$\Rightarrow \underbrace{|A + I|}_{1} \times |A - I| = |-I| = 1 \Rightarrow |A - I| = \frac{1}{4} = 0.25$$

۳۰۳. گزینه ۲ در ماتریس $I + 2A^{-1}$ یک ماتریس A ضرب می‌کنیم:

$$A \times (I + 2A^{-1}) = A + 2I$$

حالا از دو طرف دترمینان می‌گیریم:

$$\Rightarrow |A| \times |I + 2A^{-1}| = |A + 2I|$$

$$\xrightarrow{\div |A|} |I + 2A^{-1}| = \frac{|A + 2I|}{|A|}$$

۳۰۴. گزینه ۴ ماتریس I را به صورت AA^{-1} می‌نویسیم:

$$I + ABA^{-1} = AA^{-1} + ABA^{-1}$$

$$\xrightarrow{\text{از چپ از A فکتور می‌گیریم}} A(A^{-1} + BA^{-1})$$

و حالا از راست از A^{-1} فکتور می‌گیریم:

$$\Rightarrow I + ABA^{-1} = A(I + B)A^{-1}$$

$$\Rightarrow |I + ABA^{-1}| = |A(I + B)A^{-1}|$$

$$= |A| \times |I + B| \times \underbrace{|A^{-1}|}_{\frac{1}{|A|}} = |I + B|$$

و در نتیجه $|I + B|$ برابر ۴ است و در نهایت داریم:

$$|(B + I)^2| = |B + I|^2 = 4^2 = 16$$

۳۰۵. گزینه ۱ دو ماتریس A^{-1} و $2A + 2B$ را در هم ضرب می‌کنیم:

$$A^{-1}(2A + 2B) = 2 \underbrace{A^{-1}A}_I + 2A^{-1}B = 2I + 2A^{-1}B$$

$$\Rightarrow \underbrace{|A^{-1}|}_{\frac{1}{3}} \times \underbrace{|2A + 2B|}_2 = |2I + 2A^{-1}B| \Rightarrow |2I + 2A^{-1}B| = 1$$

۳۰۶. گزینه ۱ ابتدا $A(A - I) = \bar{O}$ را ساده می‌کنیم:

$$A^2 - A = \bar{O} \Rightarrow A^2 = A \xrightarrow{\text{دترمینان می‌گیریم}} |A^2| = |A|$$

$$\Rightarrow |A|^2 = |A| \Rightarrow |A| = 0, 1$$

ولی چون A وارون پذیر است، پس $|A| \neq 0$ و در نتیجه $|A| = 1$ است. حالا

$$2A^2 + 3A = 2(A) + 3A = 5A$$

داریم:

$$\Rightarrow |2A^2 + 3A| = |5A| = 25 |A| = 25$$

و در نتیجه:

$$\Rightarrow |(2A^2 + 3A)^{-1}| = \frac{1}{|(2A^2 + 3A)|} = \frac{1}{25}$$

۳۰۷. گزینه ۳ از سمت راست $A + B$ ماتریس B را فکتور می‌گیریم:

$$A + B = AI + B = A \underbrace{B^{-1}B}_I + B = (AB^{-1} + I)B$$

و حالا دترمینان ضرب دو ماتریس را می‌نویسیم:

$$\Rightarrow |A + B| = |AB^{-1} + I| \times |B| \Rightarrow 10 = |AB^{-1} + I| \times 2$$

$$\Rightarrow |AB^{-1} + I| = 5$$

۳۰۸. گزینه ۳ عدد a را -1 قرار می‌دهیم (با قراردادن $a = -1$ تمام

گزینه‌ها با هم متفاوت می‌شوند):

$$D = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{بسط بر حسب سطر اول}} -1 \times \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 0 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= -((4 - 3) + (1 - 0)) = -1 + 1 = 0$$

و بنابراین ۳ صحیح است.

۳۱۳. گزینه ۱ فرض کنید $a=1$, $b=2$, $c=-1$ باشد، در این صورت

مقدار گزینه‌ها برابر صفر، -2 ، 2 و 6 می‌شود که با هم متفاوت‌اند. حالا دترمینان

$$\begin{vmatrix} 1 & a & bc-a^2 \\ 1 & b & ac-b^2 \\ 1 & c & ab-c^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -5 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & -2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot (-2) = -2$$

را حساب می‌کنیم: $(2-5+3) - (-6+5+1) = 0$ و بنابراین جواب ۱ است.

۳۱۴. گزینه ۴ با انتخاب $x=y=-1$ و $z=0$ هم شرط $y=x+z$

درست می‌شود و هم گزینه‌ها به ترتیب 2 ، 1 ، -1 و -2 می‌شوند که با هم

متفاوت هستند. حالا دترمینان را حساب می‌کنیم:

$$\begin{vmatrix} 1+x & x & y+z \\ 1 & y & x+z \\ 1 & z & x+y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0 \cdot (-1) \cdot (-1) - (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) - (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) = 0 - 1 - 1 = -2$$

ساروس $(0+1+0) - (0+1+0) = -1$

پس ۳ یعنی $x^2(x+z)$ که با عددگذاری ما همان -1 بود را انتخاب می‌کنیم.

۳۱۵. گزینه ۲ با عددگذاری $a=b=c=1$ تمام گزینه‌ها متفاوت

می‌شوند و به ترتیب 3 ، 0 ، 2 و 6 هستند. حالا داریم:

$$\begin{vmatrix} b+c & a+c & b+a \\ a & b & c \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 4 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 4 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$(4+4+4) - (4+4+4) = 0$

و در نتیجه ۲ جواب است.

تذکره اگر در یک ماتریس دو سطر یا ستون برابر هم (یا ضریبی از هم)

باشند، دترمینان همیشه صفر است.

۳۱۶. گزینه ۴ چون گزینه‌ها به b و c بستگی ندارد آن‌ها را صفر می‌گذاریم

و برای راحتی محاسبه $a=1$ را هم جای‌گذاری می‌کنیم به این ترتیب گزینه‌ها

3 ، 2 ، -2 و -1 می‌شود:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ 2a & 2b+1 & 2c+2 \\ 3a & 2b+2 & 2c+3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot (3-4) = -1$$

$1 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 0 = 1 \times (3-4) = -1$

و جواب ۴ یا همان $-a$ است.

۳۱۷. گزینه ۲ با عددگذاری $a=b=0$ داریم:

$$k = \begin{vmatrix} a & b & 2 \\ 3 & 1 & a \\ 1 & b & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$D = \begin{vmatrix} 2a-2 & 0 & 0 \\ 1 & b & 2 \\ 3 & 1 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = -2 \cdot (-2) = 4$

پس با توجه به گزینه‌ها $k=-2$ و $D=4$ رابطه $D=-2k$ برقرار است.

۳۰۹. گزینه ۲ راه I $x=1$ قرار می‌دهیم و هر دو دترمینان را

$$D = \begin{vmatrix} 6 & 3x & 2x \\ 3x & 2x & 6 \\ 2x & 6 & 3x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 6 \\ 2 & 6 & 3 \end{vmatrix} = 6(3-4) - 3(9-12) + 2(18-12) = -6 + 9 + 12 = 15$$

ساروس $6(-3^2) - 3(-3) + 2(14) = -143$

$$D' = \begin{vmatrix} x^2 & x^2 & 6 \\ 9 & 2x & 9 \\ 3x & 4 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 9 & 2 & 9 \\ 3 & 4 & 4 \end{vmatrix} = 1(8-27) - 6(36-27) + 9(36-18) = -19 - 54 + 108 = 35$$

ساروس $1(-28) - (+9) + 6(30) = 143$

راه II

$$D = \begin{vmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 6 & 0 \end{vmatrix} = 6 \times \begin{vmatrix} 0 & 6 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} = 6 \times (-36) = -216$$

$$D' = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 9 & 0 & 9 \\ 0 & 4 & 4 \end{vmatrix} = 6 \times \begin{vmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 6 \times 36 = 216$$

و بنابراین رابطه $D' = -D$ برقرار است.

۳۱۰. گزینه ۲ $a=1$ قرار می‌دهیم:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-a & 1 \\ 1 & 1 & 1-a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1(0-1) - 1(0-1) + 1(0-1) = -1 + 1 - 1 = -1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 - 1 \times 0 = 1$$

و در بین گزینه‌ها $a^2 = 1^2 = 1$ قابل قبول است.

۳۱۱. گزینه ۱ عددهای $a=0$ ، $b=1$ و $c=2$ را جای‌گذاری می‌کنیم و

هر دو دترمینان را حساب می‌کنیم:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ bc & ac & ab \\ ac & ab & bc \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 1(0-0) - 2(2-0) + 0 = -4$$

$$D' = \begin{vmatrix} a+b & b & ab \\ b+c & c & bc \\ a+c & a & ac \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1(0-6) - 2(0-6) + 0 = 6$$

و بنابراین با توجه به گزینه‌ها رابطه $D' = -D$ برقرار است.

۳۱۲. گزینه ۱ فرض می‌کنیم $a=1$ و $b=-1$ داریم:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4(a+b) \\ 1 & a+1 & a^2(b+2) \\ 1 & b+1 & b^2(a+2) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 1(6-0) - 3(3-3) + 0 = 6$$

$$D' = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 2 \times 3 - 0 = 6$$

پس $6-6=0$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 2 \times 3 - 0 = 6$$

و تنها ۱ است که با جای‌گذاری $a=1$ و $b=-1$ به جواب صفر می‌رسد.

که با توجه به گزینه‌های مشابه و $k = -44$ و $D = 140$ رابطه $D = -4k - 36$ برقرار است.

۳۲۲. گزینه ۱ | با جای گذاری $a = 1$ داریم:

$$k_1 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 4 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 5 & 2 & 0 \end{vmatrix} = (2 \cdot 0 + 8 + 0) - (1 \cdot 0 + 0 + 12) = 6$$

$$k_2 = \begin{vmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 4 & 4 & 1 \\ 5 & 2 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} \text{سطر بر حسب} \\ \text{ستون سوم} \end{matrix} \times \begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} - 1 \times \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} + 1 \times \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 4 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \times (-12) - 1 \times (-9) + 0 = -3$$

که با توجه به $k_1 = 6$ و $k_2 = -3$ در گزینه‌ها رابطه $k_1 = -2k_2$ برقرار است.

۳۲۳. گزینه ۲ | با جای گذاری $a = b = 0$ داریم:

$$k = \begin{vmatrix} a & b & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} \text{سطر بر حسب} \\ \text{سطر اول} \end{matrix} \times 3 \times \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} + 0 = 3(2-1) = 3$$

$$D = \begin{vmatrix} a-2 & b+2 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & -3 \end{vmatrix} = -4 \cdot 8 - 6 - 6 = -8$$

که با توجه به مقادیر $k = 3$ و $D = -8$ یعنی رابطه $D = -k - 5$ برقرار است.

۳۲۴. گزینه ۱ | برای عددگذاری $a = b = 0$ و انتخاب می‌کنیم و داریم:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ a & b & 1 \\ 2 & 5 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} \text{سطر بر حسب} \\ \text{سطر دوم} \end{matrix} - 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = -1(5-4) = -1$$

$$D' = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 4 & 10 & 2 \\ a & b & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 4 & 10 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} \text{سطر بر حسب} \\ \text{سطر سوم} \end{matrix} - 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 10 \end{vmatrix} = -1 \times (10-8) = -2$$

که با توجه به مقادیر $D = -1$ و $D' = -2$ و گزینه‌ها، رابطه $D' = -2D - 4$ برقرار است.

۳۲۵. گزینه ۴ | عددگذاری $a = 0$ و $b = 2$ را در نظر می‌گیریم:

$$\Rightarrow A = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \end{vmatrix} \begin{matrix} \text{سطر بر حسب} \\ \text{ستون سوم} \end{matrix} \times 2 \times \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = 2(2) = 4$$

حالا دترمینان دوم را هم حساب می‌کنیم:

$$B = \begin{vmatrix} b-a & 1 & 0 \\ -b-1 & -1 & 2a \\ a-b & -1 & 2b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 0 \\ -2 & -1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} \text{سطر بر حسب} \\ \text{ستون اول} \end{matrix} \times 4 \times \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -1 \end{vmatrix} = 4(1) = 4$$

۳۱۸. گزینه ۲ | با عددگذاری $a = 0$ و $b = 1$ داریم:

$$k = \begin{vmatrix} a+b & 1 & 2 \\ a & b & 1 \\ 2a & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} \text{سطر بر حسب} \\ \text{سطر اول} \end{matrix} \times 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2$$

$$D = \begin{vmatrix} a+b & 1 & 2 \\ a-b & 0 & -3 \\ 2a & 2b & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} \text{سطر بر حسب} \\ \text{ستون اول} \end{matrix} \times 1 \times \begin{vmatrix} 0 & -3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + 0 =$$

$$= 1 \times (0+6) + 1 \times (2-4) = 4$$

و با توجه به گزینه‌ها و $k = -2$ و $D = 4$ رابطه $D = -2k$ صحیح است.

۳۱۹. گزینه ۳ | مقدار $a = 0$ را جای گذاری می‌کنیم و دترمینان‌ها را

حساب می‌کنیم:

$$k = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ a & 1 & 5 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} \text{سطر بر حسب} \\ \text{ستون اول} \end{matrix} \times 2 \times \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} + 1 \times \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= 2 \frac{(1-20)}{-19} + 1 \times \frac{(15-4)}{14} = -24$$

$$D = \begin{vmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 2a & 1 & 5 \\ 3 & 4 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \\ 3 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 4 \times \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} + 3 \times \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= 4 \frac{(1-20)}{-19} + 3 \frac{(15-4)}{14} = -24$$

که با توجه به گزینه‌ها رابطه $D = 2k + 14$ برقرار است.

۳۲۰. گزینه ۲ | عددگذاری $a = 1$ و $b = c = 0$ را انجام می‌دهیم:

$$k = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} \begin{matrix} \text{سطر بر حسب} \\ \text{سطر اول} \end{matrix} \times 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 1 \times (-1-2) = -3$$

$$D = \begin{vmatrix} 6 & 4 & -2 \\ 2a+1 & 2b & 2c \\ 4 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & 4 & -2 \\ 3 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} \text{سطر بر حسب} \\ \text{سطر دوم} \end{matrix} - 3 \times \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -3 \times (8+4) = -36$$

و با مقایسه $k = -3$ و $D = -36$ در گزینه‌ها رابطه $D = 12k - 12$ صحیح است.

۳۲۱. گزینه ۲ | با جای گذاری $a = 0$ داریم:

$$k = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 4 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \begin{matrix} \text{سطر بر حسب} \\ \text{سطر اول} \end{matrix} \times 2 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - 3 \times \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 2(-1) - 3(14) = -44$$

$$D = \begin{vmatrix} 6 & 4 & a+1 \\ 2 & 8 & 2 \\ 4 & -2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & 4 & 1 \\ 2 & 8 & 2 \\ 4 & -2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} \text{سطر بر حسب} \\ \text{سطر اول} \end{matrix} \times 6 \times \begin{vmatrix} 8 & 2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} - 4 \times \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} + 1 \times \begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 4 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= 6(28) - 4(-2) + (-36) = 140$$



۳۳۲. گزینه ۳ می‌دانیم $(A^{-1})^2 = (A^2)^{-1}$ و در نتیجه:

$$((A-I)^{-1})^2 = ((A-I)^2)^{-1} = (A^2 - 2A + I)^{-1}$$

و به جای A^2 ماتریس $2A - 2I$ می‌گذاریم:

$$\Rightarrow ((A-I)^{-1})^2 = (2A - 2I - 2A + I)^{-1} = (-I)^{-1} = -I$$

۳۳۳. گزینه ۲ ابتدا عبارت را از چپ در A^{-1} ضرب می‌کنیم:

$$\xrightarrow{\times A^{-1}} I + 2A^{-1}B = 3 \underbrace{A^{-1}A}_I B = 3B$$

و حالا از راست در B^{-1} ضرب می‌کنیم:

$$B^{-1} + 2A^{-1} \underbrace{BB^{-1}}_I = 3 \underbrace{BB^{-1}}_I \Rightarrow B^{-1} + 2A^{-1} = 3I$$

۳۳۴. گزینه ۳ دستگاه معادلات را تشکیل می‌دهیم:

$$\begin{cases} -y + 2(2) = -1 \Rightarrow y = 5 \\ y + 2x - 2 = 1 \end{cases}$$

و $y = 5$ را در معادله دوم جایگزین می‌کنیم و x را حساب می‌کنیم:

$$5 + 2x - 2 = 1 \Rightarrow 2x = -2 \Rightarrow x = -1$$

و در نهایت:

$$\Rightarrow x + y = -1 + 5 = 4$$

۳۳۵. گزینه ۳ می‌دانیم در ضرب ماتریس‌های 2×2 AB و BA ، دترمینان‌ها برابر و جمع درایه‌های قطر اصلی هم با هم برابر است:

$$\Rightarrow x + y = 1 + 2 = 3$$

۳۳۶. گزینه ۲ در گام اول داریم:

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{3}{|A^{-1}|} = \frac{3}{\frac{1}{3}} = 9$$

و در نتیجه:

$$\frac{3}{|A^{-1}|} |A| = |9A| = 9^2 \times |A| = 9^2 \times 3 = 3^6 \times 3 = 3^7$$

۳۳۷. گزینه ۲ در گام اول $|B|$ را از دو رابطه حساب می‌کنیم:

$$\begin{cases} |B| = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ -4 & |A| \end{vmatrix} = 5|A| + 4 \\ A^{-1}B = 3I \Rightarrow \frac{|A^{-1}B|}{|A|} = |3I| = 9 \Rightarrow |B| = 9|A| \end{cases}$$

در گام دوم این دو معادله را مساوی قرار می‌دهیم:

$$\Rightarrow 5|A| + 4 = 9|A| \Rightarrow 4|A| = 4 \Rightarrow |A| = 1$$

و در نتیجه $|A^2| = |A|^2 = 1^2 = 1$

۳۳۸. گزینه ۲ اگر $a = b = 0$ قرار دهیم از دترمینان اول $k = 0$ به دست می‌آید و تمام گزینه‌ها یکی می‌شود که مناسب نیست. پس $a = 1$ و $b = 0$ انتخاب می‌کنیم:

$$k = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{سطر دوم}]{\text{بسط برحسب}} -1 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} + 0 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -4$$

و همین‌طور با جای‌گذاری $a = 1$ و $b = 0$ دترمینان دوم را هم حساب می‌کنیم:

$$\Rightarrow D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -3 \\ 2 & 0 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{برحسب ستون دوم}]{\text{دترمینان}} -1 \times \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -8$$

حالا در گزینه‌ها $k = 4$ را جایگزین می‌کنیم و گزینه‌ای درست است که به ما -8 بدهد که جواب $-2k$ و 2 است.

حالا در گزینه‌ها $A = 4$ و $b = 2$ را جایگزین می‌کنیم و تنها 4 که به صورت $B = \frac{2}{b}A$ است، جواب مسئله است.

۳۲۶. گزینه ۱ با جای‌گذاری $a = 7$ و $b = c = 0$ داریم:

$$|A| = \begin{vmatrix} 12 & 0 & 0 \\ 7 & 5 & 0 \\ 7 & 0 & 5 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{پایین‌مثنی}} 12 \times 5 \times 5 = 12 \times 5^2$$

حالا داریم:

$$|\Delta A_{3 \times 3}^{-1}| = \Delta^3 |A^{-1}| = \Delta^3 \times \frac{1}{|A|} = \frac{5^3}{12 \times 5^2} = \frac{5}{12}$$

۳۲۷. گزینه ۳ مجموع تمام داده‌ها برابر $2(a+b+c+x) = 6$ است و در نتیجه:

حالا برای راحتی کار $b = c = 0$ در نظر می‌گیریم و داریم:

$$|A| = \begin{vmatrix} a+x & a & a \\ b & b+x & b \\ c & c & c+x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+x & a & a \\ 0 & x & 0 \\ 0 & 0 & x \end{vmatrix}$$

۲ x^2 بالامثنی $\Rightarrow 2x^2 = 8 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$

۳۲۸. گزینه ۱ مرتبه ماتریس $n \times n$ است. پس ماتریس n ستون دارد و منظور از درایه سطر اول و ستون آخر، a_{1n} است. بنابراین داریم:

$$a_{1n} = 1 + n - 1 = n, a_{23} = 2 + 3 - 1 = 4$$

در نتیجه:

$$\frac{a_{1n}}{a_{23}} = 2 \Rightarrow \frac{n}{4} = 2 \Rightarrow n = 8$$

یعنی مرتبه ماتریس 8×8 است و مسئله از ما a_{82} را خواسته که کافی است در فرمول درایه عمومی جای‌گذاری کنیم:

۳۲۹. گزینه ۳ ضرب دو ماتریس را می‌نویسیم:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{3a}{2} \\ 0 & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & a \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & \frac{b}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

و داریم:

$$\Rightarrow a = 0, \frac{b}{2} = 1 \Rightarrow b = 2 \Rightarrow a + b = 2$$

۳۳۰. گزینه ۴ در گام اول، ماتریس A را با نوشتن اعضا مشخص می‌کنیم:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{می‌رسانیم.}]{\text{به توان ۲}} A^2 = \begin{bmatrix} 9 & 8 & 8 \\ 8 & 9 & 8 \\ 8 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

و در نتیجه:

$$A^2 - 4A = \begin{bmatrix} 9 & 8 & 8 \\ 8 & 9 & 8 \\ 8 & 8 & 9 \end{bmatrix} - 4 \times \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A^2 - 4A = 5I$$

۳۳۱. گزینه ۳ در هر سطر یا ستون ماتریس اسکالر، فقط یک عدد روی قطر اصلی داریم و چون در مسئله این عدد را ۳ داده است، پس ماتریس به صورت

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

همان ماتریس $3I$ است. حالا ماتریس A^2 همان $27I$

است که دوباره در هر سطر یا هر ستون فقط یک عدد ۲۷ دارد و جمع درایه‌های

ستون دوم A^3 هم ۲۷ می‌شود:

$$A^3 = \begin{bmatrix} 27 & 0 & 0 \\ 0 & 27 & 0 \\ 0 & 0 & 27 \end{bmatrix}$$