


درس‌نامه + پرسش‌های چهارگزینه‌ای + پاسخ‌های کاملاً تشریحی

فیزیک تجربی

(دهم) ویراست سوم

سیروس یعقوبی، رضا خالو، امیرعلی میری



انتشارات
انگه

۲۰۳ پرسش‌گزینه‌ای | ۱۲۸۵ پرسش‌گزینه‌ای | ۶ آزمون فصل به فصل و جامع در پایان درس‌نامه‌ها

مجموعه کتاب‌های پایه دهم نشر الگو ویژه رشته تجربی:

- فیزیک ۱ دهم تجربی (تمام)
- فیزیک ۱ دهم تجربی (تست و سه‌بعدی)
- ریاضی ۱ دهم (تست و سه‌بعدی)
- جامع زیست‌شناسی ۱ دهم
- جامع فیزیک پایه تجربی
- جمع‌بندی شیمی دهم
- شیمی ۱ دهم (تست)

- فصل صفر برای تقویت محاسبات ریاضی
- درس‌نامه‌ای منطبق با کتاب درسی فیزیک پایه دهم
- ۲۰۳ پرسش چهارگزینه‌ای در درس‌نامه‌ها
- ۱۲۸۵ پرسش چهارگزینه‌ای منطبق با کتاب درسی با چپ‌نشین آموزشی در پایان درس‌نامه‌ها
- پرسش‌های چهارگزینه‌ای تألیفی به همراه سوالات کنکور سال‌های اخیر
- پرسش‌های چهارگزینه‌ای سطح دوم برای دانش‌آموزان علاقه‌مند
- ۶ آزمون برای مرور مطالب و سنجش توانایی و مهارت
- پاسخ‌های کاملاً تشریحی با ارائه خط فکری برای حل مسائل



شما می‌توانید سوالات خود را از طریق کانال تلگرام فیزیک الگو به آدرس زیر با انتشارات در میان بگذارید:
https://t.me/physics_olgoo

انتشارات الگو
www.olgoobooks.ir



به نام خدا

دوستان عزیز

سلام


ورود به سال دهم، همزمان با آغاز دوره متوسطه دوم است. در این دوره شما برای ورود به دانشگاه آماده می‌شوید، بنابراین در مقایسه با دوره‌های قبل، باید تلاش بیشتری همراه با برنامه‌ریزی دقیق داشته باشید. در متوسطه دوم کتاب علوم به کتاب‌های جداگانه فیزیک و شیمی (و زیست‌شناسی برای رشته تجربی) تفکیک می‌شود. اهمیت درس فیزیک در هر دو رشته ریاضی و تجربی بر کسی پوشیده نیست.

شما باید توجه داشته باشید که مطالعه دقیق کتاب درسی آموزش و پرورش مهم و ضروری است. کتاب درسی شامل نکات فراوانی است که ممکن است عمق آن‌ها از دید شما پنهان بماند یا در مطالعه متوجه نشوید تست‌های کنکور از کدام قسمت و به چه صورت مطرح می‌شوند.


هدف ما این است که عمق موضوعات کتاب درسی را تشخیص داده و متناسب با آن با طرح تست‌های کافی به همراه تست‌های کنکور و آزمون‌های آزمایشی، توانایی علمی شما را به بالاترین سطح ممکن و مورد نیاز برسانیم. در این مسیر شما نیاز دارید که محاسبات ریاضی خود را تقویت کرده و از اشتباهات متداول دوری کنید برای این منظور در ابتدای کتاب **فصل صفر** را قرار داده‌ایم تا به شما برای محاسبات درست یاری برساند.

حال ۱۰ ویژگی اصلی این کتاب را با هم مرور می‌کنیم:

- ۱ هر فصل به چند بخش تقسیم شده است.
- ۲ هر بخش شامل درسنامه‌ای به همراه تست‌های آموزشی است. در درسنامه نیز بعد از هر تیپ سؤال، شماره‌های تست‌های مشابه با آن از بخش تست‌های آموزشی ذکر شده است تا با استفاده از آن‌ها تسلط کامل نسبت به آن تیپ سؤال پیدا کنید.
- ۳ تست‌های آموزشی بعد از درسنامه از ساده به دشوار چیده شده‌اند، که در این تست‌ها علاوه بر تست‌های تألیفی، تست‌هایی از کنکورهای سال‌های گذشته و آزمون‌های آزمایشی معتبر که متناسب با مطالب جدید کتاب درسی هستند، قرار گرفته است.

۴ در بخش تست‌های آموزشی برای برخی از تست‌ها که لازم دیده‌ایم تست‌های مشابهی در پاسخ گذاشته‌ایم تا اگر شما در این بخش نتوانستید تست موردنظر را حل کنید، بعد از خواندن پاسخ و فهم تست، تست شبیه به آن را خودتان حل کنید. همچنین برای اینکه متوجه شوید که تست، شامل یک تست مشابه در پاسخ است، علامت  در کنار شماره تست قرار گرفته است. ۵ در پاسخ تست‌های مهم، بخشی به نام خط فکری قرار داده شده است، که به نوعی استراتژی حل تست و ایده‌های مهم تست در آن بیان شده است. بهتر است که اگر نتوانستید این تست‌ها را حل کنید ابتدا خط فکری آن را بخوانید، سپس خودتان باقی حل را انجام دهید.

۶ در پاسخ تست‌ها، سطح هر تست را مشخص کرده‌ایم؛ A تست‌های ساده، B تست‌های متوسط و C تست‌های دشوار را مشخص می‌کنند.

۷ برای مرور سریع فصل تست‌هایی را مشخص کرده‌ایم که با علامت  مشخص شده‌اند.

۸ برای هر بخش نیز تست‌های نسبتاً دشوار را که برای تفهیم بهتر مطالب به شما کمک می‌کنند به عنوان تست‌های سطح دوم قرار داده‌ایم. اگر تست‌های بخش آموزشی را حل کردید و دنبال تست‌های سخت‌تر هستید این تست‌ها را حل کنید. (البته بهتر است قبل از حل، از دبیر خود برای حل این بخش مشورت بگیرید.)

۹ در پایان هر فصل آزمون تستی آورده‌ایم که می‌توانید با حل آن‌ها ضمن مرور مطالب، توانایی و مهارت خود را بسنجید. در پاسخ تست‌های آزمون، شماره تست‌های مشابه با آن تست را قرار داده‌ایم تا بعد از تصحیح آزمون، برای تحلیل آن به شما کمک کنند.

۱۰ در آخر کتاب هم دو آزمون برگرفته از کنکور سراسری ۱۴۰۲ (نوبت اول) و آزمون‌های آزمایشی معتبر قرار داده‌ایم.

در پایان لازم است از تلاش صمیمانه کارکنان نشر الگو سپاسگزاری کنیم، در واحد ویرایش خانم زهره نوری و آقای محسن شعبان‌شمیرانی، همچنین از خانم خندان که ویرایش کتاب بی‌یاری ایشان امکان‌پذیر نبود. در واحد حروفچینی و صفحه‌آرایی از خانم‌ها راضیه صالحی و فاضله محسنی برای صفحه‌آرایی کتاب و از سرکار خانم سکینه مختار مسئول واحد ویراستاری و حروفچینی قدردانی می‌کنیم.

فهرست

- پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش پنجم ۹۶
- بخش ششم: فشارسنج شاره‌ها (مانومتر) ۱۰۲
- پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش ششم ۱۰۶
- بخش هفتم: شناوری ۱۱۲
- پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش هفتم ۱۱۴
- بخش هشتم: شاره در حرکت و اصل برنولی ۱۱۹
- پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش هشتم ۱۲۳
- آزمون ۱۲۹
- پاسخ آزمون ۱۳۲

فصل سوم: کار، انرژی و توان

- بخش اول: انرژی جنبشی ۱۳۶
- پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش اول ۱۳۹
- بخش دوم: کار نیروی ثابت ۱۴۳
- پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش دوم ۱۴۹
- بخش سوم: کار و انرژی جنبشی ۱۵۵
- پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش سوم ۱۵۸
- بخش چهارم: کار و انرژی پتانسیل - پایستگی انرژی مکانیکی ۱۶۵
- پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش چهارم ۱۷۱
- بخش پنجم: کار و انرژی درونی ۱۸۱
- پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش پنجم ۱۸۵
- بخش ششم: توان و بازده ۱۹۳
- پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش ششم ۱۹۶
- آزمون ۲۰۰
- پاسخ آزمون ۲۰۲

فصل صفر

- فصل صفر ۲

فصل اول: فیزیک و اندازه‌گیری

- بخش اول: فیزیک، دانش بنیادی ۱۰
- پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش اول ۱۳
- بخش دوم: تبدیل یکاها - نمادگذاری علمی - سازگاری یکاها ۱۶
- پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش دوم ۲۱
- بخش سوم: اندازه‌گیری و دقت وسیله‌های اندازه‌گیری ۲۶
- پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش سوم ۲۸
- بخش چهارم: چگالی ۳۱
- پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش چهارم ۳۸
- آزمون ۴۵
- پاسخ آزمون ۴۷

فصل دوم: ویژگی‌های فیزیکی مواد

- بخش اول: بررسی حالت‌های ماده و نیروهای بین‌مولکولی ۵۰
- پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش اول ۵۴
- بخش دوم: فشار جامدها ۵۹
- پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش دوم ۶۰
- بخش سوم: فشار در شاره‌ها و مفاهیم اولیه ۶۲
- پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش سوم ۷۰
- بخش چهارم: خط تراز - لوله‌های U شکل ۸۱
- پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش چهارم ۸۵
- بخش پنجم: فشار هوا - فشارسنج‌ها ۹۲

فصل چهارم: دما و گرما

- بخش اول: دما و دماسنجی ۲۰۶
- پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش اول ۲۰۹
- بخش دوم: انبساط گرمایی ۲۱۳
- پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش دوم ۲۲۱
- بخش سوم: گرما - تعادل گرمایی ۲۳۲
- پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش سوم ۲۳۸
- بخش چهارم: تغییر حالت‌های ماده ۲۴۷
- پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش چهارم ۲۵۵
- بخش پنجم: روش‌های انتقال گرما ۲۶۶
- پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش پنجم ۲۶۷
- آزمون ۲۷۱
- پاسخ آزمون ۲۷۳

آزمون جامع


- آزمون جامع ۱ ۲۷۵
- آزمون جامع ۲ ۲۷۷
- پاسخ آزمون جامع ۱ ۲۸۰
- پاسخ آزمون جامع ۲ ۲۸۳

فصل پنجم: پاسخ‌های تشریحی

- پاسخ‌های تشریحی فصل اول ۲۸۸
- پاسخ‌های تشریحی فصل دوم ۳۱۳
- پاسخ‌های تشریحی فصل سوم ۳۶۴
- پاسخ‌های تشریحی فصل چهارم ۴۱۷

بخش چهارم: خط تراز - لوله‌های U شکل

یکی از متداول‌ترین سؤال‌های این فصل سؤال‌های مربوط به لوله U شکل است که برای حل نوع این سؤال‌ها ابتدا باید مفهوم نقاط هم‌تراز یا هم‌فشار را بررسی کنیم:




اگر دو نقطه در یک مایع و در یک ارتفاع از کف طرف قرار داشته باشند، این دو نقطه در یک تراز قرار داشته و هم‌فشارند:

$$P_A = P_B \rightarrow \text{در یک مایع و در یک ارتفاع از کف طرف}$$

$$P_C = P_D \rightarrow \text{در یک مایع و در یک ارتفاع از کف طرف}$$

$$P_E \neq P_F \rightarrow \text{در یک ارتفاع از کف اما در دو مایع مختلف}$$

برای حل مسائل لوله‌های U شکل ابتدا خط تراز را رسم می‌کنیم. خط تراز، خطی است که از محل جدایی دو مایع به طور افقی رسم می‌شود. در واقع این خط بالاترین جایی است که فشار یکسان است.



به‌طور مثال: خط تراز در شکل روبه‌رو خط گذرنده از نقاط M و N است:

$$P_M = P_N \rightarrow \text{فشار بالای نقطه M، مجموع فشار هوا و فشار ستون } h_1 \text{ مایع ۱ است:}$$

$$P_M = P_0 + \rho_1 g h_1$$

$$P_N = P_0 + \rho_2 g h_2 \rightarrow \text{فشار بالای نقطه N، مجموع فشار هوا و فشار ستون } h_2 \text{ مایع ۲ است:}$$

بنابراین می‌توان گفت:

$$P_M = P_N \Rightarrow P_0 + \rho_1 g h_1 = P_0 + \rho_2 g h_2 \Rightarrow \rho_1 h_1 = \rho_2 h_2 \xrightarrow{h_1 > h_2} \rho_2 > \rho_1$$

۱ نتیجه مایعی که ته‌نشین شده است دارای چگالی بیشتری است.

۲ در لوله‌های U شکل معمولاً نیازی به نوشتن P_0 نیست زیرا از طرفین حذف می‌شود.

تست ۵۸

در شکل روبه‌رو، سه مایع مخلوط‌نشده در یک لوله U شکل در تعادل قرار دارند. ارتفاع h را به دست آورید.

۱) ۱۵

۲) ۱۵

۳) ۳۰

۴) ۳


پاسخ ۱) ابتدا خط تراز را در دو لوله می‌کشیم. برای کشیدن خط تراز مایع مشترک بین دو لوله با کمترین ارتفاع را مشخص می‌کنیم و از آن خطی افقی می‌کشیم. ۲) فشار نقاط A و B واقع بر خط تراز با هم برابرند:

$$P_A = P_B$$

$$P_0 + \rho_1 g h_1 + \rho_2 g h_2 = \rho_3 g h_3 + P_0 \Rightarrow \rho_1 h_1 + \rho_2 h_2 = \rho_3 h_3$$

$$\Rightarrow 2000 \times h_1 + 3000 \times \frac{1}{100} = 2250 \times \frac{4}{100}$$

$$\Rightarrow 2 \times 10^3 \times h_1 + 3 \times 10^2 = 9 \times 10^2 \Rightarrow 2 \times 10^3 \times h_1 = 6 \times 10^2 \Rightarrow h_1 = \frac{6}{2} \times 10^{-1} = 3 \text{ cm}$$




گزینه ۳

راستی می‌شه گفت که در لوله‌های U شکل مجموع ph بالای خط تراز در دو شاقه با هم برابر است. (مثال بالا):

$$\underbrace{\rho_1 h_1 + \rho_2 h_2}_{\text{شاقه سمت چپ}} = \underbrace{\rho_3 h_3}_{\text{شاقه سمت راست}}$$

تست ۵۹



در شکل روبه‌رو، سه مایع مخلوط‌نشدنی در یک لوله U شکل در تعادل قرار دارند. چگالی ρ_2 چند

گرم بر سانتی‌متر مکعب است؟

- (۱) ۱/۲۵
- (۲) ۲/۲۵
- (۳) ۲۲۵۰
- (۴) ۲۲۵۰/۴


همان‌گونه که بیان شد ابتدا یک خط فرضی افقی از محل اولین جدایی دو مایع رسم می‌کنیم.

فشار نقاط A و B واقع بر خط تراز با هم برابر بوده، از این رو:

$$P_A = P_B \Rightarrow \rho_2 h_2 + \rho_1 h_1 = \rho_1 h_1$$

$$3 \times 10 + 2 \times 30 = \rho_2 \times 40 \Rightarrow \rho_2 = 2/25 \text{ g/cm}^3$$

گزینه ۲




هرگاه درون یک ظرف مقداری مایع باشد و روی مایع یک پیستون بدون اصطکاک به جرم M

قرار داده شود، فشار وارد بر هر نقطه درون مایع مجموع فشار هوا (P_0)، فشار پیستون $\frac{W}{A}$ و

$$P_A = P_0 + \frac{Mg}{A} + \rho gh$$

فشار مایع بالای آن نقطه است.

تست ۶۰



در شکل روبه‌رو آب با چگالی 1 g/cm^3 و روغن با چگالی 0.8 g/cm^3 ریخته شده و یک

پیستون بدون اصطکاک به جرم 200 g در شاخه سمت چپ بر سطح آب قرار دارد. جرم روغن در

شاخه سمت راست چند گرم است؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$)

- (۱) ۸۴
- (۲) ۵۲
- (۳) ۷۲
- (۴) ۲۱۲

۱) فشار نقاط واقع بر خط تراز برابر است با:

$$P_M = P_N \Rightarrow P_0 + \frac{mg}{A} + \rho_W gh_W = P_0 + \rho_O gh_O$$

$$\frac{0.8 \times 10}{4 \times 10^{-4}} + 1000 \times 10 \times \frac{3}{100} = 1000 \times 10 \times h_O \Rightarrow 5000 + 3000 = 10000 h_O \Rightarrow h_O = \frac{8000}{10000} = \frac{8}{10} \text{ m}$$

۲) حجم روغن را حساب می‌کنیم:

$$V_O = Ah_O = 4 \times 10^{-4} \times \frac{8}{10} = \frac{53 \times 10^{-4}}{20} \text{ m}^3$$

$$V_O = \frac{53 \times 10^{-4}}{20} \times 10^6 \text{ cm}^3 \Rightarrow V_O = \frac{530}{2} \text{ cm}^3$$

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m_O = \rho V \Rightarrow m_O = 0.8 \times \frac{530}{2} \Rightarrow m_O = 212 \text{ g}$$

۳) جرم روغن را به دست می‌آوریم.

اما این مسئله راه‌حل ساده‌تری برای رسیدن به جرم روغن (m_O) دارد. کافی است از همان ابتدا فشار ستون روغن در سمت راست را از تعریف اصلی


$$\text{فشار روغن} = P = \frac{F}{A} = \frac{W}{A}$$

$$P_M = P_N \Rightarrow P_0 + \frac{mg}{A} + \rho_W gh_W = P_0 + \frac{m_O g}{A}$$

$$\frac{m_{\text{پیستون}}}{A} + \rho_W h_W = \frac{m_O}{A} \Rightarrow \frac{0.2}{4 \times 10^{-4}} + 1000 \times \frac{3}{100} = \frac{m_O}{4 \times 10^{-4}} \Rightarrow 5000 + 3000 = \frac{m_O}{4 \times 10^{-4}} \Rightarrow m_O = 2120 \times 10^{-4} \text{ kg} = 212 \text{ g}$$

گزینه ۴

تست ۶۱




در شکل روبه‌رو، دو مایع در حال تعادل‌اند. h چند سانتی‌متر است؟
 $(\rho_{Hg} = 13/6 \text{ g/cm}^3, \rho_W = 1 \text{ g/cm}^3, g = 10 \text{ N/kg})$

۷/۵ (۱)

۴/۵ (۲)

۳/۷۵ (۳)

۶/۲۵ (۴)



پاسخ یادآوری: در رابطه فشار در یک مایع $P = \rho gh$ ، h ارتفاع قائم ستون مایع است.
 (۱) ستون قائم آب تا خط تراز را حساب می‌کنیم:

$$\sin 30^\circ = \frac{h_w}{102} \Rightarrow h_w = 102 \times \frac{1}{2} = 51 \text{ cm}$$

(۲) فشار در نقاط M و N را برابر قرار می‌دهیم.


$$P_M = P_N \Rightarrow \rho_{Hg} h = \rho_W h_w \Rightarrow 13/6 \times h = 1 \times 51 \Rightarrow h = 3/75 \text{ cm}$$

گزینه ۳

حالا برو تست‌های ۳۰۵ تا ۳۱۳ رو بزن.

نکته ۱

در لوله U شکل همواره مایع ته‌نشین شده، مایع با چگالی بیشتر است.




هرگاه در لوله U شکلی دو مایع مخلوط‌نشده ریخته شود، ارتفاع مایع با چگالی کمتر از ارتفاع مایع با چگالی بیشتر، بزرگ‌تر است.

$$\rho_2 > \rho_1$$

$$h_2 < h_1$$

تست ۶۲



با توجه به شکل روبه‌رو کدام گزینه در مورد مقایسه چگالی دو مایع ρ_B و ρ_A و فشار نقطه‌های A و B درست است؟


$P_A > P_B, \rho_A > \rho_B$ (۱)

$P_A < P_B, \rho_A < \rho_B$ (۲)

$P_A < P_B, \rho_A > \rho_B$ (۳)

$P_A > P_B, \rho_A < \rho_B$ (۴)

پاسخ دقت کنید نقاط A و B در یک مایع قرار ندارند یعنی این نقاط روی یک خط تراز قرار نمی‌گیرند و در این شکل فشار آن‌ها یکی نیست. خط تراز را رسم می‌کنیم. فشار در نقاط C و D یکسان است. از این‌رو:



$$P_C = P_D \Rightarrow \rho_A h_A = \rho_B h_B \xrightarrow{h_A > h_B} \rho_B > \rho_A$$

برای بررسی و مقایسه فشار در نقطه A و B از نقطه C و D بالا می‌رویم تا به نقطه A و B برسیم، در این صورت فشار در نقطه A و B خواهد شد:

$$\begin{cases} P_A = P_C - \rho_A gh \\ P_B = P_D - \rho_B gh \end{cases} \xrightarrow{\rho_B > \rho_A} P_A > P_B$$

گزینه ۴


راستی می‌شه گفت در لوله‌های U شکل که دو مایع مخلوط‌نشده درون آن ریخته شده در نقاطی مانند A و B که در یک سطح درون دو مایع قرار دارن، فشار نقطه‌ای بیشتره که چگالیش کمتره اما مایع بالای سرش بیشتره.

حالا برو تست‌های ۳۱۴ تا ۳۲۲ رو بزن.

نکته ۱ در لوله های U شکل هر گاه بخواهیم در یک شاخه مایع اضافه کنیم باید به این نکته دقت کنیم که حجم مایع جابه جا شده در یک شاخه با حجم مایع جابه جا شده در شاخه دیگر برابر است.


نکته ۲ به شکل های زیر دقت کنید:

سطح مقطع یکسان




$$V_1 = V_2 \Rightarrow A_1 h_1 = A_2 h_2 \xrightarrow{A_1 = A_2} h_1 = h_2$$

سطح مقطع متفاوت



$$V_1 = V_2 \Rightarrow A_1 h_1 = A_2 h_2 \xrightarrow{A_2 = nA_1} h_2 = \frac{1}{n} h_1 \text{ یا } h_1 = n h_2$$



در لوله U شکل روبه رو که سطح مقطع دو شاخه یکسان است آب قرار دارد. اگر در شاخه سمت چپ به ارتفاع ۶cm روغن بریزیم، آب در شاخه سمت راست چند سانتی متر نسبت به حالت قبل بالا می آید؟

$$(\rho_W = 1000 \text{ kg/m}^3, \rho_O = 800 \text{ kg/m}^3)$$

۰/۰۴۸ (۴)


۰/۰۲۴ (۳)

۴/۸ (۲)

۲/۴ (۱)

پاسخ (۱) لوله U شکلی مشابه لوله U شکل سؤال، کنار آن می کشیم و مایع اضافه شده را در لوله جدید مشخص می کنیم.

(۲) با اضافه شدن روغن به شاخه سمت چپ، آب در این شاخه به اندازه X پایین می آید و همان مقدار آب، در شاخه سمت راست به ارتفاع X' بالا می رود. (۳) چون سطح مقطع شاخه ها یکسان است پس همان مقدار آبی که در شاخه سمت چپ پایین می آید در شاخه سمت راست بالا خواهد رفت. (X = X')



$$\Delta V \text{ آب بالا رفته در شاخه سمت راست} = \Delta V \text{ آب پایین آمده در شاخه سمت چپ}$$


$$\xrightarrow{\text{سطح مقطع ها یکسان است}} h \text{ بالا رفته} = h \text{ پایین آمده} = x$$

(۴) حال خط تراز را در حالت جدید در لوله U شکل می کشیم و فشار در نقاط A و B را برابر قرار می دهیم. ارتفاع روغن در بالای نقطه A برابر h0 و ارتفاع آب در بالای نقطه B برابر ۲x است.

$$P_A = P_B \Rightarrow \rho_O h_0 = \rho_W \times 2x \Rightarrow 800 \times \frac{6}{100} = 1000 \times 2x \Rightarrow x = \frac{24}{1000} \text{ m} = 2/4 \text{ cm}$$

از این رو خواهیم داشت:

گزینه ۱



در شکل روبه رو مساحت سطح مقطع شاخه سمت چپ دو برابر مساحت سطح مقطع شاخه سمت راست است. اگر در شاخه سمت چپ ۱۵۰g روغن بریزیم، سطح آب شاخه سمت راست نسبت به حالت ابتدایی چند سانتی متر پایین می رود؟ (g = ۱۰ N/kg, ρ آب = ۱۰۰۰ kg/m³)

۶ (۴)

۷/۵ (۳)

۲/۵ (۲)

۵ (۱)

پاسخ (۱) با ریختن روغن در شاخه سمت چپ آب در سمت راست به همان حجم بالا می رود.

$$\Delta V_1 = \Delta V_2 \Rightarrow A_1 x_1 = A_2 x_2 \Rightarrow 10 x_1 = 20 x_2 \Rightarrow x_1 = 2 x_2 \quad (I)$$


(۲) خط تراز را رسم می کنیم. فشار نقاط M و N واقع بر خط تراز برابر است.

فشار در نقطه M مجموع فشار هوا P0 و فشار روغن W روغن / A2 است و فشار در نقطه N مجموع فشار هوا و فشار ستون آب (hW = x1 + x2) است. بنابراین می توانیم بنویسیم.

$$P_M = P_N \Rightarrow P_0 + \frac{W \text{ روغن}}{A_2} = P_0 + \rho g(x_1 + x_2) \xrightarrow{(I)} \frac{0/15 \times 10}{20 \times 10^{-4}} = 1000 \times 10(3x_2) \Rightarrow x_2 = 0/025 \text{ m} = 2/5 \text{ cm}$$

گزینه ۲

تست ۶۵



در شکل زیر ارتفاع آب در شاخه A برابر $40/5 \text{ cm}$ است. در شاخه B الکل می‌ریزیم تا سطح جیوه در دو شاخه یکسان شود. سطح جیوه نسبت به حالت اول چند سانتی‌متر جابه‌جا می‌شود؟

$$(\rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3, \rho_{\text{جیوه}} = 13/5 \text{ g/cm}^3)$$

۵ (۲)

۱/۵ (۱)

۲/۵ (۴)

۳ (۳)


پاسخ (۱) ارتفاع جیوه را از خط تراز اولیه به دست می‌آوریم.

$$P_M = P_N \Rightarrow \rho_W h_W = \rho_{\text{Hg}} h_{\text{Hg}} \Rightarrow 1 \times 40/5 = 13/5 h_{\text{Hg}}$$

$$\Rightarrow h_{\text{Hg}} = 3 \text{ cm}$$

(۲) برای اینکه سطح جیوه در دو طرف یکسان شود کافی است از سمت راست

جیوه $3/2 = 1/5 \text{ cm}$ پایین رفته و از سمت چپ به اندازه $1/5 \text{ cm}$ بالا برود.




گزینه ۱

نکته اگر بین شاخه‌های سمت راست و چپ لوله یک شیر قرار داشته باشد با باز شدن شیر:

۱ مایع با چگالی بیشتر ته‌نشین می‌شود. ۲ حجم مایع پایین آمده از یک سمت با حجم مایع بالا رفته در سمت دیگر برابر است.

تست ۶۶



در شکل روبه‌رو، قطر قاعده دو استوانه با هم برابر و قطر لوله رابط ناچیز است. اگر شیر ارتباط را باز کنیم، سطح

$$\text{مایع A چند سانتی‌متر پایین می‌آید؟ } (\rho_A = 2\rho_B)$$

۱۰ (۲)

۵ (۱)

۱۲ (۴)

۱۵ (۳)

پاسخ (۱) لوله U شکل مشابهی کنار شکل سؤال می‌کشیم تا تغییرات را روی آن

نشان دهیم.

(۲) با باز شدن شیر، مایع A که چگالی بیشتری دارد پایین آمده و زیر مایع B قرار می‌گیرد.

(۳) همان قدری که مایع A در سمت چپ پایین می‌آید همان قدر مایع B در شاخه سمت راست بالا می‌رود.


(۴) سطح هم‌تراز در مرز دو مایع را در حالت جدید رسم می‌کنیم. اکنون می‌توان نوشت:

$$P_N = P_M \Rightarrow \rho_A g(20 - 2x) = \rho_B g(20) \Rightarrow 2\rho_B(20 - 2x) = \rho_B(20) \Rightarrow 2(20 - 2x) = 20 \Rightarrow 20 - 2x = 10 \Rightarrow x = 5 \text{ cm}$$

گزینه ۱

حالا برو تست‌های ۳۲۳ تا ۳۳۹ رو بزن.

بخش چهارم: خط تراز - لوله‌های U شکل



۳۰۵ - در این لوله دو مایع مخلوط‌نشده ریخته شده است و چگالی آن‌ها به ترتیب ρ_1 و ρ_2 است. اگر

کنکور دهه‌های گذشته

$\rho_1 = 2 \text{ g/cm}^3$ باشد، ρ_2 چند گرم بر سانتی‌متر مکعب است؟


۱/۶ (۲)

۱/۲ (۱)

۲/۵ (۴)

۱/۸ (۳)






۳۰۶ - در شکل مقابل، سه مایع مخلوطنشده و در حال تعادل هستند. اگر $\rho_1 = 1/24 \text{ g/cm}^3$ و

$\rho_2 = 1 \text{ g/cm}^3$ باشد، ρ_3 چند واحد SI است؟

- (۱) ۷۰۰
(۲) ۷
(۳) ۱/۲
(۴) ۱۲۰۰




۳۰۷ - در شکل روبه‌رو چگالی مایع $\rho_1 = 1/6 \text{ g/cm}^3$ و چگالی مایع $\rho_2 = 2/4 \text{ g/cm}^3$ است.

اختلاف سطح آزاد مایع‌ها در دو شاخه (x) چند سانتی‌متر است؟

کنکور دهه‌های گذشته

- (۱) ۴
(۲) ۸
(۳) ۶
(۴) ۳



۳۰۸ - در شکل زیر، سه مایع مخلوطنشده به چگالی‌های $\rho_1 = 10/8 \text{ g/cm}^3$ ، $\rho_2 = 2/4 \text{ g/cm}^3$ و


مایع سوم با چگالی ρ_3 به حالت تعادل قرار دارند. اگر سطح مقطع لوله 2 cm^2 باشد، جرم مایع

سوم چند گرم است؟

خارج تجربی - ۱۴۰۰

- (۱) ۵۶
(۲) ۴۸
(۳) ۴۲
(۴) ۲۵


در تست‌های زیر شافه‌های لوله مایل هستند.



۳۰۹ - در شکل مقابل مایع‌ها مخلوط نشده و در حال تعادل‌اند. اگر $\rho_1 = 4 \text{ g/cm}^3$ باشد، ρ_2

چند گرم بر سانتی‌متر مکعب است؟


- (۱) ۶/۴
(۲) ۲
(۳) ۸
(۴) $2\sqrt{3}$



۳۱۰ - در شکل روبه‌رو چگالی ρ_1 ، $1/5$ برابر چگالی ρ_2 است. نسبت l_1/l_2 کدام است؟

- (۱) ۳/۴
(۲) ۴/۳
(۳) ۲/۳
(۴) ۳/۲

در تست‌های زیر در یک شافه یا در هر دو شافه پیستون قرار داده شده است.



۳۱۱ - در شکل مقابل ارتفاع مایع در هر دو طرف یکسان است و پیستون‌های (۱) و (۲) بدون

اصطکاک‌اند. اگر روی هر دو پیستون وزنه‌ای به جرم m قرار دهیم بعد از برقراری تعادل:


خارج ریاضی - ۹۳

(۱) ارتفاع مایع در دو لوله یکسان می‌ماند.

(۲) ارتفاع مایع در لوله (۲) بیشتر خواهد شد.

(۳) ارتفاع مایع در لوله (۱) بیشتر خواهد شد.

(۴) بسته به چگالی مایع هر یک از گزینه‌های (۲) و (۳) ممکن است درست باشد.




۳۱۲ - در شکل زیر، روی پیستون سبک و بدون اصطکاک جسمی به جرم $1/2 \text{ kg}$ قرار گرفته است

و مساحت سطح مقطع آن 60 cm^2 است. ارتفاع آب درون لوله (H) چند cm است؟

آزمون مدارس برتر

($\rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3$, $g = 10 \text{ N/kg}$)


- (۱) ۲۰
(۲) ۳۰
(۳) ۴۰
(۴) ۵۰



۳۱۳- در شکل روبه‌رو مساحت سطح پیستون بزرگ و کوچک به ترتیب ۴۰۰ و ۸۰ سانتی‌متر مربع است. اگر چگالی مایع $\rho = 0.8 \text{ g/cm}^3$ باشد، نیروی F تقریباً چند نیوتون باشد تا پیستون‌ها را مطابق وضعیت نشان داده شده در شکل نگه دارد؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$ و جرم پیستون کوچک ناچیز فرض شود.)

- ۲۴۰ (۱)
- ۲۰۰ (۲)
- ۱۶۰ (۳)
- ۱۸۰ (۴)


در تست‌های زیر به مقایسه فشار در دو نقطه لوله U شکل و چگالی مایع‌های درون آن می‌پردازیم.



۳۱۴- در شکل مقابل دو مایع مخلوط‌نشده با چگالی‌های ρ_1 و ρ_2 در طرف قرار دارند، اگر فشار در نقاط نشان داده شده P_A ، P_B و P_C باشد، کدام رابطه درست است؟


[کنکور دهه‌های گذشته](#)

- (۱) $P_C = P_A > P_B$
- (۲) $P_C > P_A > P_B$
- (۳) $P_C > P_B = P_A$
- (۴) $P_C > P_B > P_A$




۳۱۵- در لوله U شکل روبه‌رو دو مایع در حال تعادل می‌باشند. کدام گزینه در مورد مقایسه فشار در نقاط A و B درست است؟

- (۱) $P_A = P_B$
- (۲) $P_A > P_B$
- (۳) $P_A < P_B$
- (۴) اظهار نظر قطعی نمی‌توان کرد.




۳۱۶- در شکل روبه‌رو دو مایع مخلوط‌نشده با چگالی $\rho_1 = 0.8 \text{ g/cm}^3$ و $\rho_2 > \rho_1$ درون لوله U شکلی در تعادل هستند. اختلاف فشار بین نقاط A و B چند برابر اختلاف فشار بین نقاط C و D است؟

- (۱) $\frac{5}{9}$
- (۲) ۳
- (۳) $\frac{1}{3}$
- (۴) $\frac{9}{5}$




۳۱۷- در شکل روبه‌رو، درون لوله دو مایع مخلوط‌نشده قرار دارند. اگر فشار در نقاط نشان داده شده درون مایع‌ها را با هم مقایسه کنیم، کدام رابطه درست است؟

- (۱) $P_C < P_D$ و $P_A = P_B$
- (۲) $P_C < P_D$ و $P_A < P_B$
- (۳) $P_C = P_D$ و $P_A = P_B$
- (۴) $P_C = P_D$ و $P_A > P_B$




۳۱۸- در لوله U شکل زیر، اگر مایع‌ها در حال تعادل باشند، فشار در نقطه B چند کیلوپاسکال است؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$, $P_0 = 10^5 \text{ Pa}$)

- (۱) $1/6$
- (۲) $3/2$
- (۳) $101/6$
- (۴) $103/2$



۳۱۹- در شکل روبه‌رو دو مایع مخلوط‌نشده با چگالی‌های 800 kg/m^3 و 1000 kg/m^3 در یک لوله U شکل قرار دارند. اگر فشار در نقطه‌های A و B به ترتیب P_A و P_B باشد، کدام رابطه در SI برقرار است؟

- (۱) $P_A = P_B$
- (۲) $P_A = \frac{4}{5} P_B$
- (۳) $P_A = P_B - 100$
- (۴) $P_A = P_B + 100$



۳۲۰ در شکل روبه‌رو دو مایع مخلوط‌نشده آب و نفت در یک لوله U شکل در حال تعادل‌اند. اگر اختلاف فشار بین دو نقطه A و A' را با ΔP_1 و اختلاف فشار بین دو نقطه B و B' را با ΔP_2 نمایش دهیم، کدام گزینه درست است؟


خارج ریاضی - ۹۰

(۲) $\Delta P_1 = \Delta P_2 \neq 0$

(۴) $\Delta P_1 > \Delta P_2$

(۱) $\Delta P_1 < \Delta P_2$

(۳) $\Delta P_1 = \Delta P_2 = 0$




۳۲۱ با توجه به شکل کدام گزینه در مورد چگالی مایع‌ها در حالت تعادل درست است؟

(۲) $\rho_2 > \rho_3 > \rho_1$


(۴) $\rho_3 > \rho_2 > \rho_1$

(۱) $\rho_1 > \rho_2 > \rho_3$


(۳) $\rho_2 > \rho_1 > \rho_3$




۳۲۲ در شکل مقابل مایع‌ها در حال تعادل‌اند. اگر ارتفاع مایع با چگالی ρ_2 نصف شود، بعد از ایجاد تعادل، وضعیت مایع‌ها در لوله U شکل به چه صورتی در می‌آید؟




(۲)



(۱)



(۴)



(۳)

پند تست را که در آن‌ها به لوله U شکل مایعی اضافه شده است، بررسی می‌کنیم.

۳۲۳ در یک لوله U شکل، مقداری جیوه قرار دارد. در شاخه سمت راست لوله تا ارتفاع ۳۴ cm آب می‌ریزیم. اختلاف سطح آزاد دو مایع در دو شاخه چند سانتی‌متر است؟ ($\rho_{Hg} = 13.6 \text{ g/cm}^3$, $\rho_W = 1 \text{ g/cm}^3$, $g = 10 \text{ N/kg}$)


از کتاب درسی

(۴) ۳/۵

(۳) ۳۰/۵

(۲) ۳۱/۵

(۱) ۲/۵



۳۲۴ در یک لوله U شکل ابتدا آب می‌ریزیم و آن‌گاه در یکی از شاخه‌ها به ارتفاع ۸ سانتی‌متر نفت اضافه می‌کنیم. سطح آب نسبت به مکان اولیه در طرف دیگر چند سانتی‌متر بالاتر می‌رود؟ (چگالی آب 1 g/cm^3 و چگالی نفت 0.8 g/cm^3 است، ضخامت لوله در طرفین یکسان است.)

تجربی - ۹۰

(۲) ۶/۴

(۱) ۱/۶

(۴) ۵

(۳) ۳/۲



۳۲۵ در شکل روبه‌رو، سطح مقطع لوله U شکل در هر دو طرف برابر با 2 cm^2 است و در لوله U شکل جیوه قرار دارد. اگر در یکی از لوله‌ها به اندازه $54/4 \text{ g}$ آب بریزیم، پس از ایجاد تعادل، اختلاف ارتفاع سطح جیوه در دو لوله چند سانتی‌متر می‌شود؟ ($\rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3$, $\rho_{\text{جیوه}} = 13.6 \text{ g/cm}^3$)


تجربی خارج - ۹۰

(۲) ۲

(۱) ۱

(۴) ۲/۲۵

(۳) ۲/۵



۳۲۶ در دو لوله استوانه‌ای مربوط به هم تا سطح AA' آب وجود دارد و قطر قاعده یکی از استوانه‌ها ۳ برابر قطر قاعده استوانه دیگر است. اگر از لوله سمت چپ تا ارتفاع ۵ سانتی‌متر نفت اضافه کنیم، آب در لوله باریک چند سانتی‌متر نسبت به حالت اول بالا می‌رود؟ ($\rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3$, $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\rho_{\text{نفت}} = 0.8 \text{ g/cm}^3$)


تجربی - ۹۸

(۲) ۳/۶

(۱) ۱/۲


(۴) ۵

(۳) ۴




۳۲۷- در شکل روبه‌رو، مقداری مایع با چگالی $\rho_1 = 4 \text{ g/cm}^3$ درون لوله U شکل قرار دارد و قطر شاخه‌های لوله U شکل، ۴ cm و ۱ cm است. چند سانتی‌متر مکعب مایع به چگالی $\rho_2 = 2 \text{ g/cm}^3$ به شاخه سمت چپ اضافه کنیم تا سطح مایع در شاخه سمت راست ۲ cm بالا رود؟ $(\pi \sim 3)$

- ۵۱ (۱)
- ۶۷ (۲)
- ۴۳ (۳)
- ۳۹ (۴)




۳۲۸- در یک لوله U شکل که مساحت قاعده لوله سمت راست و چپ آن به ترتیب 5 cm^2 و 2 cm^2 است، مطابق شکل روبه‌رو، آب وجود دارد. در لوله سمت چپ چند گرم روغن بریزیم تا سطح آب در لوله سمت راست ۴ سانتی‌متر بالا رود؟ $(\rho_{\text{روغن}} = 0.8 \text{ g/cm}^3$ و $\rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3$ و $g = 10 \text{ m/s}^2$)

- ۱۷/۵ (۱)
- ۲۸ (۲)
- ۳۵ (۳)
- ۷۰ (۴)




۳۲۹- در شکل زیر داخل لوله U شکل آب ریخته شده است. مساحت سطح مقطع لوله در دهانه سمت چپ 4 cm^2 و دهانه سمت راست 1 cm^2 می‌باشد. بیستونی به جرم 75 g روی سطح آب در دهانه سمت چپ قرار می‌دهیم. آب در سمت راست چند cm بالا می‌رود؟ [آزمون مدارس برتر](#)

- ۱۵ (۱)
- ۱۲ (۲)
- ۷/۵ (۳)
- ۳ (۴)




۳۳۰- در شکل روبه‌رو ابتدا 100 g آب در لوله ریخته می‌شود و پس از تعادل 80 g روغن روی آب از یک طرف شاخه اضافه می‌کنیم. اگر سطح مقطع هر دو لوله یکسان و برابر 2 cm^2 باشد، پس از تعادل، اختلاف ارتفاع سطح آزاد مایع‌ها در دو شاخه چند سانتی‌متر است؟ (از مقدار مایع موجود در لوله رابط صرف‌نظر شود. $\rho_{\text{روغن}} = 0.8 \text{ g/cm}^3$, $\rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3$)

- ۴۰ (۱)
- ۲۵ (۲)
- ۱۰ (۳)
- ۱۵ (۴)




۳۳۱- در شکل زیر، سطح مقطع لوله 2 cm^2 است و در آن آب با چگالی $\rho_1 = 1 \text{ g/cm}^3$ قرار دارد. روی آب، در یک طرف 20 cm^3 مایع مخلوط‌نشده با چگالی $\rho_2 = 0.8 \text{ g/cm}^3$ می‌ریزیم. در لوله مقابل چند سانتی‌متر مکعب مایع مخلوط‌نشده دیگری با چگالی $\rho_3 = 0.75 \text{ g/cm}^3$ بریزیم. تا سطح آزاد مایع‌ها در دو شاخه لوله در یک سطح باشد؟ [خارج تجربی - ۱۴۰۱](#)

- ۸ (۱)
- ۱۲ (۲)
- ۱۲/۸ (۳)
- ۱۶ (۴)




۳۳۲- در لوله U شکل روبه‌رو شعاع مقطع لوله‌های استوانه‌ای شکل ۳ cm و ۶ cm است و آب در شاخه‌ها در حال تعادل است. چنانچه 900 cm^3 روغن به یکی از شاخه‌ها اضافه کنیم، فشار در نقطه M چند پاسکال افزایش می‌یابد؟ [خارج تجربی - ۹۳](#)

- ۴۰۰ (۱)
- ۲۴۰۰ (۲)
- ۶۰۰ (۳)
- ۱۲۰۰ (۴)



۳۳۳- در شکل روبه‌رو ارتفاع آب در شاخه A برابر $20/4 \text{ cm}$ است. در شاخه B نفت می‌ریزیم تا سطح جیوه در دو شاخه یکسان گردد. اگر سطح مقطع شاخه B چهار برابر سطح مقطع شاخه A باشد، سطح جیوه در شاخه B نسبت به حالت اول چند سانتی‌متر جابه‌جا می‌شود؟ [خارج تجربی - ۸۹](#)

- ۰/۳ (۱)
- ۰/۵ (۲)
- ۱/۲ (۳)
- ۲ (۴)




۳۳۴- در شکل مقابل سطح مقطع لوله 1 cm^2 است. در سمت راست لوله، چند سانتی متر مکعب مایع مخلوط نشدنی به چگالی $\rho_2 = 0.8 \text{ g/cm}^3$ بریزید. تا سطح آزاد مایع‌ها در دو ظرف لوله در یک سطح باشد؟

- تجربی - ۱۴۰۱
- (۱) $3/5$ (۲) $7/2$ (۳) ۹ (۴) ۱۲

و در آخر، سه تست مشابه که باز در آن‌ها مایع‌ها در درون لوله جابه‌جا می‌شوند.

۳۳۵- در شکل روبه‌رو اگر شیر رابط دو شاخه را باز کنیم سطح آب در شاخه سمت چپ چند h پایین می‌آید؟

- (۱) $1/2$ (۲) $1/5$ (۳) $1/4$ (۴) $1/9$





۳۳۶- در شکل روبه‌رو اگر شیر N را باز کنیم تا 0.5 لیتر آب خارج شود، فشار در نقطه M چند پاسکال تغییر می‌کند؟ ($\rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3$, $g = 10 \text{ N/kg}$)

- (۱) ۵۰۰ (۲) ۱۵۰۰ (۳) ۲۰۰۰ (۴) ۱۰۰۰


۳۳۷- شکل روبه‌رو دو مایع مخلوط‌نشدنی را نشان می‌دهد و شیر رابط بسته است و سطح آزاد مایع دو لوله در یک ارتفاع قرار دارند. اگر شیر را باز کنیم بعد از رسیدن به تعادل اختلاف ارتفاع سطح آزاد در دو لوله چند سانتی‌متر می‌شود؟

- (۱) ۴ (۲) ۸ (۳) صفر (۴) ۲



۳۳۸- دو ظرف استوانه‌ای مشابه به وسیله لوله بسیار باریک با حجم ناچیز به یکدیگر مربوط‌اند و مطابق شکل زیر در یک استوانه آب و در دیگری جیوه قرار دارد. اگر شیر ارتباطی بین دو ظرف را باز کنیم، سطح جیوه در لوله چند سانتی‌متر پایین می‌آید؟ ($\rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3$, $\rho_{\text{جیوه}} = 13.5 \text{ g/cm}^3$)

- (۱) ۲ (۲) ۵ (۳) $12/5$ (۴) ۲۵




۲۵ (۴)


۳۳۹- در شکل زیر قطر قاعده لوله (۱)، دو برابر قاعده لوله (۲) و شیر رابط بین آن دو بسته است، چگالی مایع در استوانه (۱)، 2 g/cm^3 و در استوانه (۲)، 1 g/cm^3 است. اگر شیر رابط را باز کنیم، سطح مایع در لوله (۱) چگونه تغییر می‌کند؟ (حجم لوله رابط بین دو لوله ناچیز فرض شود).

آزمون مدارس برتر

- (۱) ۱۲ cm بالا می‌رود.
(۲) ۱۲ cm پایین می‌آید.
(۳) ۶ cm بالا می‌رود.
(۴) ۶ cm پایین می‌آید.




سطح دوم




۳۴۰- درون لوله U شکل مقابل آب وجود دارد. در شاخه سمت چپ مقداری روغن تا این که سطح مشترک روغن و آب به نقطه میانی لوله (نقطه P) برسد. هر دو شاخه لوله باز و با هوا تماس دارند. اگر ارتفاع آب در شاخه سمت راست را با h_W و ارتفاع روغن را با h_O نشان دهیم، h_O برابر کدام گزینه است؟ (چگالی آب برابر ρ_W و چگالی روغن برابر ρ_O)

- (۱) $\frac{\rho_O}{\rho_W} h_W$ (۲) $\frac{\rho_W}{\rho_O} h_W$ (۳) $\frac{\rho_O}{\rho_W h_W}$ (۴) $\frac{\rho_W}{\rho_O h_W}$



۳۴۱- در شکل روبه‌رو چگالی مایع $12/5 \text{ g/cm}^3$ است و قطر مقطع لوله سمت راست $\sqrt{5}$ برابر قطر مقطع لوله سمت چپ است. در لوله A آب اضافه می‌کنیم تا این لوله پر شود. در این صورت مایع لوله سمت راست چند میلی‌متر جابه‌جا می‌شود؟
 ($\rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3$)


- (۱) ۰/۲۵ (۲) ۲/۵ (۳) ۲ (۴) ۳



۳۴۲- در شکل مقابل دو سطح جیوه در یک تراز قرار دارد و سیستم در حالت تعادل است. تقریباً چند سانتی‌متر به ارتفاع ستون آب اضافه کنیم تا سطح آزاد آب و روغن در یک تراز قرار بگیرند؟
 ($\rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3, \rho_{\text{جیوه}} = 13/6 \text{ g/cm}^3$)


[خارج تجربی - ۸۹](#)

- (۱) ۴/۵ (۲) ۴/۹ (۳) ۵/۴ (۴) ۹/۴




۳۴۳- در شکل روبه‌رو مایع‌ها مخلوط‌نشده‌اند. به لوله سمت راست چند سانتی‌متر از همان مایع درونش اضافه کنیم تا اختلاف سطح آزاد مایع‌ها از یک‌دیگر به 5 cm برسد؟

- (۱) ۵ (۲) ۲/۵ (۳) ۸ (۴) ۳




۳۴۴- در شکل مقابل مساحت مقطع شاخه‌های B و C با یک‌دیگر برابر است و مساحت مقطع شاخه A سه برابر مساحت مقطع دو شاخه دیگر است. اگر در شاخه C به ارتفاع 50 سانتی‌متر روغن بریزیم. پس از ایجاد تعادل، ارتفاع آب در شاخه‌های A و B به ترتیب از راست به چپ چند سانتی‌متر افزایش می‌یابد؟ ($\rho_{\text{آب}} = 1000 \text{ kg/m}^3$)

- (۱) ۱۶ و ۱۶/۳ (۲) ۸ و ۸/۳ (۳) ۱۶ و ۱۶ (۴) ۸ و ۸




۳۴۵- در شکل روبه‌رو مایع‌ها مخلوط‌نشده‌اند و در حال تعادل‌اند. کدام گزینه درباره فشار نقاط A، B و C درست است؟

- (۱) $P_C < P_B < P_A$ (۲) $P_B = P_C < P_A$ (۳) $P_C = P_B > P_A$ (۴) $P_B < P_C < P_A$



۳۴۶- در شکل روبه‌رو اگر مساحت سطح دو شاخه یکسان و برابر 20 cm^2 باشد، نیرویی که به انتهای بسته شاخه سمت چپ وارد می‌شود چند نیوتون است؟

- (۱) ۳۸ (۲) ۲۰۴/۶ (۳) ۱۲/۷ (۴) ۱۰۲/۳




۳۴۷- در شکل روبه‌رو جرم پیستون 20 kg ، سطح مقطع آن 4 cm^2 و چگالی مایع 2 g/cm^3 است. اختلاف فشار نقطه B با فشار هوای محیط چند کیلوپاسکال است؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$)

- (۱) ۵ (۲) ۱۰ (۳) ۵۵ (۴) ۵۰۵

۳۴۸- در یک بالابر هیدرولیکی قطر پیستون بزرگ ۵ برابر قطر پیستون کوچک است. نسبت فشار وارد بر پیستون بزرگ به فشار وارد بر پیستون کوچک کدام است؟ (پیستون‌ها در یک سطح افقی‌اند.)

- (۱) ۵ (۲) ۲۵ (۳) ۱ (۴) ۱۰۰



۳۴۹- در شکل مقابل اگر پیستون کوچک 10 cm جابه‌جا شود، پیستون بزرگ 2 mm جابه‌جا می‌شود، چنانچه وزن پیستون کوچک 8 N باشد، وزن پیستون بزرگ چند نیوتون است؟


- (۱) ۴۰۰ (۲) ۳۰۰ (۳) ۵۰۰ (۴) ۴۰



- ۱- گزینه درست را مشخص کنید.
 (۱) آب در لوله موئین به علت فشار هوا بالا می‌رود.
 (۲) حجم واحد جرم ماده را چگالی می‌گوییم.
 (۳) مایع‌ها به این علت شکل مشخصی ندارند که فاصله بین مولکول‌های آن‌ها در مقایسه با جامدها، بیش‌تر است.
 (۴) در فاصله‌های خیلی کوتاه نیروی بین مولکولی رانشی است و اگر مولکول‌ها را کمی از هم دور کنیم، نیروی جاذبه بین آن‌ها ظاهر می‌شود.
- ۲- کدام یک از گزاره‌های زیر درست است؟


- الف) تکه‌های شیشه با گرم شدن به هم می‌چسبند زیرا نیروی ربایش بین مولکولی کوتاه برد است.
 ب) علت اینکه موهای یک قلم‌مو که از آب بیرون کشیده می‌شود، به هم می‌چسبند، پدیده کشش سطحی است.
 پ) هر قدر قطر یک لوله موئین بیشتر باشد، سطح مایع داخل آن بیشتر از سطح آزاد مایع می‌شود.
 ت) بادهای نسبتاً ضعیف قادرند توده‌های بزرگی از ریزگردها را به حرکت درآورند زیرا چگالی آن‌ها بسیار کم است.
- (۱) الف و ب (۲) الف و ت (۳) ب و ت (۴) پ و ت

۳- اگر در داخل یک مایع به چگالی $1/2 \text{ g/cm}^3$ از عمق 20 cm به عمق 30 cm برویم، فشار ناشی از وزن مایع چند برابر می‌شود؟



- (۱) $\frac{3}{2}$
 (۲) ۳
 (۳) ۲
 (۴) $\frac{1}{2}$

۴- نمودار تغییرات فشار بر حسب عمق داخل مایعی مطابق شکل است. چگالی مایع چند واحد SI است؟



- (۱) ۱۰۰۰
 (۲) ۱۵۰۰
 (۳) ۸۰۰
 (۴) ۷۵۰

۵- چنانچه فشار هوا برابر 65 cmHg و فشار کل در عمق آب دریاچه‌ای برابر 85 cmHg باشد، عمق آب دریاچه چند متر است؟ (چگالی جیوه

14 g/cm^3 و چگالی آب 1 g/cm^3 است)


- (۱) ۱۲ (۲) $2/8$ (۳) ۲۸ (۴) $1/4$

۶- در ظرفی به ارتفاع 68 سانتی‌متر مایعی به چگالی 0.8 g/cm^3 ریخته‌ایم. فشار بر کف ظرف 70 cmHg شده است. فشار هوای محیط چند

سانتی‌متر جیوه است؟ ($\rho_{\text{Hg}} = 13.6 \text{ g/cm}^3$)

- (۱) ۷۵ (۲) ۷۴ (۳) ۶۶ (۴) ۶۸

۷- ظرف مقابل پر از آب به چگالی ρ و دهانه آن باز است. نیرویی که مایع بر وجه A وارد می‌کند، کدام است؟




- (۱) $3 \rho g d^3$
 (۲) $\frac{3}{2} \rho g d^3$
 (۳) $2 \rho g d^2$
 (۴) $2 \rho g d^3$

۸- مساحت قسمت باریک یک ظرف، $\frac{1}{5}$ مساحت کف ظرف است. چند سانتی‌متر مکعب آب، بر آب

موجود در داخل ظرف اضافه کنیم تا به نیروی وارد بر کف ظرف 2 N اضافه شود؟

($\rho_{\text{H}_2\text{O}} = 1000 \text{ kg/m}^3$)




- (۱) ۵۰ (۲) ۴۰ (۳) ۱۰۰ (۴) ۸۰

۹- اگر در هر یک از ظرف‌های زیر که مساحت کف آن‌ها با هم برابر است، 1 kg از یک مایع بریزیم، فشار وارد

بر کف کدام ظرف بیش‌تر است؟



- (۱) A (۲) B (۳) C (۴) هر سه یکسان است.




۱۰- مطابق شکل در ظرفی آب ریخته ایم. اگر مساحت کف ظرف 80 cm^2 باشد، نیروی خالصی که

مایع بر کف ظرف وارد می کند، چند نیوتون است؟ ($\rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3$)

- (۱) ۴۰۰
(۲) ۴۰
(۳) ۲۴
(۴) ۲۴۰


۱۱- در دو ظرف استوانه ای که شعاع سطح مقطع یکی دو برابر دیگری است، در هر کدام یک لیتر آب ریخته ایم. فشار آب در ته ظرف باریک تر چند برابر فشار آب در ته ظرف پهن تر است؟

- (۱) $\frac{1}{4}$
(۲) ۱
(۳) ۴
(۴) ۲




۱۲- در شکل مقابل، مایع داخل لوله آب است. از یک سمت لوله در آن الکل با چگالی 0.8 g/cm^3 می ریزیم تا از همان سمت لوله لبریز شود. در سمت دیگر لوله، فاصله سطح آب از بالای لوله چند سانتی متر خواهد بود؟ (سطح مقطع لوله در دو طرف برابر است.)

- (۱) ۱۲
(۲) ۴۸
(۳) ۲۰
(۴) ۴۰




۱۳- در شکل روبه رو مکعبی به وزن W بر سطح مایع داخل ظرف شناور است. مساحت قاعده مکعب و ظرف به ترتیب A_1 و A_2 است. در صورت خارج کردن مکعب کاهش فشار وارد بر کف ظرف کدام است؟

- (۱) $\frac{W}{A_1}$
(۲) $\frac{W}{A_2}$
(۳) $\frac{A_2}{A_1} W$
(۴) $\frac{W}{A_2 - A_1}$




۱۴- فشار پیمانه ای مخزن گاز مقابل $6 \times 10^3 \text{ Pa}$ است. چگالی مایع موجود در لوله U شکل چند واحد SI است؟

- (۱) ۲
(۲) ۰/۵
(۳) ۲۰۰۰
(۴) ۵۰۰۰



۱۵- در شکل مقابل چگالی مایع 6 g/cm^3 است. چنانچه فشار هوای محیط برابر 74 cmHg باشد، فشار وارد بر ته لوله از طرف مایع چند سانتی متر جیوه است؟ ($\rho_{\text{Hg}} = 13.6 \text{ g/cm}^3$)


- (۱) ۹
(۲) ۳۶/۵
(۳) ۲۰
(۴) ۱۸



۱۶- فشار در نقطه A چند کیلوپاسکال است؟ (چگالی نفت 800 kg/m^3 ، چگالی جیوه 13600 kg/m^3 ، فشار هوای بیرون 10^5 Pa و $g = 10 \text{ N/kg}$ است.)

- (۱) ۹۷/۶
(۲) ۱۱۸/۴
(۳) ۶۸/۴
(۴) ۱۲۰/۴


۱۷- مطابق شکل، یک ظرف شامل مقداری آب است که روی آن مقداری روغن قرار دارد. فشار در نقطه A را P_A می نامیم. آب و روغن را به هم می ریزیم تا مخلوط معلق تقریباً یکنواختی به دست آید. در این حالت فشار نقطه A را با P'_A نشان می دهیم، کدام گزینه درست است؟



- (۱) $P'_A = P_A$
(۲) $P'_A < P_A$
(۳) $P'_A > P_A$
(۴) بستگی به چگالی روغن نسبت به آب دارد.



۱۸- یک سنگ مطابق شکل در کف یک ظرف محتوی مایع ته نشین شده است. نیرویی که از طرف سنگ بر کف ظرف وارد می شود.....
(۱) برابر وزن سنگ است.
(۲) کم تر از وزن سنگ است.
(۳) بیش تر از وزن سنگ است.
(۴) بستگی به چگالی مایع دارد.



۱۹- در شکل روبه‌رو در لوله‌های قائم و لوله افقی مایعی به چگالی $6/8 \text{ g/cm}^3$ وجود دارد. مایع درون

لوله افقی دارای جریان لایه‌ای یکنواخت است، فشار از ناحیه (۱) تا ناحیه (۲) چه تغییری می‌کند؟

$$(\rho_{\text{جیوه}} = 13/6 \text{ g/cm}^3)$$

(۱) $2/5 \text{ cm Hg}$ کاهش می‌یابد.

(۲) 5 cm Hg افزایش می‌یابد.

(۳) تغییری نمی‌کند.

(۴) قابل محاسبه نیست.

۲۰- در شکل روبه‌رو جریان لایه‌ای و یکنواخت شماره‌ای نشان داده شده است. اگر آهنگ جریان شماره

در قسمت پهن‌تر لوله $2 \text{ cm}^3/\text{s}$ باشد، چنان‌چه سرعت شماره در قسمت باریک‌تر لوله دو برابر


قسمت پهن‌تر آن باشد، آهنگ جریان شماره در قسمت باریک‌تر لوله چند لیتر بر ثانیه خواهد بود؟

(۱) ۲

(۲) 2×10^{-3}

(۳) ۴

(۴) 4×10^{-3}






پاسخ آزمون



۲۹ (B) اگر داخل ظرفها مقدار مساوی از یک مایع بریزیم، ارتفاع مایع در ظرف B بیشتر از بقیه خواهد شد زیرا مساحت کف ظرفها یکسان است ($A_A = A_B = A_C$) و با توجه به یکسان بودن مقدار مایع داخل ظرفها، $h_B > h_A > h_C$ است و بنابراین طبق رابطه $P = \rho gh$ فشار در کف ظرف B بیش تر است.



تست های مشابه: ۲۸۲ تا ۲۹۱


۲۱۰ (A) فشار وارد بر ته ظرف را باید برحسب عمق مایع تا سطح آزاد مایع، یعنی تا ارتفاع ۵۰ سانتی متر در نظر گرفت:

$$P = \rho gh = 1000 \times 10 \times \frac{5}{10} = 5000 \text{ Pa}$$

نیروی وارد بر کف ظرف توسط مایع برابر است با:

$$F = PA = 5000 \times 80 \times 10^{-4} = 40 \text{ N}$$

تست های مشابه: ۲۵۶ تا ۲۶۴



۳۱۱ (B) باید نسبت ارتفاع آب را در دو ظرف با هم مقایسه کنیم:

$$V_1 = V_2 \Rightarrow \pi r_1^2 h_1 = \pi r_2^2 h_2$$


$$r_1 = 2r_2 \Rightarrow 4h_1 = h_2$$

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{\rho gh_2}{\rho gh_1} = 4$$

تست های مشابه: ۲۳۸ تا ۲۴۶

۳۱۲ (C) وقتی در یک سمت لوله الکل می ریزیم و سطح آب به اندازه X از سطح اولیه پایین می رود، آب به اندازه X از طرف دیگر بالا می رود (به شکلها دقت کنید). فشار در سطح هم تراز را برابر قرار می دهیم:

$$P_1 = P_2 \Rightarrow \rho_1 g(2x) = \rho_2 g(60 + x) \Rightarrow 1 \times (2x) = 0.8 \times (60 + x) \Rightarrow 2x = 48 + 0.8x \Rightarrow 1.2x = 48 \Rightarrow x = 40 \text{ cm} \Rightarrow y = 20 \text{ cm}$$



تست های مشابه: ۳۲۲ تا ۳۲۹

۲۱۳ (A) فشار وارد بر ته ظرف را در دو حالت وجود و عدم وجود مکعب می نویسیم: (W' وزن مایع است.)

$$P_1 = \frac{W + W'}{A_p}, \quad P_2 = \frac{W'}{A_p} \Rightarrow \Delta P = \frac{W}{A_p}$$

تست های مشابه: ۲۶۵ تا ۲۶۷

۳۱۴ (B) فشار پیمانه ای برابر اختلاف فشار گاز و فشار هوای محیط است. از این رو:

$$P_{\text{مخزن}} - P_0 = \rho gh \Rightarrow 6 \times 10^3 = \rho \times 10 \times \frac{3}{10} \Rightarrow \rho = \frac{6 \times 10^3}{3} = 2000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

تست های مشابه: ۳۸۸ تا ۳۹۵

۴۱ (A) آب در لوله های موئین به علت نیروی دگرچسبی بین آب و لوله بالا می رود. بنابراین گزینه (۱) نادرست است.

چگالی، جرم واحد حجم ماده است نه حجم واحد جرم و گزینه (۲) نادرست است. فاصله میانگین مولکول های مایع ها و جامدها تقریباً یکسان است. بنابراین گزینه (۳) نادرست است.

اگر مولکول های یک جسم را به هم نزدیک کنیم بین آنها نیروی رانشی و اگر از هم دور کنیم نیروی ریشی به وجود می آید و گزینه (۴) درست است.

تست های مشابه: ۱۷۸ تا ۲۰۶

۱۲ (A) گزاره های (پ) و (ت) نادرست اند علت نادرستی آنها را بررسی می کنیم: گزاره (پ): هر قدر قطر لوله کمتر باشد یعنی لوله نازکتر باشد مایع در آن بیشتر بالا یا پایین می رود. گزاره (ت): ریزگردها چگالی کمی ندارند و علت اینکه بادهای ضعیف می توانند آنها را جابه جا کنند ضعیف بودن نیروی هم چسبی بین ریزگردها است.


تست های مشابه: ۱۷۸ تا ۲۱۰

۱۳ (A) با توجه به رابطه $P = \rho gh$ داریم:

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{\rho gh_2}{\rho gh_1} = \frac{3}{2}$$

تست های مشابه: ۲۲۸ تا ۲۳۵

۳۴ (B) $P = P_0 + \rho gh \Rightarrow 1.8 \times 10^5 = 10^5 + \rho \times 10 \times 10$
 $\Rightarrow \rho = \frac{0.8 \times 10^5}{100} = 800 \text{ kg/m}^3$



تست های مشابه: ۲۷۸ تا ۲۸۱

۲۵ (B) فشار کل در عمق مایع برابر است با:

$$P = P_0 + P_{\text{مایع}} \Rightarrow 85 = 65 + P_{\text{آب}} \Rightarrow P_{\text{آب}} = 20 \text{ cmHg}$$

اکنون عمق آب را به دست می آوریم:

$$(ph)_{\text{آب}} = (ph)_{\text{جیوه}} \Rightarrow 1 \times h = 14 \times 20 \Rightarrow h = 280 \text{ cm} = 2.8 \text{ m}$$

تست های مشابه: ۳۵۰ تا ۳۵۵

۳۶ (B) فشار مایع را برحسب سانتی متر جیوه به دست می آوریم:

$$\rho_1 h_1 = \rho_{\text{Hg}} h_{\text{Hg}} \Rightarrow 0.8 \times 68 = 13.6 / h \Rightarrow h = 4 \text{ cm} \Rightarrow P_{\text{مایع}} = 4 \text{ cmHg}$$

$$P_{\text{کل}} = P_0 + P_{\text{مایع}} \Rightarrow P_0 = 70 - 4 = 66 \text{ cmHg}$$

تست های مشابه: ۳۵۰ تا ۳۵۵

۴۷ (B) فشار وارد بر وجه A در همه نقاط وارد بر این سطح یکسان است (زیرا وجه A افقی است)

$$P = \rho gh = \rho g \times rd$$

$$F = PA = \rho g(rd)A \xrightarrow{A=rd^2} F = 2\rho gd^3$$

تست های مشابه: ۲۵۶ تا ۲۶۴

۲۸ (C) افزایش فشاری که بر قسمت باریک لوله اضافه می شود برابر با افزایش فشار وارد بر ته ظرف است.


$$\Delta P_1 = \Delta P_2 \Rightarrow \frac{\Delta W}{a} = \frac{\Delta F}{A}$$

$$\frac{\Delta W}{a} = \frac{2}{5} \Rightarrow \Delta W = \frac{2}{5} \text{ N} \Rightarrow \rho Vg = \frac{2}{5} \Rightarrow 1000 \times V \times 10 = \frac{2}{5}$$

$$\Rightarrow V = 4 \times 10^{-6} \text{ m}^3 = 4 \text{ cm}^3$$

تست های مشابه: ۲۵۶ تا ۲۶۴

بنابراین فشار در ناحیه (۲)، $2/5 \text{ cmHg}$ از فشار در ناحیه (۱) کم تر است.




تست‌های مشابه: ۴۷۸ تا ۴۸۲

آهنگ جریان شماره در سراسر لوله مقدار ثابتی است، در نتیجه آهنگ جریان

شماره در قسمت باریک $2 \text{ cm}^3/\text{s}$ است که برابر $2 \times 10^{-3} \text{ L/s}$ می‌باشد.

تست‌های مشابه: ۴۶۶ تا ۴۷۶

۲۱۵ (B)



$$P_A = P_B \Rightarrow P_{\text{مایع}} + P = P_0$$


منظور از P فشاری است که از طرف مایع بر انتهای بسته لوله وارد می‌شود حال باید فشار حاصل از مایع به ارتفاع 75 cm را بر حسب سانتی‌متر جیوه به دست آوریم:

$$(\rho_1 h_1)_{\text{مایع}} = (\rho h)_{\text{جیوه}} \Rightarrow 6/8 \times 75 = 13/6 h$$

$$\Rightarrow h = 37/5 \text{ cm} \Rightarrow P_{\text{مایع}} = 37/5 \text{ cmHg}$$

$$P_{\text{مایع}} + P = P_0 \Rightarrow 37/5 + P = 74 \Rightarrow P = 36/5 \text{ cmHg}$$

تست‌های مشابه: ۳۹۶ تا ۳۹۸



ابتدا فشار هوای درون

مخزن را به دست می‌آوریم. قطعاً

فشار هوای محیط از فشار هوای مخزن

بیشتر است زیرا سطح مایع در سمت

مخزن بالاتر است. بنابراین:

$$P = P_0 - \rho_{\text{جیوه}} gh_{\text{جیوه}} = 10^5 - 13600 \times 10 \times \frac{1}{100} = 100000 - 13600 = 86400 \text{ Pa}$$

فشار در نقطه A برابر مجموع فشار هوای مخزن و فشار آب است در نتیجه:


$$P_A = P + \rho_{\text{نفت}} gh_{\text{نفت}} = 86400 + 800 \times 10 \times 4 = 86400 + 32000$$

$$\Rightarrow P_A = 118400 \text{ Pa} = 118/4 \text{ kPa}$$

تست‌های مشابه: ۴۱۶ تا ۴۱۸

چگالی روغن کم تر از چگالی آب است و با به هم زدن آن‌ها خواهیم داشت:

$$P_{\text{آب}} < P_{\text{مخلوط}} < P_{\text{روغن}}$$



فشار در کف طرف از رابطه $P = \frac{mg}{A} + P_0$ به دست می‌آید و در دو حالت وزن کل مایع

(mg) یکسان است. بنابراین فشار در کف دو ظرف با هم برابر است: (۱)

در شکل (۱) فشار در کف طرف برابر مجموع فشار در نقطه A و فشار آب بین نقطه A و کف طرف است.

$$P = P_A + \rho_{\text{آب}} gh \quad (2)$$

در شکل (۲) فشار در کف طرف برابر مجموع فشار در نقطه A و فشار مایع مخلوط بین نقطه A و کف طرف است.

$$P' = P'_A + \rho_{\text{مخلوط}} gh \quad (3)$$

$$(1), (2), (3) \Rightarrow P_A + \rho_{\text{آب}} gh = P'_A + \rho_{\text{مخلوط}} gh$$

$$\Rightarrow P'_A - P_A = (\rho_{\text{آب}} - \rho_{\text{مخلوط}}) gh \xrightarrow{\rho_{\text{آب}} > \rho_{\text{مخلوط}}} P'_A > P_A$$

تست‌های مشابه: ۲۶۹ تا ۲۷۷

نیروی شناوری وارد از طرف مایع بر سنگ رو به بالا است، بنابراین نیرویی

که از طرف سنگ بر کف طرف وارد می‌شود از وزن سنگ کم تر است.

تست‌های مشابه: ۴۳۲ تا ۴۴۱


اختلاف ارتفاع در دو لوله قائم برابر اختلاف فشار در ناحیه (۱) و (۲) است.

یعنی برابر با 5 cm است. پس آن را به سانتی‌متر جیوه تبدیل می‌کنیم:


$$P_1 - P_2 = \rho gh = \rho_{\text{Hg}} gh_{\text{Hg}} \Rightarrow 6/8 \times 5 = 13/6 \times h_{\text{Hg}}$$

$$h_{\text{Hg}} = 2/5 \text{ cm} \Rightarrow \Delta P = 2/5 \text{ cmHg}$$


۳۰۳ (ب) در هر سه ظرف نیروی وارد بر کف ظرف ناشی از فشار مایع است که با توجه به یکسان بودن ارتفاع مایع در سه ظرف، فشار وارد بر کف هر سه ظرف برابر است. از این رو نیروی وارد بر کف هر سه ظرف یکسان بوده ($F=PA$) و فشردگی فنرها یکسان است.



۳۰۴ (ب) چون مایع (۱) در زیر مایع (۲) قرار گرفته است، چگالی آن بیشتر است پس اگر ظرف را وارونه کنیم باز هم مایع (۱) در زیر قرار می‌گیرد. چون سطح مقطع ته ظرف در حالت دوم کمتر از حالت اول شده است، ارتفاع مایع ρ_1 در حالت دوم، بیشتر خواهد شد.




حالت افقی و فرضی x را از مرز مشترک دو مایع در شکل اول به سمت شکل حالت دوم رسم می‌کنیم. فشار مایع در این خط در شکل دوم بزرگتر از شکل اول است زیرا ارتفاعی از مایع‌ها که بالای این سطح قرار می‌گیرد یکسان است اما در طرف دوم بخشی از مایع با چگالی ρ_1 که بزرگتر از ρ_2 است بر می‌شود. پس فشار کل در ته ظرف در حالت دوم بیشتر از حالت اول است.



اما درباره نیرو: در حالت اول (مطابق آنچه در بحث مقایسه وزن مایع و نیروی حاصل از فشار آورده‌ایم):

$$W_1 + W_2 = W < F$$

در حال دوم نیز:




$$W_1 + W_2 = W > F'$$

بنابراین:

$$F' < W < F \Rightarrow F' < F$$

۳۰۵ (ا)



خط نکه: خط هم‌تراز مربوط به لوله U شکل را می‌کشیم (خط هم‌تراز خطی است که از مرز مشترک دو مایع رسم می‌شود). فشار در نقاط هم‌تراز A و B با هم برابر است و با برابر قرار دادن P_B و P_A چگالی ρ_2 را حساب می‌کنیم.

می‌دانیم فشار در نقطه A حاصل از 24cm مایع ρ_1 و فشار هوا (P_0) و فشار در نقطه B حاصل از 3cm مایع ρ_2 و فشار هوا (P_0) است بنابراین:


$$P_A = P_B \Rightarrow \rho_1 g h_1 + P_0 = \rho_2 g h_2 + P_0$$

چون در دو طرف معادله حاصل ρ داریم تنها کافی است واحدهای ρ در دو طرف معادله یکسان باشد.

$$\rho_1 h_1 = \rho_2 h_2 \Rightarrow \rho_2 = \rho_1 \frac{h_1}{h_2} = 1/6 \text{ g/cm}^3$$


۲۹۹ (ب) با توجه به وضعیت قرارگیری مایع‌ها در ظرف $\rho_2 > \rho_1$ است. زیرا مایع ρ_2 ته‌نشین شده است. اگر دو مایع با هم مخلوط شوند چگالی مخلوط ρ' خواهد شد. چگالی مخلوط بین چگالی دو مایع ρ_1 و ρ_2 است. بنابراین $\rho_1 < \rho' < \rho_2$. فشار وارد بر نقطه A در حالت اول و بعد از مخلوط شدن را با هم مقایسه می‌کنیم:

$$\begin{cases} P_A = \rho_1 g x \\ P'_A = \rho' g x \end{cases} \xrightarrow{\rho' > \rho_1} P'_A > P_A$$



برای مقایسه فشار B به این نکته توجه کنید که فشار وارد بر ته طرف قبل از مخلوط کردن دو مایع و بعد از آن با هم متفاوت نمی‌باشد. چون در هر دو حالت مجموع جرم یا وزن دو مایع یکسان و سطح مقطع نیز یکسان است. ($P = \frac{W}{A}$) پس:

$$\begin{cases} P_{A'} = P_B + \rho_2 g x' \Rightarrow P_B = P_{A'} - \rho_2 g x' \\ P'_{A'} = P'_B + \rho' g x' \Rightarrow P'_B = P'_{A'} - \rho' g x' \end{cases} \xrightarrow{\frac{\rho_2 > \rho'}{P_{A'} = P'_{A'}}} P'_B > P_B$$



۳۰۰ (ب) آهنگ خروج آب از شیر ثابت است. بنابراین در هر ثانیه حجم معینی آب وارد ظرف می‌شود. با بالا آمدن آب، سطح مقطع ظرف افزایش می‌یابد، اما حجم آب ورودی به ظرف ثابت است. بنابراین آهنگ افزایش ارتفاع آب کاهش می‌یابد. یعنی در هر ثانیه افزایش ارتفاع آب نسبت به ثانیه قبلی کمتر است. از این رو فشار آب ($P = \rho g h$) با آهنگ کمتری افزایش می‌یابد که نمودار گزینه (۲) این موضوع را نشان می‌دهد.

۳۰۱ (ب) وزن آب اضافه شده به ظرف را حساب می‌کنیم.

$$W = mg \xrightarrow{m=2 \times 10^{-2} \text{ kg}} W = 0.2 \times 10 = 2\text{N}$$

نیروسنج همواره وزن تمام اجسامی که روی آن قرار می‌گیرد را نشان می‌دهد.


بنابراین عددی که نیروسنج نشان می‌دهد $\Delta N = 2\text{N}$ افزایش می‌یابد.

نکته: نیرویی که مایع بر کف ظرف دهانه تنگ وارد می‌کند از وزن مایع بیشتر است.

۳ با ریختن آب درون ظرف، نیرویی که مایع بر کف ظرف وارد می‌کند، از وزن مایع بیشتر است یعنی $F > 2\text{N}$ خواهد بود.

۳۰۲ (ب)

خط نکه: دقت کنید وزن آب $W = 12\text{N}$ توسط نیرویی که دیواره‌ها و کف ظرف



بر آب وارد می‌کنند خنثی می‌شود. زیرا مایع ساکن بوده و نیروهای وارد بر آن متوازن است. شما کافی است نیرویی که توسط مایع بر کف ظرف وارد می‌شود را حساب کنید، سپس این نیرو را از نیروی وزن مایع کم کنید. نیروی باقیمانده همان نیروی سطوح جانبی وارد بر آب است.


نیروی وارد بر کف ظرف توسط آب ناشی از فشار آب است.

$$P = \rho g h \Rightarrow P = 1000 \times 10 \times 0.4 \Rightarrow P = 4000 \text{ Pa}$$

$$F = PA \Rightarrow F = 4000 \times 200 \times 10^{-4} \Rightarrow F = 800 \text{ N}$$

نیرویی که دیواره‌های جانبی تحمل می‌کنند خواهد شد:

$$F_{\text{جانبی}} = 1200 - 800 = 400 \text{ N}$$



$$P_N = P_M \Rightarrow P_0 + P_{\text{مایع}} + P_{\rho_1} = P_0 + P_{\rho_2} + P_{\text{مایع}}$$

$$\xrightarrow{P = \rho gh} \rho_1 g h_1 + \rho_2 g h_2 = \rho_2 g h_2 + P_0$$

$$\Rightarrow 800 \times 10 \times \frac{20}{100} + 1200 \times 10 \times \frac{20}{100} = P_0 + P_{\text{مایع}}$$


$$P_{\text{مایع}} = 1600 + 1200 = 2800 \text{ Pa}$$

برای پیدا کردن جرم مایع ρ_2 ابتدا وزن این مایع را به کمک تعریف فشار حساب

$$P_{\rho_2} = \frac{W_{\rho_2}}{A} \xrightarrow{A = r^2 \text{ cm}^2} 2800 = \frac{W_{\rho_2}}{r^2 \times 10^{-4}} \Rightarrow W_{\rho_2} = 0.56 \text{ N}$$

$$W_{\rho_2} = m_{\rho_2} g \Rightarrow 0.56 = m_{\rho_2} \times 10 \Rightarrow m_{\rho_2} = 0.056 \text{ kg} = 56 \text{ g}$$

۱ ۳۰۹ B




نکته: فشار در هر نقطه از مایع به عمق قائم مایع از سطح آزاد مایع بستگی دارد.

خط‌نک: به زاویه‌های روی شکل نیازی نیست، خط تراز را از مرز دو مایع رسم کنید. نقاط B و B' روی خط تراز بوده و فشار در این نقاط برابر است. عمق قائم نقطه B روی شکل برابر $40 - 8 = 32 \text{ cm}$ و عمق قائم نقطه B' روی شکل برابر $28 - 8 = 20 \text{ cm}$ است. اکنون با دقت به این مطالب می‌توانید مسئله را حل کنید.

فشار B و B' را مساوی قرار داده و ρ_2 را به دست می‌آوریم.


$$P_B = P_{B'} \Rightarrow \rho_1 g h_1 + P_0 = \rho_2 g h_2 + P_0 \Rightarrow 4(40 - 8) = \rho_2(28 - 8)$$

$$\Rightarrow \rho_2 = 6/4 \text{ g/cm}^3$$




بازی با سؤال: با توجه به شکل، اگر مایع‌ها در حال تعادل باشند، x چند

سانتی‌متر است؟ ($\sin 37^\circ = 0.6$)



- ۴ (۱)
- ۵ (۲)
- ۶ (۳)
- ۷ (۴)

پاسخ: با توجه به شکل، زاویه‌ای که شاخه سمت چپ با سطح می‌سازد زاویه 53° است. چون مایع‌ها در دو طرف در تعادل است پس فشار وارد بر A از دو طرف لوله یکسان است.




$$\rho_1 g h_1 = \rho_2 g h_2 + \rho_1 g h_1$$

$$1000 \times 10 \times \frac{0.6x}{100} = 1000 \times 10 \times \frac{(7/8 - 0.6x)}{100} + 1000 \times 10 \times \frac{0.6x}{100}$$

$$\Rightarrow 0.72 = 0.78 - 0.6x + 0.6x \Rightarrow 0.12x = 0.06 \Rightarrow x = 0.5 \text{ cm}$$

۱ ۳۰۸ B

بازی با سؤال: در شکل زیر، آب و روغن در یک لوله U شکل به حالت تعادل هستند. چگالی روغن درصد از چگالی آب است.




- ۱۵ (۱) بیشتر
- ۱۵ (۲) کمتر
- ۸۵ (۳) کمتر
- ۸۵ (۴) بیشتر

پاسخ: در نقطه‌های هم‌تراز یک مایع ساکن فشار یکسان است:

$$P = P' \Rightarrow P_0 + \rho g h = P_0 + \rho' g h'$$

$$\rho h = \rho' h' \Rightarrow \frac{\rho}{\rho'} = \frac{h'}{h} = \frac{17}{20} \Rightarrow \rho' = 0.85 \rho$$



۱ ۳۰۶ B


پس چگالی روغن، ۱۵ درصد کم‌تر از چگالی آب است.

۱ ۳۰۶ B

خط‌نک: پایین‌ترین سطح مشترک مایع‌ها، با خط‌چین افقی AB را به عنوان خط تراز مشخص می‌کنیم و فشار در این نقاط $P_A = P_B$ است. فشار در نقطه A ناشی از فشار دو مایع بالاسر آن است ($P_A = P_1 + P_2$) اما فشار در نقطه B تنها ناشی از فشار مایع ρ_2 یعنی $P_B = \rho_2 g h_2$ است. فشار هوا را از دو طرف معادله در ذهن خود حذف می‌کنیم. با قرار دادن فشار در A و B. ρ_2 را حساب می‌کنیم:

$$P_B = P_A \Rightarrow \rho_2 h_2 = \rho_1 h_1 + \rho_2 h_2 \Rightarrow 12 \times 27 = 1/24 \times 15 + \rho_2 \times 12$$

$$\Rightarrow \rho_2 = 0.7 \text{ g/cm}^3 = 700 \text{ kg/m}^3$$




۱ ۳۰۷ A

خط تراز از مرز جداکننده دو مایع را رسم می‌کنیم. فشار در نقطه C و D یکسان است. ارتفاع مایع ρ_1 $h_1 = 12 \text{ cm}$ و ارتفاع مایع ρ_2 برابر $h_2 = 12 - x$ است.

$$P_C = P_D \Rightarrow P_0 + \rho_2 g h_2 = P_0 + \rho_1 g h_1 \Rightarrow \rho_2 h_2 = \rho_1 h_1$$

$$\Rightarrow 2/4(12 - x) = 1/6 \times 12 \Rightarrow (12 - x) = \frac{1/6 \times 12}{2/4} = \frac{16 \times 12}{24}$$

$$\Rightarrow 12 - x = 8 \Rightarrow x = 4 \text{ cm}$$



۱ ۳۰۸ B

خط‌نک: برای حل مسائل لوله‌های U شکل، اولین کار رسم خط تراز و برابر قرار دادن فشار نقاط روی خط تراز است.

ابتدا خط تراز را می‌کشیم، فشار روی خط تراز با هم برابر است:



۳۱۰ (ب) ابتدا h_1 را به کمک ریاضی برحسب l_1 به دست می‌آوریم. ضلع


روبه‌رو به زاویه 30° نصف وتر است.

$$h_1 = \frac{l_1}{2}$$

۲ دو نقطه B و C روی خط تراز بوده و فشار آنها با هم برابر است.


$$P_B = P_C \Rightarrow P_0 + \rho_1 g h_1 = P_0 + \rho_2 g h_2 \xrightarrow{\rho_1 = \sqrt{3} \rho_2}$$

$$\sqrt{3} \rho_2 \times \frac{l_1}{2} = \rho_2 \times l_2 \Rightarrow \frac{l_1}{l_2} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$



۳۱۱ (ب) در تحلیل این مسئله باید از تعریف اصلی فشار $P = \frac{F}{A}$ استفاده کرد که

در آن همان نیروی وزن و زنده‌ها است. با قرار دادن وزنه‌ای به جرم m روی پیستون‌ها، فشار در زیر پیستون به اندازه $\frac{W}{A}$ افزایش می‌یابد و چون $A_1 < A_2$ ، بنابراین $\Delta P_1 > \Delta P_2$ ، بنابراین افزایش فشار در شاخه (۱) بیشتر بوده و باعث می‌شود مایع در شاخه (۲) بالا برود.



بازی با سؤال در شکل مقابل جرم

و اصطکاک پیستون‌ها ناچیز است و چگالی مایع درون ظرف 800 kg/m^3 است. اگر روی پیستون (۱) که اندازه سطح آن 200 cm^2 است، وزنه 480 گرمی قرار دهیم، پیستون (۲) چند سانتی‌متر بالاتر از پیستون (۱) قرار می‌گیرد؟ (سطح مقطع پیستون‌ها یکسان است.)

- (۱) ۳ (۲) ۶
(۳) ۰/۶ (۴) ۰/۳

پاسخ خط تراز را رسم می‌کنیم. فشار

در نقاط A و B را برابر قرار می‌دهیم. فشار در نقطه A برابر فشار وزنه $\frac{W}{A}$ و فشار هواست. فشار در نقطه B ناشی از فشار ستون h از مایع و فشار هواست. بنابراین می‌توان نوشت:

$$P_A = P_B \Rightarrow P_0 + \frac{W}{A} = P_0 + \rho g h$$

$$\Rightarrow \frac{W}{A} = \rho g h \Rightarrow \frac{480}{200 \times 10^{-4}} = 800 \times 10^3 \times h$$

$$\Rightarrow h = 0.03 \text{ m} = 3 \text{ cm}$$

۳۱۲ (ب) بار رسم خط تراز مطابق شکل، فشار نقاط A و B روی خط تراز با هم برابر است.


فشار نقطه A ناشی از وزن جسم $(\frac{W}{A})$ و فشار هواست و فشار در نقطه B فشار ستون مایع

$$(h = H - 0.1) \text{ و فشار هواست. (در ذهن خود فشار هوا را از طرفین حذف کرده‌ایم.)}$$

$$P_A = P_B \Rightarrow \frac{W}{A} = \rho g h \Rightarrow \frac{m g}{A} = \rho g h \Rightarrow \frac{m}{A} = \rho h$$

$$\frac{m = 1/2 \text{ kg}}{\rho = 1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3} \rightarrow \frac{1/2}{1000} = 1000 \times (H - 0.1)$$

$$\Rightarrow 0.2 = H - 0.1 \Rightarrow H = 0.3 \text{ m} \Rightarrow H = 30 \text{ cm}$$




۳۱۳ (ب) ابتدا خط تراز را می‌کشیم (خط‌چین)، فشار نقاط هم تراز برابر است، دقت کنید فشار حاصل از پیستون‌ها و جرم روی آنها از رابطه $P = \frac{F}{A}$ محاسبه می‌شود. فشار در نقطه A ناشی از

وزن پیستون بزرگ و فشار در نقطه B ناشی از فشار ستون مایع $(\rho g h)$ و فشار حاصل از نیروی F $(P = \frac{F}{A})$ است. (در ذهن خود فشار هوا از طرفین را حذف می‌کنیم.)


$$P_A = P_B \Rightarrow \frac{W}{A} = \frac{F}{a} + \rho g h \Rightarrow \frac{1600}{400 \times 10^{-4}} = \frac{F}{800 \times 10^{-4}} + 800 \times 10^3 \times 2/5$$

$$\Rightarrow 4 \times 10^4 - 2 \times 10^4 = \frac{F}{8 \times 10^{-3}} \Rightarrow F = 160 \text{ N}$$

۳۱۴ (ا) فشار در A برابر فشار هوا P_0 است، اما فشار در B برابر مجموع فشار حاصل از مایع و P_0 است، پس $P_B > P_A$. از طرفی نقطه C در عمق بیشتری از B قرار داشته و $P_C > P_B$ خواهد بود، بنابراین $P_C > P_B > P_A$ است.



۳۱۵ (ب) نکته در لوله‌های U شکل، مایعی که ته‌نشین می‌شود دارای چگالی بیشتری است $\rho_B > \rho_A$. فشار در نقاط A و B ناشی از فشار مایع بالای آنها و فشار هواست.



ارتفاع نقاط A و B را از سطح آزاد مایع‌ها داریم:

$$P_A = \rho_A g x + P_0$$

$$P_B = \rho_B g x + P_0 \xrightarrow{\rho_B > \rho_A} P_B > P_A$$

۳۱۶ (ب) مایعی که ته‌نشین شده مایع با چگالی بیشتری یعنی ρ_2 است.

یادآوری: اختلاف فشار در دو نقطه از یک مایع ساکن از رابطه $\Delta P = \rho g \Delta h$ به دست می‌آید که Δh فاصله قائم آن دو نقطه است. اختلاف فشار نقاط A و B برابر


$$\Delta P_{AB} = \rho_1 g (A - B) \xrightarrow{\rho_1 = 1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3}$$

$$\Delta P_{AB} = 1000 \times 10 \times 0.2 = 2000 \text{ Pa}$$

می‌توان نوشت:

$$\begin{cases} P_C = P_A + \rho_f gh \\ P_D = P_B + \rho_f gh \end{cases} \xrightarrow{P_C = P_D} P_A + \rho_f gh = P_B + \rho_f gh$$

$$P_A = P_B + (\rho_1 - \rho_f)gh \Rightarrow P_A = P_B + 200 \times 10 \times \frac{5}{100} \Rightarrow P_A = P_B + 100$$



نکته در یک لوله U شکل برای دو نقطه مقابل هم مانند B و B'، نقطه‌ای که در مایع با چگالی کمتر است، دارای فشار بیشتری است: $(P_A > P_{A'}, P_B > P_{B'})$

۱ مایع $\rho' > \rho$ ته‌نشین شده بنابراین چگالی آن از ρ بیشتر است:


یادآوری: اختلاف فشار بین دو نقطه از یک مایع متناسب با اختلاف عمق قائم دو نقطه است $(\Delta P = \rho g \Delta h)$

۲ اختلاف فشار A و B و همچنین اختلاف فشار B' و A' را می‌نویسیم:


$$\begin{cases} \Delta P_{AB} = \rho gh \\ \Delta P_{A'B'} = \rho' gh \end{cases} \xrightarrow{\rho' > \rho} \Delta P_{AB} < \Delta P_{A'B'}$$

$$\Rightarrow P_A - P_B < P_{A'} - P_{B'} \Rightarrow \overbrace{P_A - P_{A'}}^{\Delta P_1} < \overbrace{P_B - P_{B'}}^{\Delta P_2} \Rightarrow \Delta P_1 < \Delta P_2$$

راه‌حل دیگر: یک راه‌حل مفهومی. فشار نقاط واقع بر خط تراز با هم برابر است و اختلاف



فشار بین C و C' صفر است. یعنی اگر از نقاط A و A' به سوی نقاط C و C' برویم اختلاف فشار در حال کاهش است. بنابراین اگر از C و C' به سوی سطح دو مایع حرکت کنیم اختلاف فشار در حال افزایش بوده $\Delta P_{AA'} < \Delta P_{BB'}$ است.




نکته: مسئله خوبی است، اما دقت لازم دارد. تکلیف چگالی ρ_f مشخص است مایع ρ_f ته‌نشین شده از این رو چگالی ρ_f از چگالی دو مایع دیگر بیشتر است یعنی ما باید رابطه چگالی ρ_1 و ρ_f را مشخص کنیم.

۱ خط تراز را رسم می‌کنیم. فشار نقاط A و B واقع بر خط تراز برابر است. $P_A = P_B$

۲ خط جدایی مایع ρ_f و ρ_1 یعنی خط CD را رسم می‌کنیم. فشار در نقطه D به اندازه $\rho_f g \Delta h$ از فشار نقطه B کمتر است. $(P_D = P_B - \rho_f g \Delta h)$ و فشار در نقطه C به اندازه $\rho_f g \Delta h$ از فشار نقطه A کمتر است. از این رو می‌توان نوشت:

$$\begin{cases} P_C = P_A - \rho_f g \Delta h \\ P_D = P_B - \rho_f g \Delta h \end{cases} \xrightarrow{P_A = P_B, \rho_f > \rho_1} P_D < P_C \Rightarrow \rho_f gh < \rho_1 gh \Rightarrow \rho_f < \rho_1$$

بنابراین $\rho_f > \rho_1 > \rho_f$ خواهد بود.



۳ **نکته:** با توجه به خط تراز در حالت اول داریم:

$$\begin{aligned} P_A = P_B &\Rightarrow \rho_1 h_1 = \rho_f h_2 \\ \Rightarrow 13/6 h_1 &= 1/36 h_2 \\ \Rightarrow h_2 &= 10 h_1 \Rightarrow h_2 = 10 \text{ cm} \end{aligned}$$

در واقع همواره ارتفاع بالای خط تراز مایع ρ_f ده برابر ارتفاع بالای خط تراز مایع ρ_1 است. در حالت دوم ارتفاع مایع ρ_f ۵cm می‌شود پس ارتفاع مایع بالای خط تراز مایع ρ_1 باید ۵ سانتی‌متر باشد.

میانبری: ارتفاع تا خط تراز با چگالی نسبت وارون دارد. $\frac{h_2}{h_1} = \frac{\rho_1}{\rho_f}$

۳ با رسم خط تراز، و برابر قرار دادن فشار در نقاط M و N، چگالی ρ_f را به دست می‌آوریم.

$$P_N = P_M \Rightarrow \rho_f gh_f = \rho_1 gh_1 \Rightarrow \rho_f \times 20 = 800 \times 60 \Rightarrow \rho_f = 2400 \text{ kg/m}^3$$

۴ اختلاف فشار بین نقاط C و D واقع در مایع ρ_f را حساب می‌کنیم.

$$\Delta P_{CD} = \rho_f g (h_{CD}) = 2400 \times 10 \times (0/12) \Rightarrow \Delta P_{CD} = 2880 \text{ Pa}$$

۵ در این صورت خواهیم داشت:

$$\frac{\Delta P_{AB}}{\Delta P_{CD}} = \frac{1600}{2880} = \frac{200}{360} = \frac{5}{9}$$


۴ **۳۱۷** مایعی که در زیر قرار می‌گیرد چگالی بزرگ‌تری دارد، بنابراین چگالی مایع

در B (ρ_f) بیشتر از چگالی مایع در A (ρ_1) است. در نقاط M و N که روی خط تراز قرار دارند فشارها یکسان است.

برای مقایسه فشار در نقطه M و N می‌توانیم فشار در نقطه M را مجموع فشار نقطه A (P_A) و فشار ستون h' از مایع ρ_1 یعنی $(P_M = P_A + \rho_1 gh')$ و همچنین فشار در نقطه N را مجموع فشار نقطه B (P_B) و فشار ستون h' از مایع ρ_f فرض کرده و بنویسیم:

$$P_M = P_N \Rightarrow \rho_1 gh' + P_A = \rho_f gh' + P_B \xrightarrow{\rho_f > \rho_1} P_B < P_A$$

فشار نقاط هم‌عمق در یک مایع ساکن با هم برابر است. دو نقطه C و D هر دو در یک عمق از مایع ρ_f قرار دارند. بنابراین فشار در این نقاط برابر است. $(P_C = P_D)$



۳ **۳۱۸** خط تراز را رسم می‌کنیم. فشار در نقطه C و D را مساوی قرار داده و h' را حساب می‌کنیم. (البته در ذهنمان P_0 را حذف می‌کنیم.)


$$P_C = P_D \Rightarrow \rho' gh' = \rho gh \Rightarrow 1/2 h' = 0/8 \times 60 \Rightarrow h' = 4 \text{ cm}$$

۲ عمق نقطه B از سطح مایع ρ را به دست می‌آوریم.

$$h_B = h - h' = 60 - 40 = 20 \text{ cm}$$

۳ فشار در نقطه B خواهد شد:

$$\begin{aligned} P &= P_0 + \rho gh_B \Rightarrow P_B = 10^5 + (0/8 \times 1000) \times 10 \times 0/2 \\ \Rightarrow P_B &= 101600 \text{ Pa} \Rightarrow P_B = 101/6 \text{ kPa} \end{aligned}$$




۴ **۳۱۹** دو مایع با چگالی مختلف در

لوله ریختیم. مایعی که چگالی بیشتری دارد ($\rho_1 = 1000 \text{ kg/m}^3$) زیر مایع دیگر ($\rho_f = 800 \text{ kg/m}^3$) قرار می‌گیرد. عمق نقاط A و B را از سطح آزادشان نداریم اما ارتفاع آن‌ها از خط تراز داده شده است، با توجه به شکل C و D روی خط تراز بوده و هم‌فشار هستند. P_C را با P_D برابر قرار داده مسئله را حل می‌کنیم.

فشار در نقطه C برابر مجموع فشار نقطه A و فشار ستون h از مایع ρ_f است و همچنین فشار در نقطه D برابر مجموع فشار نقطه B و فشار ستون h از مایع ρ_1 است. بنابراین

۳ خط تراز را کشیده و با توجه به هم فشار بودن نقاط M و N سؤال را حل می‌کنیم.

$$P_N = P_M \Rightarrow P_0 + \rho_w g h_w = P_0 + \rho_{Hg} g h_{Hg} \xrightarrow{\substack{\rho_{Hg} = 13/6 \text{ g/cm}^3 \\ h_{Hg} = 2x}} \\ \rho_w \times 27/2 = \rho_{Hg} \times h_{Hg} \Rightarrow 1 \times 27/2 = 13/6 \times h_{Hg} \Rightarrow h_{Hg} = 2 \text{ cm}$$



بازی با سؤال در دو لوله مرتبط که سطح مقطع آن‌ها متفاوت است جیوه

وجود دارد. اگر در لوله پهن‌تر که سطح مقطع آن 2 cm^2 است به اندازه 272

سانتی‌متر مکعب آب بریزیم، اختلاف سطح جیوه در دو لوله چند سانتی‌متر

می‌شود؟ ($\rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3$ و $\rho_{\text{Hg}} = 13/6 \text{ g/cm}^3$)

$$10 \text{ (4)} \quad 5 \text{ (3)} \quad 1 \text{ (2)} \quad 0/5$$


پاسخ مسئله بسیار ساده‌ای است. اختلاف قطر سطح مقطع لوله در دو طرف

شما را گول نزند. در واقع دو مایع در یک طرف U شکل ریخته شده است و از شما

خواسته شده که ارتفاع جیوه را از سطح مشترک دو مایع یعنی همان خط هم‌تراز

به‌دست آورید. در واقع به حالت اول مسئله کاری نداریم. ابتدا ارتفاع آب درون

لوله را حساب می‌کنیم.



$$h_{\text{آب}} = 272 = 20 \times h_{\text{آب}} \Rightarrow h_{\text{آب}} = 13/6 \text{ cm}$$

اکنون به راحتی فشار در نقاط A و B را برابر قرار داده و مسئله را حل می‌کنیم.

$$P_A = P_B \Rightarrow \rho_{Hg} g h_{Hg} = \rho_{\text{آب}} g h_{\text{آب}} \Rightarrow 13/6 \times h_{Hg} = 1 \times 13/6 \Rightarrow h_{Hg} = 1 \text{ cm}$$

به همین راحتی مسئله حل شد و اختلاف قطر دهانه‌ها در حل این مسئله نقشی ندارد.

تربیت ۲

۳۳۶ ابتدا کنار لوله U شکل سؤال، لوله U شکل دیگری رسم می‌کنیم و نفت را

به شاخه سمت چپ آن اضافه می‌کنیم. برای اینکه بتوانیم دو حالت را باهم مقایسه کنیم،

خط هم‌تراز سطح آب در لوله اول را روی لوله دوم مشخص می‌کنیم. حجم آبی که در

شاخه سمت چپ پایین رفته با حجم آبی که در شاخه سمت راست بالا می‌آید برابر است.


$$\Delta V = \pi(r)^2 \times x = \pi(r')^2 \times x' \Rightarrow x' = 9x$$

یعنی وقتی در شاخه سمت چپ نفت روی آب ریخته می‌شود و آب به اندازه X پایین

می‌رود در شاخه سمت راست آب به اندازه 9X بالا می‌رود و سطح آب در شاخه سمت

راست 10X بالاتر از خط هم‌تراز جدید است.

برای لوله دوم خط تراز را می‌کشیم:




$$P_M = P_N \Rightarrow \rho_{\text{نفت}} g h_{\text{نفت}} = \rho_{\text{آب}} g h_{\text{آب}}$$

$$\Rightarrow 0/8 \times 5 = 1 \times (10x) \Rightarrow x = 0/4 \text{ cm}$$

میزان آبی که در شاخه باریک بالا رفته برابر است با:

$$x' = 9x = 9 \times 0/4 = 3/6 \text{ cm}$$



۳۳۳ مایع‌ها در لوله U

شکل مطابق شکل روبه‌رو قرار

می‌گیرند. (دقت کنید همواره

مایع با چگالی کمتر ارتفاع بین

خط تراز و سطح آزادش بزرگتر

است.) خط هم‌تراز را رسم کرده، فشار در نقاط هم‌تراز را مساوی قرار می‌دهیم:

$$P_A = P_B \Rightarrow \rho_w h_w = \rho_{Hg} h_{Hg}$$

$$1000 \times \frac{34}{100} = 13600 \times h_{Hg} \Rightarrow h_{Hg} = \frac{1}{40} \text{ m} = 2/5 \text{ cm}$$

اختلاف سطح آزاد دو مایع که روی شکل با X نشان داده‌ایم برابر است با:

$$x = h_w - h_{Hg} = 34 - 2/5 = 31/5 \text{ cm}$$

۳۳۴

خط‌نکته: در حل این مسائل بهترین روش این است که در حالت اول و دوم دو شکل

را کنار هم رسم کرده و تغییرات در دو مایع را در دو شکل با هم مقایسه کنید.

۱ در حالت اول مطابق شکل در لوله تنها آب وجود دارد. لوله‌ای مشابه حالت (۱)

کنار آن رسم می‌کنیم و به ارتفاع 8 cm نفت در این لوله اضافه می‌کنیم. قرار دادن دو

لوله کنار هم به ما در مقایسه جابه‌جایی آب نسبت به حالت اول کمک می‌کند، به همین


دلیل سطح ابتدایی آب در دو شاخه حالت (۱) را در حالت (۲) نیز مشخص می‌کنیم. آب

نسبت به مکان قبل به اندازه x cm پایین آمده است.

۲ به همان اندازه که آب در شاخه سمت چپ پایین آمده است (به دلیل ریختن نفت)

به همان اندازه آب در شاخه سمت راست بالا رفته است.

$$\Delta V_{\text{آب در شاخه چپ}} = \Delta V_{\text{آب در شاخه راست}} \Rightarrow Ax = Ax' \Rightarrow x = x'$$



حالت (۱)

حالت (۲)

۳ خط تراز لوله جدید را کشیده و با توجه به هم‌فشار بودن نقاط M و N روی خط

تراز داریم:

$$P_M = P_N \Rightarrow \rho_{\text{آب}} h_2 = \rho_{\text{نفت}} h_1 \Rightarrow \rho_{\text{آب}} \times 2x = \rho_{\text{نفت}} \times 8 \Rightarrow 1 \times 2x = 0/8 \times 8$$

$$\Rightarrow 2x = 6/4 \text{ cm} \Rightarrow x = 3/2 \text{ cm}$$

۳۳۵

خط‌نکته: مسئله ساده‌ای است، کافی است شکل مسئله را در حالت دوم یعنی پس از

افزودن آب رسم کنید و با رسم خط تراز، فشار نقاط واقع بر خط تراز را مساوی قرار دهید

($P_M = P_N$) و اختلاف ارتفاع جیوه در دو طرف (h_{Hg}) را به‌دست بیاورید. البته

ابتدا باید ارتفاع آب را

حساب کنید.

۱ ابتدا با توجه به جرم

آب اضافه شده و چگالی

آب حجم آب اضافه شده را

به‌دست می‌آوریم:



$$\rho_{\text{آب}} \frac{m}{V} \Rightarrow V_{\text{آب اضافه شده}} = \frac{m}{\rho} = \frac{54/4}{1} = 54/4 \text{ cm}^3$$

۲ حجم آب اضافه شده برابر $A h_{\text{آب}}$ است که سطح مقطع برابر سطح مقطع لوله و

2 cm است.

$$V_{\text{آب اضافه شده}} : A h_{\text{آب}} \Rightarrow 54/4 = 2 \times h_{\text{آب}} \Rightarrow h_{\text{آب}} = 27/2 \text{ cm}$$

حجم روغن برابر $V_0 = Ah_0 = 2 \times \frac{35}{4} = 35 \text{ cm}^3$ است که با توجه به چگالی روغن می‌توان جرم روغن اضافه شده را به دست آورد.

$$\rho_{\text{روغن}} = \frac{m_{\text{روغن}}}{V_{\text{روغن}}} \Rightarrow m_{\text{روغن}} = \rho_{\text{روغن}} V_{\text{روغن}}$$

$$\Rightarrow m_{\text{روغن}} = 0.8 \text{ g/cm}^3 \times 35 \text{ cm}^3 = 28 \text{ g}$$

روش دیگر: برای اینکه جرم روغن را به دست آوریم در مرحله (۳) می‌توان نوشت:


$$P_M = P_N \Rightarrow \frac{m_{\text{روغن}} g}{A} = \rho_{\text{آب}} g h_{\text{آب}} \Rightarrow \frac{m_{\text{روغن}}}{2 \times 10^{-4}} = 1000 \times 14 \times 10^{-2}$$

$$m_{\text{روغن}} = 28 \times 10^{-1} \text{ kg} = 28 \text{ g}$$

بازی با سؤال در شکل زیر اگر در شاخه سمت چپ آب بریزیم

($\rho = 1 \text{ g/cm}^3$) تا طول ستون آب ۱۸ سانتی‌متر شود، سطح آزاد مایع در شاخه

سمت راست در چه فاصله‌ای از کف ظرف قرار می‌گیرد؟




$$63 \text{ (۴)} \quad 65 \text{ (۳)} \quad 66 \text{ (۲)} \quad 69 \text{ (۱)}$$

پاسخ شکل را در دو حالت در کنار هم می‌کشیم، مایع در لوله سمت چپ به اندازه x_1 پایین می‌رود و در سمت راست به اندازه x_2 بالا می‌رود. با توجه

به شکل: $P_A = P_B \Rightarrow \rho_1 g h_1 = \rho_2 g h_2 \Rightarrow 1 \times 18 = 2 \times x_2 \Rightarrow h_2 = 9 \text{ cm}$

از طرفی حجم مایعی که در سمت چپ و سمت راست جابه‌جا شده، یکسان است، از این رو:

$$A_1 x_1 = A_2 x_2 \Rightarrow A_1 (x_1) = 2 A_2 x_2 \Rightarrow x_1 = 2 x_2$$



با توجه به شکل، h_2 جمع x_1 و x_2 است، از این رو:

$$h_2 = x_1 + x_2 \xrightarrow{x_1 = 2x_2} 9 = 3x_2 \Rightarrow x_2 = 3 \text{ cm}$$

در این صورت فاصله سطح مایع از کف ظرف خواهد شد: $H = 60 + 3 = 63 \text{ cm}$

گزینه ۴

۱ ۳۲۹

خط‌نکته: با قرار دادن بیستون روی شاخه سمت چپ، آب آنقدر در این شاخه پایین می‌رود و در شاخه دیگر بالا می‌آید تا فشار آب در سمت راست با فشار بیستون در سمت چپ برابر شود. شکل را در دو حالت کنار هم رسم کنید. حجم آبی که در سمت چپ پایین می‌رود را با حجم آب سمت راست که بالا می‌رود برابر قرار دهید تا نسبت جابه‌جا شدن آب در دو شاخه مشخص شود و مسئله را حل کنید.

نسبت x' به x را به دست می‌آوریم.

$$\Delta V = \Delta V' \Rightarrow Ax = A'x' \Rightarrow 4x = 1x' \Rightarrow x' = 4x$$

خط تراز را رسم می‌کنیم. ارتفاع آب در سمت راست خواهد شد:

$$h_W = x + x' = x + 4x = 5x$$

فشار در نقاط هم‌تراز را برابر قرار می‌دهیم.

$$P_M = P_N \Rightarrow P_0 + \frac{mg}{A} = P_0 + \rho g h_W \Rightarrow \frac{75 \times 10^{-3}}{4 \times 10^{-4}} = 1000 \times (5x)$$

$$\Rightarrow x = 0.0375 \text{ m} \Rightarrow x = 3.75 \text{ cm}$$

۱ ۳۲۷ قطر شاخه سمت راست ۴ cm و قطر شاخه سمت چپ ۱ cm است، در این صورت نسبت مساحت سطح دو شاخه خواهد شد:

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{\pi r_1^2}{\pi r_2^2} = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \Rightarrow \frac{A_1}{A_2} = 16 \Rightarrow A_1 = 16A_2$$

اگر به شاخه سمت چپ مایع اضافه کنیم و مایع در سمت چپ به اندازه x پایین برود، مایع سمت راست به اندازه $\frac{x}{16}$ بالا می‌رود.

$$\Delta V_1 = \Delta V_2 \Rightarrow A_1 x_1 = A_2 x_2 \Rightarrow \frac{x_1}{x_2} = \frac{A_2}{A_1} \Rightarrow \frac{x_1}{x_2} = \frac{A_2}{16A_2} \Rightarrow x_1 = \frac{x_2}{16}$$

با توجه به فرض مسئله $\frac{x}{16}$ برابر ۲ cm است. بنابراین $x = 32 \text{ cm}$


خط تراز جدید را رسم کرده و فشار در نقاط روی خط تراز را برابر قرار می‌دهیم.

ارتفاع مایع سمت راست از خط تراز برابر است با:

$$P_N = P_M \Rightarrow P_0 + \rho_1 g h_1 = P_0 + \rho_2 g h_2 \Rightarrow 2 \times h_1 = 4 \times 34 \Rightarrow h_1 = 68 \text{ cm}$$

حجم مایع ρ_2 خواهد شد:


$$V_2 = A_2 h_2 = \pi r_2^2 h_2 = 2 \times (\pi/4) \times 68 \Rightarrow V_2 = 51 \text{ cm}^3$$



۱ ۳۲۸ لوله U شکلی مشابه لوله U شکل سؤال کنار آن رسم می‌کنیم تا

تغییرات را در لوله جدید نشان دهیم. برای مقایسه دو شکل با هم سطح آب در لوله (۱)

را در لوله (۲) نیز، توسط خط‌چین نشان داده‌ایم:



حجمی که آب در سمت چپ به دلیل اضافه شدن روغن پایین می‌آید برابر افزایش حجم آب در سمت راست است که نسبت به حالت قبل بالا می‌رود.


$$\Delta V_{\text{چپ}} = \Delta V_{\text{راست}} \xrightarrow{\Delta V = Ah}$$

$$2 \times x = 5 \times x' \Rightarrow 2 \times x = 5 \times 4 \Rightarrow x = 10 \text{ cm}$$

برای شکل دوم خط تراز کشیده و با توجه به $P_M = P_N$ داریم:

$$P_M = P_N \Rightarrow \rho_{\text{روغن}} h_{\text{روغن}} = \rho_{\text{آب}} h_W \Rightarrow 0.8 \times h = 1 \times (10 + 4)$$

$$\Rightarrow h_{\text{روغن}} = \frac{14}{0.8} = \frac{140}{8} = \frac{35}{2} \text{ cm}$$




۲ ارتفاع ستون h_p خواهد شد: $h_p = 10 - 2x = 10 - 2 \times 1 \Rightarrow h_p = 8 \text{ cm}$

۵ حجم مایع ρ_p خواهد شد: $V_p = Ah_p = 2 \times 8 = 16 \text{ cm}^3$


۳۳۲ (۱) فشار نقطه M را در حالت ابتدایی به دست می‌آوریم:

$P_M = P_0 + \rho gh \Rightarrow P_M = P_0 + 1000 \times 10 \times 0.4 \Rightarrow P_M = P_0 + 4000$



حالت اول: اگر 900 cm^3 روغن به سمت راست اضافه شود، جابه‌جایی آب در لوله را بررسی می‌کنیم. برای این منظور ابتدا لوله U شکلی شبیه به لوله U شکل سؤال در کنار آن رسم می‌کنیم. سطح آزاد آب را در

لوله جدید مشخص می‌کنیم، با اضافه شدن روغن به سمت راست، آب در این شاخه پایین آمده و در شاخه دیگر بالا می‌رود. دقت کنید که حجم آب پایین آمده در یک شاخه با حجم آب بالا رفته در شاخه دیگر با هم برابر است.



$\pi(3)^2 = 9\pi$ $\pi(6)^2 = 36\pi$

$\Delta V = A_1 h_1 = A_2 h_2 \Rightarrow A_1 h_1 = A_2 h_2$

$9\pi x' = 36\pi x \Rightarrow x' = 4x$

حال ارتفاع روغن را نیز به دست می‌آوریم:


روغن در شاخه سمت راست است \rightarrow $V_{\text{روغن}} = 900 \text{ cm}^3 \Rightarrow Ah_{\text{روغن}} = 900$
 $A = 36\pi$

$36\pi \times h_{\text{روغن}} = 900 \Rightarrow h_{\text{روغن}} = \frac{25}{3} \text{ cm}$

خط تراز را برای لوله U شکل جدید کشیده و با توجه به $P_A = P_B$ مقدار x را به دست می‌آوریم:


$P_A = P_B \Rightarrow \rho_{\text{آب}} gh_{\text{آب}} = \rho_{\text{روغن}} gh$ ساده می‌کنیم \rightarrow g را از دو طرف

$1000 \times (4x + x) = 600 \times (\frac{25}{3}) \Rightarrow \Delta x = 5 \Rightarrow x = 1 \text{ cm}$



حال فشار نقطه M را به دست می‌آوریم:


$P'_M = P_0 + \rho_{\text{آب}} gh \Rightarrow P'_M = P_0 + 1000 \times 10 \times \frac{4}{100} \Rightarrow P'_M = P_0 + 4000$



افزایش فشار M: $P'_M - P_M = P_0 + 4000 - (P_0 + 4000) = 0 \text{ Pa}$

۲ مقدار بالا رفتن آب در سمت راست برابر x' است. از این رو:

$x' = 4x = 4 \times 1 = 1.5 \text{ cm}$



۳۳۰ (۳) حجم 100 g آب را به دست می‌آوریم:

$P = \frac{m}{V} \Rightarrow 1 = \frac{g}{\text{cm}^3} \Rightarrow V_{\text{آب}} = 100 \text{ cm}^3$

۲ اگر آب در لوله ریخته شود، ارتفاع آب در دو شاخه برابر است:

$V_{\text{آب}} = Ah + Ah \Rightarrow 100 = 2 \times 2 \times h \Rightarrow h = 25 \text{ cm}$

۳ حجم روغن را حساب می‌کنیم:

$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow V = \frac{m}{\rho} \rightarrow V_{\text{روغن}} = \frac{100}{0.8} = 125 \text{ cm}^3$

۴ ارتفاع روغن را حساب می‌کنیم. $V_{\text{روغن}} = Ah_{\text{روغن}} \Rightarrow 125 = 2h_{\text{روغن}} \Rightarrow h_{\text{روغن}} = 6.25 \text{ cm}$


۵ خط تراز جدید را رسم می‌کنیم و ارتفاع آب بالای خط تراز را حساب می‌کنیم (البته P_0 را در ذهن خود حذف می‌کنیم).

$P_N = P_M \Rightarrow \rho_{\text{آب}} gh_{\text{آب}} = \rho_{\text{روغن}} gh_{\text{روغن}} \Rightarrow 0.8 \times 5 = 1 \times h_{\text{روغن}} \Rightarrow h_{\text{روغن}} = 4 \text{ cm}$

۶ اختلاف ارتفاع مایع در دو طرف خواهد شد:

$h_{\text{آب}} - h_{\text{روغن}} = 5 - 4 = 1 \text{ cm}$

دقت کردید، جرم آب در حل این مسئله، نقشی ندارد.




۳۳۱ (۴) ارتفاع مایع ρ_p را حساب می‌کنیم.

$V_p = Ah_p \rightarrow V = 20 \text{ cm}^3 \rightarrow 20 = 2h_p \Rightarrow h_p = 10 \text{ cm}$

۲ اکنون با دقت به شکل سمت راست نگاه کنید. وقتی مایع ρ_p را اضافه می‌کنیم

مایع ρ_1 از سمت چپ به اندازه x پایین می‌آید و از سمت راست به اندازه x بالا می‌رود.



۳ اگر خط تراز را رسم کنید، فشار در نقاط A و B برابر است. فشار در نقطه A ناشی

از ارتفاع 10 cm مایع ρ_p و فشار در نقطه B ناشی از ارتفاع $2x$ آب و از ارتفاع

($10 - 2x$) مایع ρ_p است. بنابراین می‌توان نوشت:

$P_A = P_B \Rightarrow \rho_p h_p = \rho_1 (2x) + \rho_p (10 - 2x)$

$\Rightarrow 0.8 \times 10 = 1 \times 2x + 0.8 \times (10 - 2x)$

$\Rightarrow 8 = 2x + 8 - 1.6x \Rightarrow 0 = -0.4x \Rightarrow x = 1 \text{ cm}$