



ویژه آمادگی شرکت در امتحان‌های نهایی و نیمسال

# ریاضی و آمار دوازدهم

(انسانی)

شیدا شاداب



مرورنامه  
شب امتحان

امتحان‌های  
نیمسال اول و  
دوم

امتحان‌های  
درس به درس

پاسخ‌های  
تشریحی +  
کلید تصویج

امتحان‌های  
نهایی اخیر

امتحان‌های  
شبیه‌ساز نهایی

## پیشگفتار

در ابتدا باید یک خداقوت جانانه به شما دانشآموزان عزیز دوازدهمی بگوییم که در حال عبور از یکی از سالهای پرچالش زندگی تان هستید. در این مسیر، یکی از اهداف مهم شما کسب نمره مناسب در امتحان نهایی است. خوشحالم که این کتاب را انتخاب کرده‌اید و با اطمینان به شما می‌گوییم که با مطالعه آن، کسب نمره ۲۰ برای شما آسان می‌شود.

این کتاب کاملاً در چارچوب کتاب درسی نوشته شده است و دارای ویژگی‌های زیر است:

۱ درس‌نامه‌ای کارراه‌بینداز دارد که مطابق فصل‌ها و درس‌های کتاب دسته‌بندی شده است. در هر درس مقاهیم اصلی گفته شده و برای هر مفهوم یا مطلبی که در امتحانات از آن سؤال می‌دهند، مسئله‌ای نمونه حل شده است.

۲ آزمون محور است، تا برای هر آزمون در سطح مدرسه و امتحان نهایی آمادگی لازم را کسب کنید.

۳ پاسخنامه آزمون‌ها بر اساس پاسخنامه‌های امتحانات نهایی بارم‌بندی شده است. شما می‌توانید با مطالعه دقیق آن‌ها به این موضوع بی‌بیرید که قسمت‌های مهم در نوشتن پاسخ چیست؛

۴ همه مطالب کتاب درسی در آزمون‌ها پوشش داده شده‌اند. در این آزمون‌ها هر مطلب کتاب درسی را در قالب حدائق یک مستله مشاهده می‌کنید؛

۵ این کتاب برای هر دانشآموز در هر سطحی مناسب است. دانشآموزان توانمند از این کتاب می‌توانند برای بهبود روش نوشتن خود استفاده کنند. همچنین دانشآموزانی که هنوز به هر دلیلی توانسته‌اند به مطالب کتاب درسی تسلط پیدا کنند، می‌توانند در زمان کوتاه نمره مناسبی کسب کنند.

علاوه بر درس‌نامه، این کتاب دارای ۲۸ آزمون، شامل آزمون‌های ۱۰ نمره‌ای و ۲۰ نمره‌ای است. آزمون‌های درس به درس ۱۰ نمره‌ای هستند و آزمون‌های نیمسال اول، نیمسال دوم و جامع (تألیفی و نهایی سالهای اخیر) ۲۰ نمره‌ای.

سرفصل	تعداد آزمون‌ها	نوع آزمون
هر درس ۱ یا ۲ آزمون	۱۱	درس به درس
فصل اول و فصل دوم (درس اول)	۴	نیمسال اول
فصل دوم (درس دوم) و فصل سوم	۲	نیمسال دوم
تمام کتاب	۵	جامع - شبیه‌ساز نهایی
تمام کتاب	۳	نهایی ۱۴۰۲
تمام کتاب	۳	نهایی ۱۴۰۳

آزمون‌های جامع کاملاً تألیفی هستند و بودجه‌بندی آن‌ها بر اساس امتحان نهایی است. اما در سایر آزمون‌ها از سوالات امتحانات نهایی سال‌های گذشته نیز استفاده شده است. این موضوع به ما و شما کمک می‌کند که به مهم‌ترین هدف کتاب برسیم و آن کسب نمره ۲۰ در امتحان نهایی ریاضی و آمار ۳ است.

در پایان بر خود لازم می‌دانم از همکاران عزیزمان در نشر الگو، دکتر آریس آفانیانس برای مطالعه و ویراستاری علمی کتاب، خانم‌ها فاطمه احمدی و مریم احمدی برای صفحه‌آرایی، خانم مرضیه کریمی برای رسیم شکل‌ها و خانم ستین مختار مسئول واحد ویراستاری و حروف‌چینی تشکر و شیدا شاداب قدردانی کنم.

## فهرست مطالب

۲۰ آزمون ۱۶: نیمسال دوم (۱)	آزمون‌های مرحله‌ای و جامع
۲۱ آزمون ۱۷: نیمسال دوم (۲)	آزمون ۱: فصل اول - درس اول (۱)
۲۳ مروزنامه	آزمون ۲: فصل اول - درس اول (۲)
۴۰ آزمون ۱۸: جامع (۱) - شبیه‌ساز نهایی	آزمون ۳: فصل اول - درس دوم (۱)
۴۱ آزمون ۱۹: جامع (۲) - شبیه‌ساز نهایی	آزمون ۴: فصل اول - درس دوم (۲)
۴۳ آزمون ۲۰: جامع (۳) - شبیه‌ساز نهایی	آزمون ۵: فصل اول - درس سوم (۱)
۴۵ آزمون ۲۱: جامع (۴) - شبیه‌ساز نهایی	آزمون ۶: فصل اول - درس سوم (۲)
۴۷ آزمون ۲۲: جامع (۵) - شبیه‌ساز نهایی	آزمون ۷: فصل دوم - درس اول
۴۹ آزمون ۲۳: جامع (۶) - نهایی خرداد ۱۴۰۲	آزمون ۸: نیمسال اول (۱)
۵۰ آزمون ۲۴: جامع (۷) - نهایی شهریور ۱۴۰۲	آزمون ۹: نیمسال اول (۲)
۵۲ آزمون ۲۵: جامع (۸) - نهایی دی ۱۴۰۲	آزمون ۱۰: نیمسال اول (۳)
۵۳ آزمون ۲۶: جامع (۹) - نهایی خرداد ۱۴۰۳	آزمون ۱۱: نیمسال اول (۴)
۵۵ آزمون ۲۷: جامع (۱۰) - نهایی شهریور ۱۴۰۳	آزمون ۱۲: فصل دوم - درس دوم
۵۷ آزمون ۲۸: جامع (۱۱) - نهایی دی ۱۴۰۳	آزمون ۱۳: فصل سوم - درس اول
۶۰ پاسخ‌های تشریحی	آزمون ۱۴: فصل سوم - درس دوم
	آزمون ۱۵: فصل سوم - درس سوم

# موضع آزمون

## صفحات پاسخ

## ۶۰ تا ۱۶

## فصل اول - درس اول (۱)

# آزمون ۱



ردیف	امتحان نهایی: ریاضی و آمار ۳	رشته: ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی	تألیفی	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
ردیف	سوالات			
۱	درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. الف) $P(A \cap B)$ زمانی رخ می‌دهد که هم پیشامد $A$ و هم پیشامد $B$ رخ داده باشد. ب) تهی یک پیشامد حتمی است. پ) اگر داده دورافتاده نداشته باشیم، میانه معیار مناسبی برای گرایش به مرکز است. ت) در دنباله $\dots, -4, -9, -1$ - ضابطه دنباله به صورت $-n^2 - 3$ است.	درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.	۱	
۲	جاهای خالی را با عدد یا عبارت مناسب پر کنید. الف) فضای نمونه پرتاب یک تاس و دو سکه ..... عضو دارد. ب) اگر در پرتاب یک تاس، $P(A)$ = ..... عدد بزرگتر از ۶ باشد، آن‌گاه ..... پ) ..... داده‌ای است که نصف داده‌ها از آن کمتر و نصف داده‌ها از آن بیشتر هستند. ت) با توجه به الگوی روبرو، تعداد گویی‌ها در شکل دوازدهم برابر ..... است.	جاهای خالی را با عدد یا عبارت مناسب پر کنید.	۲	
	شکل (۱)  ، شکل (۲)  ، شکل (۳)  ...			
۳	گزینهٔ صحیح را انتخاب کنید. الف) با ارقام ۰، ۱، ۲ و ۵ چند رمز سه‌ رقمی می‌توان ساخت؟ ۰۱) $4^3$ ۰۲) $4^2$ ۰۳) $4!$ ۰۴) $48$	گزینهٔ صحیح را انتخاب کنید. الف) با ارقام ۰، ۱، ۲ و ۵ چند رمز سه‌ رقمی می‌توان ساخت؟	۰۱) $4^3$	
	ب) در شکل مقابل، اگر $A$ ، $B$ و $C$ سه پیشامد از فضای نمونه $S$ باشند، کدام گزینه قسمت رنگی را نشان می‌دهد؟ ۰۱) $(A \cup B) - C$ ۰۲) $(B \cup C) - A$ ۰۳) $A - (B \cap C)$ ۰۴) $A - (B \cup C)$	ب) در شکل مقابل، اگر $A$ ، $B$ و $C$ سه پیشامد از فضای نمونه $S$ باشند، کدام گزینه قسمت رنگی را نشان می‌دهد؟	۰۱) $(A \cup B) - C$	
۴	پ) روش نمونه‌گیری مربوط به کدام گام از چرخهٔ آمار است؟ ۰۱) بیان مسئله ۰۲) طرح و برنامه‌ریزی ۰۳) بحث و نتیجه‌گیری ۰۴) تحلیل داده‌ها	پ) روش نمونه‌گیری مربوط به کدام گام از چرخهٔ آمار است؟	۰۱) بیان مسئله	
۵	یک گروه ۹ نفره می‌خواهد با هم عکس یادگاری بگیرند. اگر بخواهیم بین دو نفر مشخص از این گروه دقیقاً ۴ نفر قرار بگیرند، آن‌ها به چند حالت می‌توانند با هم عکس بگیرند؟	یک گروه ۹ نفره می‌خواهد با هم عکس یادگاری بگیرند. اگر بخواهیم بین دو نفر مشخص از این گروه دقیقاً ۴ نفر قرار بگیرند، آن‌ها به چند حالت می‌توانند با هم عکس بگیرند؟	۰۱) $1/25$	
۶	مقدار $n$ را طوری بیاید که رابطه $P(n, 2) = C_4^5$ برقرار باشد.	مقدار $n$ را طوری بیاید که رابطه $P(n, 2) = C_4^5$ برقرار باشد.	۰۱) $10$	
	پیشامدهای ناسازگار $A$ و $B$ را در فضای نمونه $S$ در نظر بگیرید. اگر $P(A') = \frac{1}{6}$ و احتمال رخ دادن $A$ یا $B$ برابر ۹٪ باشد، احتمال رخ دادن $B$ چقدر است؟	پیشامدهای ناسازگار $A$ و $B$ را در فضای نمونه $S$ در نظر بگیرید. اگر $P(A') = \frac{1}{6}$ و احتمال رخ دادن $A$ یا $B$ برابر ۹٪ باشد، احتمال رخ دادن $B$ چقدر است؟	۰۱) $1/25$	

ردیف	سؤالات	نمره
۷	مطابق شکل، فردی می‌خواهد از شهر A به شهر D سفر کند. اگر تعداد کل راه‌های ممکن برابر ۳۶ باشد، تعداد مسیرها از B به C را به دست آورید.	۱
۸	عقربه دستگاه چرخنده مقابل، پس از به حرکت درآمدن روی یکی از ۸ ناحیه می‌ایستد و عددی را نشان می‌دهد (عقربه روی مرز ناحیه‌ها نمی‌ایستد). چقدر احتمال دارد که عقربه روی عددی اول یا عددی کمتر از ۶ قرار بگیرد؟	۰/۷۵
۹	هفت پرچم با شماره‌های ۱ تا ۷ داریم. همچنین ۷ مکان برای قرارگیری پرچم‌ها وجود دارد. اگر این پرچم‌ها به طور تصادفی در این مکان‌ها قرار بگیرند، چقدر احتمال دارد پرچم‌های با شماره غیراول در مکان‌های زوج قرار گرفته باشند؟	۱
۱۰	در یک پارک چنانگی محافظت شده، ۸ بزرگواری وجود دارد. کارشناسان ۳ تای آن‌ها را گرفته‌اند، نشان‌دار کرده‌اند و دوباره آزادشان کرده‌اند. ۵ بزرگواری به طور تصادف انتخاب می‌کنیم. چقدر احتمال دارد حداقل ۲ بزرگواری از آن‌ها نشان‌دار باشد؟	۲
۱۱	از زیرمجموعه‌های سه‌عضوی مجموعه $\{a, b, c, d, e\}$ ، یک زیرمجموعه را به تصادف انتخاب می‌کنیم. چقدر احتمال دارد این زیرمجموعه شامل عضو $d$ باشد؟	۱/۲۵
۱۲	نمودارهای روبه‌رو نمرات دو دانش‌آموز A و B را طی یک سال در یک کلاس نشان می‌دهند. کدام دانش‌آموز عملکرد بهتری داشته است؟ چرا؟	۱/۲۵
۱۳	یکپارچگی چرخه آمار در حل مسائل را به طور خلاصه بیان کنید.	۱
۱۴	الف) جمله عمومی یک دنباله به صورت $a_n = \begin{cases} n^2 - 1 & 1 \leq n < 10 \\ \sqrt{n} & n \geq 10 \end{cases}$ است. حاصل عبارت $a_3 - a_1$ را به دست آورید. ب) جمله چهارم دنباله بازگشتی $a_{n+1} = \frac{1}{a_n} + n$ , $a_1 = 2$ را بیابید.	۱/۵
۱۵	برای اعداد طبیعی فرد متوالی، الف) رابطه بازگشتی بنویسید. ب) ضابطه تابعی (جمله عمومی) بنویسید. پ) چندمین جمله از این دنباله برابر ۹۹ است؟	۱/۷۵
۱۶	اعداد مقابله شیبیه یک مثلث کنار هم قرار گرفته‌اند که به آن مثلث خیام می‌گویند. الف) جمله عمومی (ضابطه تابعی) مربوط به مجموع اعداد هر سطر را بنویسید. ب) مجموع اعداد سطر بیستم را بیابید.	۱
	پیروز و سربلند باشید	۲۰ جمع نمره




ردیف	سوالات	امتحان نهایی: ریاضی و آمار ۳	رشته: ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی	تألیفی	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
۱	<p>درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.</p> <p>(الف) رابطه بازگشتی دنباله <math>\dots, ۱, -۳, ۹, -\frac{1}{3}, \dots</math> به صورت <math>a_{n+1} = (-\frac{1}{3})a_n</math>, <math>a_1 = 9</math> است.</p> <p>(ب) در تابع <math>y = 2^{-x}</math>, با افزایش مقدار <math>x</math>, مقدار <math>y</math> نیز افزایش می‌یابد.</p> <p>(پ) به ازای <math>x &gt; 0</math>, نمودار تابع <math>y = 2^x</math> همواره بالاتر از نمودار تابع <math>y = x</math> است.</p> <p>(ت) حاصل جمع ریشه‌های چهارم عدد <math>\frac{625}{81}</math> برابر صفر است.</p>	۱			
۲	<p>جاهای خالی را با عدد یا عبارت مناسب پر کنید.</p> <p>(الف) رابطه بازگشتی دنباله <math>\dots, ۱۱۰, ۱۰۰, ۹۰, ۸۰, \dots</math> به صورت ..... است.</p> <p>(ب) جمله عمومی دنباله <math>\dots, -۴, ۸, \dots</math> به صورت ..... است.</p> <p>(پ) ریشه سوم عدد <math>-27</math> برابر با ..... است.</p> <p>(ت) اگر <math>f(x) = (\frac{1}{4})^x</math> یک تابع نمایی باشد, آن‌گاه ..... = <math>f(-2)</math>.</p>	۲			
۳	هشتمین جمله یک دنباله حسابی برابر ۶۵ و جمله شانزدهم آن برابر ۱۰۵ است. جمله بیست و نهم این دنباله حسابی را به دست آورید. (دی ۹۸)	۳			۱/۵
۴	در یک دنباله حسابی $a_7 + a_9 + a_{11} = 12$ . جمله هفتم دنباله چند است؟	۴			۱/۲۵
۵	سه عدد را به گونه‌ای میان دو عدد ۱۰ و ۲۲ قرار دهید که یک دنباله حسابی با اختلاف مشترک مثبت تشکیل شود. (شهریور ۱۴۰۱)	۵			۱
۶	<p>با توجه به رابطه <math>\begin{cases} a_{n+1} = 3 + a_n \\ a_1 = -4 \end{cases}</math>, مطلوب است محاسبه <math>S_{14}</math> .</p>	۶			۱/۲۵
۷	در یک دنباله هندسی, جمله چهارم برابر ۵ و جمله هفتم برابر ۱۳۵ است. جمله پانزدهم دنباله را بیابید.	۷			۲
۸	<p>با توجه به دنباله هندسی <math>\frac{a_{12}}{a_9}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \dots</math>, حاصل <math>\frac{a_{12}}{a_9}</math> را به دست آورید.</p>	۸			۰/۷۵
۹	$x$ را طوری بیابید که دنباله $12x-4, 5x+1, 2x+1$ یک دنباله هندسی باشد.	۹			۱
۱۰	<p>(الف) مجموع شانزده جمله اول دنباله اعداد طبیعی فرد را به دست آورید.</p> <p>(ب) مجموع ۱۰ جمله اول دنباله <math>\dots, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}, -1, -\frac{1}{4}</math> را حساب کنید.</p>	۱۰			۲
۱۱	حاصل عبارت‌های زیر را به ساده‌ترین شکل بنویسید.	۱۱			۲
	$(الف) \left(\frac{m^{\frac{1}{2}}}{m^{\frac{1}{2}}}\right)^{-4}$ $(ب) x^{16} \times x^{14} \times x^{8}$ $(پ) (a^{\frac{3}{4}}b^{\frac{1}{2}})^2(a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{2}})^2$				
۱۲	با استفاده از تعریف توان‌های گویا نشان دهید که $\sqrt[2]{4}, \sqrt[4]{4}, \sqrt[7]{25}$ و $\sqrt[10]{10}$ با هم برابرند.	۱۲			۰/۷۵
۱۳	از تساوی مقابل مقدار $x$ را بیابید.	۱۳			۱/۲۵
۱۴	نمودارهای توابع $y = x^{\frac{1}{2}}$ و $y = 2^x$ را در یک دستگاه مختصات رسم و تقاطع‌ها و شباهت‌های آن‌ها را بررسی کنید.	۱۴			۲/۲۵
۱۵	قیمت کالایی امسال ۴۰۰۰ تومان و نرخ تورم سالانه ۲۰ درصد است. سه سال دیگر قیمت این کالا چقدر خواهد شد؟	۱۵			۱
	جمع نمره پیروز و سربرلنگ باشید				۲۰

## فصل دوم

### درس دوم

### دنباله‌های حسابی



• **دنباله حسابی:** دنباله‌ای که در اون هر جمله (به جز جمله اول) از اضافه شدن یه مقدار ثابت به جمله قبل از خودش به دست می‌آید، **دنباله حسابی** هست.

به اون مقدار ثابت **اختلاف مشترک** دنباله گفته می‌شود و اون رو با  $d$  نشون می‌دیم. پس فرم کلی یه دنباله حسابی به صورت زیره:

$$a_1, a_2, a_3, a_4, \dots \Rightarrow a_1 + d, a_1 + 2d, a_1 + 3d, \dots$$

جمله عمومی این دنباله برابر با  $a_n = a_1 + (n-1)d$  است.

#### پیدا کردن اختلاف مشترک دنباله

**۱** اگه دو جمله متولی از دنباله رو داشته باشیم  $(\dots, a_n, a_{n+1}, \dots)$  :

$$d = a_{n+1} - a_n$$

**۲** اگه دو جمله غیرمتولی از دنباله رو داشته باشیم  $(\dots, a_n, \dots, a_m, \dots)$  :

$$d = \frac{a_m - a_n}{m - n}$$

#### مثال

به دنباله‌های حسابی زیر و اختلاف مشترک اونها دقت کن:

الف)  $-4, -1, 2, 5, \dots \Rightarrow d = -1 - (-4) = 3$  یا  $d = 2 - (-1) = 3$  یا  $d = 5 - 2 = 3$

ب)  $\bigcirc, \bigcirc, \bigcirc, 2, \dots \Rightarrow d = \frac{2 - \bigcirc}{5 - 1} = \frac{-14}{4} = -3$

#### توضیح در دنباله حسابی با اختلاف مشترک $d$ :

الف) اگه  $d > 0$ ، دنباله افزایشی هست، یعنی با زیاد شدن شماره جملات، مقدار جملات افزایش می‌یابه.

ب) اگه  $d < 0$ ، دنباله کاهشی هست، یعنی با زیاد شدن شماره جملات، مقدار جملات کاهش می‌یابه.

پ) اگه  $d = 0$ ، دنباله ثابت، یعنی همه جملات دنباله با هم برابرند.

#### مثال

الف) دنباله  $\dots, 21, 17, 13, 9, 5, \dots$  یه دنباله حسابی افزایشی با اختلاف مشترک  $d = 4$  است.

ب) دنباله  $\dots, 1/9, 1/1, 2/5, 2/2, 2/8, 2/4, \dots$  یه دنباله حسابی کاهشی با اختلاف مشترک  $d = -1/3$  است.

پ) دنباله  $\dots, -\frac{2}{7}, -\frac{2}{7}, -\frac{2}{7}, -\frac{2}{7}, -\frac{2}{7}, -\frac{2}{7}, \dots$  یه دنباله حسابی ثابت با اختلاف مشترک  $d = 0$  است.

#### نکته

اگه  $a, b, c$  سه جمله متولی از یه دنباله حسابی باشند، عدد  $b$  میانگین دو عدد  $a$  و  $c$  هست و داریم

$$\frac{\text{مجموع دو جمله کناری}}{2} \Rightarrow b = \frac{a+c}{2} \quad \text{یا} \quad 2b = a+c$$

#### مثال

اگه  $x-1, 3x, 2x+7$  سه جمله متولی یه دنباله حسابی باشند، اون وقت

$$x-1 = \frac{3x+2x+7}{2} \Rightarrow 2(x-1) = 3x+2x+7 \Rightarrow 2x-2 = 5x+7 \Rightarrow -3x = 9 \Rightarrow x = -3$$

## درج k واسطه حسابی بین دو عدد

به دو روش می‌توانیم بین دو عدد a و b تعداد  $k$  جمله (k واسطه) طوری قرار بدم که اعداد حاصل تشکیل دنباله حسابی بدن.

۱ با پیدا کردن اختلاف مشترک به رویی که در بالا گفته شد (قسمت (ب) مثال قبل) می‌توانیم هر تعداد واسطه حسابی بین a و  $a_n = b$  درج کنیم.

$$d = \frac{\text{جمله اول} - \text{جمله آخر}}{\text{تعداد واسطه ها} + 1} = \frac{b - a}{k + 1}$$

۲ می‌توانیم اختلاف مشترک را از فرمول مقابل به دست بیاریم:

مثال

می‌خواهیم بین دو عدد ۳ و  $\frac{9}{2}$  دو عدد درج کنیم (قرار بدم) تا با هم دنباله حسابی بسازن:

$$\text{روش اول: } a_1 = 3, a_4 = \frac{9}{2} \Rightarrow d = \frac{a_4 - a_1}{4-1} = \frac{\frac{9}{2} - 3}{3} = \frac{\frac{9-6}{2}}{3} = \frac{3}{3} = 1 \Rightarrow 3, \frac{7}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{9}{2}$$

$$\text{روش دوم: } a = 3, b = \frac{9}{2}, k = 2 \Rightarrow d = \frac{b - a}{k + 1} = \frac{\frac{9}{2} - 3}{2+1} = \frac{\frac{9-6}{2}}{3} = \frac{3}{3} = 1$$

• **رابطه بازگشتی دنباله حسابی:** در دنباله حسابی، چون در دنباله حسابی هر جمله (a<sub>n+1</sub>) با اضافه شدن یه مقدار ثابت (d) به جمله قبل از خودش

(a<sub>n</sub>) به دست می‌آید، پس رابطه بازگشتی اون همواره به صورت مقابله:

$$a_{n+1} = a_n + d, \quad a_1 = \dots$$

مثال

رابطه بازگشتی دنباله حسابی ... , ۳۰, ۲۵, ۲۰, ۱۵ به صورت مقابله: جمله فعلی = جمله بعدی + ۵

نکته

اگه به جمله عمومی دنباله حسابی دقت کنی، می‌بینی که به صورت معادله یه خط هست ( $y = mx + h$ ). پس هر دنباله حسابی یه تابع خطیه که شبیه خط همون اختلاف مشترک دنباله (d) هست.

## مجموع n جمله اول یه دنباله حسابی

مجموع n جمله اول یه دنباله حسابی رو به صورت زیر حساب می‌کنیم:

$$a_1, a_2, \dots, a_n \Rightarrow S_n = \frac{n}{2} (a_1 + a_n)$$

۱ اگه جمله اول و جمله آخر دنباله مشخص باشه:

$$a_1, a_2, a_3, \dots \Rightarrow S_n = \frac{n}{2} [2a_1 + (n-1)d]$$

۲ اگه جمله آخر دنباله مشخص باشه و اختلاف مشترک برابر d باشه:

در هر فرمول، منظور از n تعداد جملاته!

مثال

الف) مجموع جملات دنباله حسابی مقابل رو حساب می‌کنیم:

$$-1, 4, 9, \dots, 199 \Rightarrow a_1 = -1, \quad a_n = 199, \quad d = 5$$

$$a_n = a_1 + (n-1)d \Rightarrow 199 = -1 + (n-1) \times 5 \Rightarrow 200 = (n-1) \times 5 \Rightarrow n-1 = 40 \Rightarrow n = 41$$

$$S_{41} = \frac{41}{2} (a_1 + a_{41}) = \frac{41}{2} (-1 + 199) = \frac{41}{2} \times 198 = 4059$$

$$a_{n+1} = 5 + a_n, \quad a_1 = -1$$


ب) مجموع ۱۰ جمله اول دنباله حسابی مقابل رو حساب می‌کنیم:


رابطه داده شده رابطه بازگشتی یه دنباله حسابیه. پس اول یه تعداد از جملات دنباله رو پیدا می‌کنیم:

$$\xrightarrow{n=1} \text{جمله دوم} \quad a_{1+1} = 5 + a_1 \Rightarrow a_2 = 5 + (-2) = 3$$

$$\xrightarrow{n=2} \text{جمله سوم} \quad a_{2+1} = 5 + a_2 \Rightarrow a_3 = 5 + 3 = 8$$

$$S_n = \frac{n}{2} [2a_1 + (n-1)d] \Rightarrow S_{10} = \frac{10}{2} [2 \times (-1) + (10-1) \times 5] = 5(-4 + 45) = 5 \times 41 = 205$$



ردیف	سؤالات	تألیفی	رشته: ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی	امتحان نهایی: ریاضی و آمار ۳	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
۱	درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. الف) از بین ۵ کتاب به $P(5, 3)$ طریق می‌توان سه کتاب برای هدیه دادن و به $C^5_3$ طریق می‌توان سه کتاب برای چیدن در کتابخانه انتخاب کرد. ب) تابع $y = \frac{1}{x}$ افزایشی است.	۰/۵			
۲	جاهای خالی را با عدد مناسب پر کنید. الف) جملات ۷۷, ۱۱۳, ..... یک دنباله حسابی تشکیل می‌دهند. ب) اگر احتمال قبولی در امتحان ریاضی $\frac{2}{5}$ باشد، آن‌گاه احتمال قبول نشدن در این امتحان ..... است.	۰/۵			
۳	گزینهٔ صحیح را انتخاب کنید. الف) با ارقام ۸، ۲، ۵ و ۰ چند رمز چهاررقمی با رقم‌های متمایز می‌توان ساخت? ۱) ۱۲(۱) ۲) ۲۴(۳) ۳) ۳۶(۴) ب) با مصرف یک قرص، ۰۵ میلی‌گرم دارو به بدن شخصی وارد می‌شود و پس از هر ساعت، ۱۵ میلی‌گرم از سطح دارو در خونش کاهش می‌باید. چند ساعت پس از مصرف دارو، سطح آن در بدنش به ۱۳ میلی‌گرم می‌رسد؟ ۱) ۷(۱) ۲) ۸(۲) ۳) ۹(۳) ۴) ۱۰(۴) پ) اگر جمعیت شهری با نرخ ۴ درصد در سال در حال افزایش باشد، جمعیت این شهر پس از ۲ سال چند برابر می‌شود؟ ۱) ۱/۰۸۱۶(۱) ۲) ۱/۰۸۲۱(۳) ۳) ۱/۰۸۲(۲) ۴) ۱/۰۸۲۴(۴)	۰/۷۵			
۴	الف) برای نمودار ون داده شده یک عبارت مناسب بنویسید و برای عبارت داده شده یک نمودار ون مناسب رسم کنید.   $(A \cap B)' (2)$	۱/۷۵			
۵	با حروف کلمه «مهرسان» و بدون تکرار حروف: الف) چند کلمهٔ شش حرفی می‌توان ساخت که حروف کلمه «ماه» همواره کنار هم باشند? ب) چند کلمهٔ چهار حرفی می‌توان ساخت که با کلمه «سر» شروع شوند?  دو تاس را با هم پرتاب می‌کنیم. مطلوب است محاسبهٔ احتمال آنکه: الف) هر دو عدد روشنده زوج نباشند. ب) مجموع عددهای روشنده ۸ و یکی از این دو عدد مضرب ۲ باشد.	۱			
۶		۱/۵			

ردیف	سوالات	نمره
۷	<p>ب) پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه دهید.</p> <p>(الف) درصد قبولی دانش‌آموzan دو مدرسه A و B در کنکور به ترتیب ۴۵ درصد و ۶۰ درصد بوده است. تعداد قبولی دانش‌آموzan کدام مدرسه بیشتر است؟ چرا؟</p> <p>(ب) در یک مطالعه آماری برای اندازه‌گیری قد افراد از دو واحد متفاوت استفاده شده است. این مورد مربوط به اجرای نادرست کدام یک از گام‌های چرخه آمار در حل مسائل است؟ این اجرای نادرست بر کدام گام‌های این چرخه اثر می‌گذارد؟</p> <p>(پ) داده‌های زیر، متوسط ساعت‌های مطالعه تعدادی از کارکنان یک اداره در هفته است. کدام معیار پراکندگی و کدام معیار گرایش به مرکز برای توصیف این داده‌ها مناسب است؟ چرا؟</p> <p>۸, ۲, ۶, ۵, ۱, ۳, ۱۸, ۴, ۳, ۵, ۶, ۹</p>	۱/۷۵
۸	<p>الف) ضابطهٔ تابعی دنباله <math>\dots, \frac{5}{2}, -1, 1, -1, 2, -\frac{3}{2}</math>, ... را بنویسید.</p> <p>ب) جملهٔ هفتم دنباله بازگشتی زیر را مشخص کنید.</p> $a_{n+4} = a_n + a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3}, \quad a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = -2$	۱/۵
۹	<p>نمودار یک دنباله خطی به صورت مقابل است.</p> <p>(الف) مجموع ۱۰۰ جملهٔ اول این دنباله را به دست آورید.</p> <p>(ب) یک رابطهٔ بازگشتی برای جملات این دنباله بنویسید.</p>	۱/۵
۱۰	<p>در سالن اجتماعات یک مدرسه، ردیف اول ۱۲ صندلی، ردیف دوم ۱۸ صندلی و ردیف سوم ۲۴ صندلی دارد. اگر صندلی‌های هر ردیف با همین نظم اضافه شوند:</p> <p>(الف) این سالن با ۳۲۴ صندلی چند ردیف دارد؟</p> <p>(ب) در ردیف هفتم چند صندلی وجود دارد؟</p>	۱/۲۵
۱۱	جملهٔ سوم یک دنبالهٔ حسابی از جملهٔ هفتم آن ۶ واحد بیشتر است. اگر جملهٔ اول دنباله برابر ۷ باشد، جملهٔ پانزدهم دنباله را به دست آورید.	۱
۱۲	<p>(الف) اگر <math>x-1</math>, <math>x+1</math> و <math>x+4</math> سه جملهٔ متوالی از یک دنبالهٔ هندسی باشند، نسبت مشترک دنباله را بیابید.</p> <p>(ب) بین دو عدد <math>\frac{1}{8}</math> و ۱ دو واسطهٔ چنان قرار دهید که این چهار عدد یک دنبالهٔ هندسی افزایشی تشکیل دهند.</p>	۱/۵
۱۳	ضابطهٔ بازگشتی یک دنباله به صورت $a_{n+1} = -\frac{1}{3}a_n$ با جملهٔ اول $-6$ است. نوع دنباله و جملهٔ چهارم دنباله را مشخص کنید.	۱
۱۴	<p>(الف) در یک دنبالهٔ هندسی جملهٔ دوم برابر ۱ و جملهٔ پنجم برابر <math>\frac{1}{64}</math> است. جملهٔ اول دنباله را بیابید.</p> <p>(ب) مجموع چند جملهٔ اول دنباله <math>\dots, 10, 30, 90, 270</math> است؟</p>	۱/۷۵
۱۵	<p>(الف) حاصل عبارت زیر را به ساده‌ترین صورت ممکن بنویسید.</p> $\left( \frac{a^{\frac{1}{4}}}{a^{\frac{1}{12}}} \right)^{-24}$ <p>(ب) حاصل عبارت رادیکالی را به صورت یک عبارت توان دار و حاصل عبارت توان دار را به صورت یک عبارت رادیکالی نشان دهید.</p>	۲
۱۶	<p>(الف) نمودار تابع <math>f(x) = (\frac{5}{2})^x</math> را به طور تقریبی رسم کنید.</p> <p>(ب) مقدار <math>f(-2)</math> را به دست آورید.</p>	۰/۷۵
	پیروز و سربلند باشید	جمع نمره
		۲۰



(ب) توجه کنید که

$$\begin{cases} 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24 \\ 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6 \\ 2! = 2 \times 1 = 2 \end{cases} \Rightarrow \frac{4! + 3!}{2!} = \frac{24 + 6}{2} = \frac{30}{2} = 15$$

**۶** (الف) یا باید از میان ۵ توب قرمز ۳ توب انتخاب کنیم یا باید از میان ۴ توب آبی ۳ توب انتخاب کنیم. بنابر اصل جمع، تعداد راههای انجام این کار برابر است با

$$\binom{5}{3} + \binom{4}{3} = \frac{5!}{3!(5-3)!} + \frac{4!}{3!(4-2)!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{3! \times 2!} + \frac{4 \times 3!}{3! \times 1!} = 10 + 4 = 14$$

(ب) باید از میان ۵ توب قرمز ۳ توب واز میان ۴ توب آبی ۲ توب انتخاب کنیم. بنابر اصل ضرب، تعداد راههای انجام این کار برابر است با

$$\binom{5}{3} \times \binom{4}{2} = \frac{5!}{3!(5-3)!} \times \frac{4!}{2!(4-2)!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{3! \times 2!} \times \frac{4 \times 3 \times 2!}{2! \times 2!} = 10 \times 6 = 60$$

**۷** (الف) یا باید از میان ۶ لامپ سالم ۳ لامپ انتخاب کنیم یا باید از میان ۵ لامپ معیوب ۳ لامپ انتخاب کنیم. بنابر اصل جمع، تعداد حالت‌های مطلوب برابر است با

$$\binom{6}{3} + \binom{5}{3} = \frac{6!}{3!(6-3)!} + \frac{5!}{3!(5-3)!} = \frac{6!}{3! \times 3!} + \frac{5!}{3! \times 2!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3! \times 2!} + \frac{5 \times 4 \times 3!}{3! \times 2!} = 20 + 10 = 30$$

(ب) باید هیچ لامپ معیوبی انتخاب نکنیم و ۳ لامپ سالم انتخاب کنیم یا باید یک لامپ معیوب و ۲ لامپ سالم انتخاب کنیم. تعداد حالت‌های مطلوب برابر است با

$$\begin{aligned} & \binom{5}{0} \times \binom{6}{3} + \binom{5}{1} \times \binom{6}{2} \\ &= \frac{5!}{0!(5-0)!} \times \frac{6!}{3!(6-3)!} + \frac{5!}{1!(5-1)!} \times \frac{6!}{2!(6-2)!} \\ &= \frac{5!}{5!} \times \frac{6!}{3!(6-3)!} + \frac{5!}{4!} \times \frac{6!}{2!(6-2)!} = 1 \times \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3! \times 3!} + \frac{5 \times 4!}{4!} \times \frac{6 \times 5 \times 4!}{2 \times 4!} \\ &= 1 \times 20 + 5 \times 15 = 20 + 75 = 95 \end{aligned}$$

**۸** (الف) تعداد زیرمجموعه‌های ۲ عضوی یک مجموعه ۱۱ عضوی برابر

$$\text{است با } \binom{n}{r}.$$

بنابراین

تعداد زیرمجموعه سه عضوی مجموعه شش عضوی A

$$\binom{6}{3} = \frac{6!}{3!(6-3)!} = \frac{6!}{3! \times 3!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3!}{6 \times 3!} = 20.$$

(ب) برای ساختن یک زیرمجموعه چهار عضوی از A که شامل دو عضو b و c است، از میان سایر اعضای A، یعنی چهار عضو a، d، e، f و دو عضو انتخاب می‌کنیم و آنها را به همراه b و c در یک مجموعه قرار می‌دهیم (چون b و c باید داخل زیرمجموعه باشند، اجازه انتخاب فقط دو عضو دیگر را داریم). بنابراین تعداد زیرمجموعه‌های مطلوب برابر است با

$$\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!(4-2)!} = \frac{4!}{2! \times 2!} = \frac{4 \times 3 \times 2!}{2 \times 2!} = 6$$

## پاسخ تشریحی آزمون (۱)



۱ (الف) نادرست. توجه کنید که

$$\frac{2}{5} \times \frac{3}{5} \times \frac{3}{2} = \frac{18}{25} \neq \frac{3!}{2!}.$$

اصل ضرب

(ب) درست.

$$P(7, 3) = \frac{7!}{(7-3)!} = \frac{7!}{4!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4!}{4!} = 7 \times 6 \times 5 = 210.$$

**۲** (الف) ۶. تعداد جایگشت‌های n شیء متمایز برابر n! است. بنابراین باید معادله  $n! = 720$  را حل کنیم. با محاسبه فاکتوریل اعداد حسابی از ابتداء می‌بینیم که  $7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$ . پس  $n = 6$ .

(ب) ۱.

$$\binom{n}{1} = \frac{n!}{1!(n-1)!} = \frac{n!}{(n-1)!} = \frac{n \times (n-1)!}{(n-1)!} = n$$

$$\binom{n}{n} = \frac{n!}{n!(n-n)!} = \frac{n!}{n! \times 0!} = \frac{n!}{n!} = 1$$

(پ) ۱۰. تعداد زیرمجموعه‌های ۲ عضوی یک مجموعه n عضوی برابر است با

$$\binom{5}{2} = \frac{5!}{2!(5-2)!} = \frac{5!}{2! \times 3!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{2 \times 3!}.$$

**۳** (الف) دو جعبه در نظر می‌گیریم. حروف کلمه «خور» را درون یک جعبه و حروف کلمه «شید» را درون جعبه دیگر قرار می‌دهیم. دقت کنید که حروف داخل هر جعبه و همچنین دو جعبه با هم می‌توانند جابه‌جا شوند.

$$\frac{\text{چایه جایی}}{\text{دو خ و ر}} = \frac{\text{شی د}}{\text{شی د}} = \frac{2}{2!} = \frac{6 \times 6 \times 2}{3! \times 2!} = 72$$

(ب) دقت کنید که در این کلمات شش حرفی، سه جایگاه اول تنها یک انتخاب دارند.

$$\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{1} \frac{1}{9} \frac{1}{6} \text{ ش خ یار یا د} = 6$$

$$\xrightarrow{\text{اصل ضرب}} 1 \times 2 \times 3 \times 1 \times 1 = 6$$

**۴** (الف) روش اول: این کتاب، کتاب ریاضی یا کتاب فیزیک یا کتاب ادبیات است. بنابراین طبق اصل جمع

$$\text{ادبیات فیزیک ریاضی} = 9$$

روش دوم: انتخاب یک کتاب از بین ۹ کتاب موجود برابر است با (ترتیب

$$\binom{9}{1} = 9$$

(پ) باید از بین کتاب‌های ریاضی، یک کتاب انتخاب کرد، یعنی انتخاب ۱ شیء

$$\binom{3}{1} = 3$$

از ۳ شیء (بدون ترتیب) که برابر است با

$$\frac{n!}{(n-2)!} = 3 \Rightarrow \frac{n(n-1)(n-2)!}{(n-2)!} = 3 \Rightarrow n(n-1) = 3.$$

$$n^2 - n = 3 \Rightarrow n^2 - n - 3 = 0 \Rightarrow (n-6)(n+5) = 0.$$

$$n = 6, \quad n = -5 \quad (\text{غ.ق.ق.})$$

**۵** (الف) می‌توان نوشت

**۱۱** **(الف)**  $n(S) = 6 \times 2 \times 2 = 24$  بنا بر اصل ضرب داریم

**(ب)** صفر.  $P(A) = \emptyset$ , پس  $A = \emptyset$ .

**(پ)** میانه  $\frac{1}{2}(25)$

**(ت)**  $144$ .  $a_n$  نشان دهنده تعداد گوی ها در شکل  $n$ ام الگو باشد.

آن گاه  $a_n = n^2$ . بنابراین تعداد گوی ها در شکل دوازدهم برابر است با

$$a_{12} = 12^2 = 144$$

**(الف)** گزینه  $(1)$ : لزومی ندارد رقم اول از سمت چپ صفر نباشد. بنابراین

$$\begin{array}{c} \text{اصل ضرب} \\ 4 \times 4 \times 4 = 4^3 \\ \hline \text{یا } 1 \text{ یا } 2 \text{ یا } 5 \text{ یا } 1 \text{ یا } 2 \text{ یا } 5 \end{array}$$

**(ب)** گزینه  $(2)$ : قسمت رنگی پیشامدی را نشان می دهد که در آن  $A$ - رخ می دهد، ولی هیچ یک از  $B$  و  $C$  رخ نمی دهدند، یعنی  $A - (B \cup C)$ .

**(پ)** گزینه  $(2)$ :

**(ت)** گزینه  $(1)$ :

$$a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2} \xrightarrow{n=1} a_1 = \frac{(-1)^{1+1}}{2} = \frac{(-1)^2}{2} = \frac{1}{2} \Rightarrow 4a_1 = 4 \times \frac{1}{2} = 2$$

$$b_n = n^2 + 1 \xrightarrow{n=3} b_3 = 3^2 + 1 = 9 + 1 = 10 \Rightarrow \frac{b_3}{2} = \frac{1}{2} = 5$$

$$\cdot 4a_1 + \frac{b_3}{2} = 2 + 5 = 7$$

**۴** توجه کنید که

$$P(n, 2) = \frac{n!}{(n-2)!} = \frac{n(n-1)(n-2)!}{(n-2)!} = n(n-1)$$

$$C_4^5 = \frac{5!}{4! \times 1!} = \frac{5 \times 4!}{4!} = 5$$

$$n(n-1)-1=5 \Rightarrow n^2-n-1-5=0 \Rightarrow n^2-n-6=0$$

$$(n-3)(n+2)=0 \Rightarrow \begin{cases} n=3 \in \mathbb{N} & (\text{ق.ق.}) \\ n=-2 \notin \mathbb{N} & (\text{غ.ق.ق.}) \end{cases}$$

**۵** اگر دو نفر مشخص را  $A$  و  $B$  بنامیم، این  $9$  نفر را به صورت زیر در نظر می گیریم.



ابتدا از  $7$  نفر دیگر  $4$  نفر انتخاب می کنیم که بین دو نفر  $A$  و  $B$  قرار بگیرند:

$$\binom{7}{4} = \frac{7!}{4! \times 3!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4!}{4! \times 3!} = 35$$

اگر دو نفر مشخص  $A$  و  $B$  به  $2!$  حالت، چهار نفر بین  $A$  و  $B$  به  $4!$  حالت و جعبه و افراد بیرون جعبه به  $4!$  حالت با هم جایه جا می شوند (جعبه را یک شخص در نظر می گیریم). بنابراین طبق اصل ضرب (جعبه را یک شخص در نظر می گیریم)  $= 35 \times 2! \times 4! = 40 \times 20$

**۶**  $A \cap B = \emptyset$  و در نتیجه

$$P(A') = 1 - P(A) = 1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$$

$P(A) = 1 - P(A') = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$  احتمال رخدادن  $A$  یا  $B$ ، یعنی  $P(A \cup B)$  برابر است با

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\frac{9}{10} = \frac{5}{6} + P(B) + 0 \Rightarrow P(B) = \frac{9}{10} - \frac{5}{6} = \frac{27-25}{30} = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$$

**۱۱** چون دور دایره  $360^\circ$  است، پس مجموع زاویه ها در نمودار دایره ای برابر

$360^\circ$  است. اگر  $\alpha$  زاویه مربوط به گروه سنی بالای سال باشد، آن گاه

$$52^\circ + 8^\circ + \alpha = 360^\circ \Rightarrow \alpha = 360^\circ - 52^\circ - 8^\circ = 300^\circ$$

اگر تعداد تماشاجیان گروه سنی بالای سال برابر  $x$  باشد، آن گاه

$$\frac{x}{360^\circ} = \frac{300^\circ}{360^\circ} \Rightarrow x = 300^\circ \Rightarrow x = 57$$

**۱۲** **(الف)** کافی است در جمله عمومی دنباله به جای  $a_n$  قرار دهیم  $\frac{5}{\gamma}$

$$a_n = \frac{3n}{4n+1} \Rightarrow \frac{5}{\gamma} = \frac{3n}{4n+1} \Rightarrow 5(4n+1) = \gamma(3n)$$

$$20n+5 = 21n \Rightarrow n=5 \Rightarrow a_5 = \frac{5}{\gamma}$$

**(ب)** برای پیدا کردن جمله مشترک دو دنباله، کافی است جمله عمومی آنها را باهم برابر قرار دهیم.

$$a_n = b_n \Rightarrow 3n^2 - 2 = 2n - 1 \Rightarrow 3n^2 - 2 - 2n + 1 = 0$$

$$3n^2 - 2n - 1 = 0 \Rightarrow \Delta = (-2)^2 - 4(3)(-1) = 4 + 12 = 16$$

$$n = \frac{-(-2) \pm \sqrt{16}}{2 \times 3} = \frac{2 \pm 4}{6} = \begin{cases} 1 \\ -\frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow a_1 = b_1$$

$$\xrightarrow[n=1]{\text{فرد}} a_{n+1} = 2a_n + 1 \Rightarrow a_{1+1} = 2a_1 + 1 \Rightarrow a_2 = 2(5) + 1 = 11$$

$$\xrightarrow[a_1=5]{\text{زوج}} a_{n+1} = \frac{a_n}{2} - 1 \Rightarrow a_{2+1} = \frac{a_2}{2} - 1 = \frac{11-2}{2} = \frac{9}{2}$$

**۱۳** **(الف)** در این دنباله هر جمله (به جز جمله اول) از ضرب عدد ثابت  $\frac{1}{3}$  در جمله قبلی به دست می آید. بنابراین

$$\underbrace{a_{n+1}}_{a_{n+1}} = \frac{1}{3} \underbrace{a_n}_{a_n} \Rightarrow a_{n+1} = \frac{1}{3} a_n, \quad a_1 = 9$$

**(ب)** توجه کنید که دنباله داده شده به صورت زیر است:

$$3^2, \quad 3^1, \quad 3^0, \quad 3^{-1}, \quad 3^{-2}, \quad \dots$$

عدد  $3$  ثابت است. پس رابطه شماره هر جمله را با توان آن جمله می توان به دست آورد که به صورت  $3^{n-1}$  است. بنابراین

$$a_n = 3^{n-1} \quad \text{یا} \quad a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

**(پ)** جمله دهم دنباله را حساب می کنیم:

$$a_n = 3^{n-1}, \quad n=1 \Rightarrow a_1 = 3^{1-1} = 3^{-1} = \left(\frac{1}{3}\right)^1$$

**۱۴** **(الف)** در این دنباله هر جمله (به جز جمله اول) از ضرب عدد ثابت  $\frac{1}{3}$  در جمله قبلی به دست می آید. بنابراین

$$\underbrace{a_{n+1}}_{a_{n+1}} = \frac{1}{3} \underbrace{a_n}_{a_n} \Rightarrow a_{n+1} = \frac{1}{3} a_n, \quad a_1 = 9$$

**(ب)** توجه کنید که دنباله داده شده به صورت زیر است:

$$3^2, \quad 3^1, \quad 3^0, \quad 3^{-1}, \quad 3^{-2}, \quad \dots$$

عدد  $3$  ثابت است. پس رابطه شماره هر جمله را با توان آن جمله می توان به دست آورد که به صورت  $3^{n-1}$  است. بنابراین

$$a_n = 3^{n-1}$$

**۱۵** **(الف)** درست. **(ب)** نادرست. تهی یک پیشامد غیرممکن (نشدنی) است. **(پ)** نادرست. اگر داده دورافتاده نداشته باشیم، میانگین معیار مناسبی برای گرایش به مرکز است. **(ت)** نادرست. اگر  $a_1 = -1$  و  $a_n = n-3$  باشد، آن گاه  $a_1 = -1-3 = -2$  است. اما در دنباله مورد نظر  $a_n = -n$  است.

**۱۱** تعداد اعضای فضای نمونه این آزمایش تصادفی برابر است با تعداد کل زیرمجموعه های سه عضوی از مجموعه پنج عضوی داده شده، یعنی


$$n(S) = \binom{5}{3} = \frac{5!}{3!(5-3)!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{2 \times 3!} = 10 \quad (\text{۰/۲۵})$$

برای ساختن یک زیرمجموعه سه عضوی از A که شامل عضو a است، از میان سایر اعضای A، یعنی چهار عضو a, b, c, d و عضو انتخاب می کنیم و آنها را به همراه a در یک مجموعه قرار می دهیم (چون d باید داخل زیرمجموعه باشد، پس اجازه انتخاب فقط دو عضو دیگر را داریم). بنابراین اگر A پیشامد مورد نظر باشد، آن گاه

$$n(A) = \binom{4}{2} = \frac{4!}{2!2!} = \frac{4 \times 3 \times 2!}{2 \times 2!} = 6 \quad (\text{۰/۲۵})$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5} \quad \text{بنابراین}$$

**۱۲** نموداری که پراکندگی کمتری داشته باشد، نشان دهنده عملکرد بهتر است. برای این منظور از شاخص های پراکندگی (دامنه تغییرات، دامنه میان چارکی ...) استفاده می کنیم. هرچه میزان این شاخص ها کمتر باشد، پراکندگی نیز کمتر است. توجه کنید که در حالت کلی نمایش یک نمودار جعبه ای به صورت زیر است:



بنابراین

$$\begin{cases} \text{دانش آموز A: } R = 14 - 6 = 8 \quad (\text{۰/۲۵}) \\ \text{دانش آموز B: } R = 14 - 2 = 12 \quad (\text{۰/۲۵}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{دانش آموز A: } IQR = Q_3 - Q_1 = 12 - 7 = 5 \quad (\text{۰/۲۵}) \\ \text{دانش آموز B: } IQR = 10 - 4 = 6 \quad (\text{۰/۲۵}) \end{cases}$$

در نتیجه دانش آموز A عملکرد بهتری داشته است. (۰/۲۵)

**۱۳** در تمامی گام های حل مسئله مرتبط با آمار، لازم است مسئله مورد بررسی، متغیرها و عوامل مرتبط با آنها را خوب بشناسیم. (۰/۲۵) این امر بدون کار گرهی و همکاری کارشناسان زمینه پژوهش مورد بررسی ممکن نیست. (۰/۲۵) (مثالاً آگر آمارگیران از اهداف کلی مطالعه باخبر نباشند یا فردی که داده ها را تحلیل می کند، ویژگی های جامعه آماری یا موضوع مورد بررسی را به خوبی نشناسد، حتی اگر هر فرد به صورت جداگانه کار خود را خیلی خوب انجام دهد. (۰/۲۵) نتیجه نهایی لزوماً مطلوب نخواهد بود. (۰/۲۵)

**۱۴ (الف)** دقت کنید که

$$n=1 \xrightarrow{1 \leq n \leq 1} a_n = n^2 - 1 \Rightarrow a_1 = 1^2 - 1 = 0 \quad (\text{۰/۲۵})$$

$$n=36 \xrightarrow{n > 1} a_n = \sqrt{n} \Rightarrow a_{36} = \sqrt{36} = 6 \quad (\text{۰/۲۵})$$

$$a_1 - a_{36} = 0 - 6 = -6 \quad (\text{۰/۲۵})$$

بنابراین

**(ب)** توجه کنید که

$$n=1 \Rightarrow a_{1+1} = \frac{1}{a_1} + 1 \xrightarrow{a_1=2} a_2 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} \quad (\text{۰/۲۵})$$

$$n=2 \Rightarrow a_{2+1} = \frac{1}{a_2} + 2 \xrightarrow{a_2=\frac{3}{2}} a_3 = \frac{1}{\frac{3}{2}} + 2 = \frac{2}{3} + 2 = \frac{2+6}{3} = \frac{8}{3} \quad (\text{۰/۲۵})$$

$$n=3 \Rightarrow a_{3+1} = \frac{1}{a_3} + 3 \xrightarrow{a_3=\frac{8}{3}} a_4 = \frac{1}{\frac{8}{3}} + 3 = \frac{3}{8} + 3$$

$$= \frac{3+24}{8} = \frac{27}{8} \quad (\text{۰/۲۵})$$

**۷** تمام مسیرهای ممکن برای رفتن از A به D را مشخص می کنیم.

$$A \xrightarrow{2} B \xrightarrow{x} C \xrightarrow{3} D$$

$$\xrightarrow{\text{اصل ضرب}} 2 \times x \times 3 = 6x \quad (\text{۰/۲۵})$$

$$A \xrightarrow{3} E \xrightarrow{4} D \xrightarrow{\text{اصل ضرب}} 3 \times 4 = 12 \quad (\text{۰/۲۵})$$

$$6x + 12 = 24 \Rightarrow 6x = 24 \Rightarrow x = 4 \quad (\text{۰/۲۵})$$

**۸** توجه کنید که  $n(S) = 8$  (چون دستگاه به ۸ قسمت مساوی تقسیم

شده است). (۰/۲۵) (اگر پیشامد روی عددی اول یا روی عددی کمتر از ۶ ایستادن عقریه را A بنامیم، آن گاه

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\} \quad (\text{۰/۲۵}) \Rightarrow n(A) = 6 \Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} \quad (\text{۰/۲۵})$$

**۹** توجه کنید که تعداد اعضای فضای نمونه برابر است با:

$$n(S) = 7! \quad (\text{۰/۲۵}) \Rightarrow \text{تعداد جایگشت های ۷ شیء متمایز}$$

می دانیم در میان اعداد طبیعی ۱ تا ۷، عدد های ۳، ۵ و ۶ اول و عدد های ۱، ۴ و ۶ غیراول هستند. اگر A پیشامد مورد نظر باشد، آن گاه می توان نوشت

$$\frac{1}{\text{اول}} \frac{1}{\text{غیراول}} \frac{1}{\text{اول}} \frac{2}{\text{غیراول}} \frac{3}{\text{اول}} \frac{2}{\text{غیراول}} \frac{3}{\text{اول}}$$

بنابراین طبق اصل ضرب

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{4!3!}{7!} = \frac{4! \times 3 \times 2}{7 \times 6 \times 5 \times 4!} = \frac{1}{35} \quad (\text{۰/۲۵})$$

**۱۰** توجه کنید که تعداد اعضای فضای نمونه برابر است با تعداد حالات

انتخاب ۳ بزرگویی از بین ۸ بزرگویی، یعنی

$$n(S) = \binom{8}{3} = \frac{8!}{3!5!} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5!}{3!5!} = 56 \quad (\text{۰/۲۵})$$

**روش اول:** اگر بخواهیم حداقل ۲ بزرگویی نشان دار باشد، آن گاه یا باید ۲ بزرگویی نشان دار و ۱ بزرگویی بی نشان باشد، یا ۱ بزرگویی نشان دار و ۲ بزرگویی بی نشان دار باشد، یا صفر بزرگویی نشان دار و ۳ بزرگویی بی نشان دار باشد. بنابراین اگر A پیشامد مورد نظر باشد، آن گاه

$$n(A) = \binom{3}{2} \times \binom{5}{1} = \binom{3}{1} \times \binom{5}{2} \quad (\text{۰/۲۵})$$

$$+ \binom{3}{0} \times \binom{5}{3} = 3 \times 5 + 3 \times \frac{5!}{2! \times 2!} + 1 \times \frac{5!}{3! \times 2!}$$

$$= 15 + \frac{3 \times 5 \times 4 \times 3!}{2 \times 3!} + \frac{5 \times 4 \times 3!}{3! \times 2!} = 15 + 30 + 10 = 55 \quad (\text{۰/۲۵})$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{55}{56} \quad (\text{۰/۲۵})$$

بنابراین

**روش دوم:** اگر A پیشامد این باشد که حداقل ۲ بزرگویی نشان دار باشد،

آن گاه  $A'$  پیشامد این است که هر سه بزرگویی نشان دار باشد. (۰/۲۵) بنابراین

$$n(A') = \binom{3}{3} = 1 \quad (\text{۰/۲۵})$$

در نتیجه

$$P(A') = \frac{n(A')}{n(S)} = \frac{1}{56} \quad (\text{۰/۲۵}) \Rightarrow P(A) = 1 - P(A') = 1 - \frac{1}{56} = \frac{55}{56} \quad (\text{۰/۲۵})$$

مجموع دو جمله کناری = دو برابر جمله وسط  
 $2(2x) = 14 + 6 \Rightarrow 4x = 20 \Rightarrow x = 5$

ب) توجه کنید که

پ) کاهشی.

**۳** جمله عمومی دنباله حسابی به صورت  $a_n = a_1 + (n-1)d$  است.

$$\begin{cases} a_{11} = 52 \Rightarrow a_1 + 10d = 52 \\ a_{19} = 92 \Rightarrow a_1 + 18d = 92 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -a_1 - 10d = -52 \\ a_1 + 18d = 92 \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} \xrightarrow{+} 8d = 40 \Rightarrow d = 5 \\ a_1 + 10d = 52 \Rightarrow a_1 + 50 = 52 \Rightarrow a_1 = 2 \end{array}$$

$$a_1 + 10d = 52 \Rightarrow a_1 + 10(5) = 52 \Rightarrow a_1 + 50 = 52 \Rightarrow a_1 = 2$$

$$a_{26} = a_1 + 25d = 2 + 25 \times 5 = 127$$

توجه کنید که مقدار اختلاف مشترک دنباله حسابی را به صورت

$$d = \frac{a_{19} - a_{11}}{19 - 11} = \frac{92 - 52}{8} = 5$$

**۴** الف) دنبالهای که از قانون تابع خطی پیروی می‌کند، یک دنباله حسابی است که در آن اختلاف مشترک  $d$  با شبیه خط برابر است. بنابراین ضابطه این دنباله را می‌توان به صورت زیر به دست آورد:

$$y = 3x - 1 \xrightarrow{x=n} a_n = 3n - 1, \quad n \in \mathbb{N}$$

ب) توجه ضابطه یا جمله عمومی دنباله، یعنی  $a_n = 3n - 1$  می‌توان دنباله را مشخص کرد:

$$n=1 \Rightarrow a_1 = 3(1) - 1 \Rightarrow a_1 = 2$$

$$n=2 \Rightarrow a_2 = 3(2) - 1 \Rightarrow a_2 = 5 \xrightarrow{\text{دنباله}} 2, 5, 8, \dots$$

$$n=3 \Rightarrow a_3 = 3(3) - 1 \Rightarrow a_3 = 8$$

⋮

دقت کنید در این دنباله حسابی، هر جمله (به جز جمله اول) از اضافه شدن مقدار ثابت ۳ به جمله قبلی به دست آمده است. پس

$$\xrightarrow{\text{رابطه بازگشتی}} a_{n+1} = a_n + 3, \quad a_1 = 2$$

**۵** چون جمله عمومی دنباله حسابی را می‌توان به صورت

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$a_6 + a_4 + a_8 = 90 \Rightarrow (a_1 + 5d) + (a_1 + 3d) + (a_1 + 7d) = 90$$

$$3a_1 + 15d = 90 \xrightarrow{\div 3} a_1 + 5d = 30 \xrightarrow{a_1 + 5d = a_6} a_6 = 30$$

چون اختلاف مشترک مثبت است، پس جملات دنباله افزایش می‌یابند.  
 $15, \dots, 17, \dots, 23$

کافی است اختلاف مشترک دنباله حسابی، یعنی  $d$  را به دست آوریم تا دنباله کامل شود. دقت کنید که

$$\xrightarrow{\text{اختلاف مشترک}} d = \frac{23 - 15}{21 - 15} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

بنابراین

$$15, 17, 19, 21, 23$$

**۶** الف) دنباله اعداد زوج به صورت  $2, 4, 6, 8, \dots$  است. این دنباله یک

دنباله حسابی است که در آن  $a_1 = 2$  و  $d = 2$ . بنابراین خواسته سؤال مجموع

۱۶ جمله اول این دنباله حسابی است.

$$S_{16} = \frac{16}{2} [2 \times 2 + (16-1) \times 2] = 8(4 + 15 \times 2) = 8(4 + 30) = 8 \times 34 = 272$$

**۱۵** الف) دنباله اعداد طبیعی فرد متوالی به صورت  $1, 3, 5, 7, \dots$  است.

در این دنباله هر جمله (به جز جمله اول) از اضافه شدن مقدار ثابت ۲ به جمله قبلی به دست آمده است. بنابراین

$$\xrightarrow{\text{جمله بعدی}} a_{n+1} = a_n + 2, \quad a_1 = 1$$

ب) برای یافتن ضابطه تابعی یا همان جمله عمومی این دنباله، باید رابطه هر جمله با شماره آن جمله را بیابیم:

$$\begin{matrix} 1, 3, 5, 7, \dots \\ (1), (2), (3), (4) \end{matrix} \xrightarrow{\text{نهایی یک}} \text{دو برابر}$$

هر شماره دو برابر و سپس یک واحد از آن کم شده است. پس  $n = 2n - 1$ .

$$a_n = 2n - 1 \Rightarrow 99 = 2n - 1 \Rightarrow 2n = 100 \Rightarrow n = 50$$

$$a_{50} = 99$$

**۱۶** الف) ابتدا مجموع هر سطر را به دست می‌آوریم و به صورت یک دنباله می‌نویسیم.

$$1, 1+1, 1+2+1, 1+3+3+1, 1+4+6+4+1, \dots \Rightarrow 1, 2, 4, 8, 16, \dots$$

بنابراین

$$a_1 = 1 = 2^0 = 2^{1-1}, \quad a_2 = 2 = 2^1 = 2^{2-1}, \quad a_3 = 4 = 2^2 = 2^{3-1}$$

$$a_4 = 8 = 2^3 = 2^{4-1}, \quad a_5 = 16 = 2^4 = 2^{5-1}$$

$$\xrightarrow{\text{شماره سطر}} a_n = 2^{n-1}$$

$$a_{20} = 2^{20-1} = 2^{19}$$

در نتیجه

ب)

## پاسخ تشریحی آزمون (۱۲)



الف) نادرست. توجه کنید که رابطه داده شده خطی نیست. در واقع داریم

$$\xrightarrow{n=1} a_1 = 1 + \frac{1}{1} = 1 + 1 = 2$$

$$\xrightarrow{n=2} a_2 = 2 + \frac{1}{2} = \frac{4+1}{2} = \frac{5}{2}$$

$$\xrightarrow{n=3} a_3 = 3 + \frac{1}{3} = \frac{9+1}{3} = \frac{10}{3}$$

بنابراین

$$\begin{cases} a_2 - a_1 = \frac{5}{2} - 2 = \frac{5-4}{2} = \frac{1}{2} \\ a_3 - a_2 = \frac{10}{3} - \frac{5}{2} = \frac{20-15}{6} = \frac{5}{6} \end{cases} \Rightarrow a_2 - a_1 \neq a_3 - a_2$$

ب) درست. توجه کنید که از جمله دوم به بعد، هر جمله از جمع عدد ثابت  $\frac{1}{2}$  با جمله قبلی اش به دست آمده است. بنابراین دنباله داده شده دنباله ای

حسابی با جمله اول ۲ و اختلاف مشترک  $\frac{1}{2}$  است.

ب) درست. اختلاف مشترک این دنباله برابر صفر است.

۲ الف) شبیه. توجه کنید که

$$a_n = a_1 + (n-1)d \Rightarrow a_n = a_1 + nd - n \Rightarrow a_n = nd + a_1 - n$$

$$= d(n-1) + a_1 - n$$